

消化科专科理论知识考试

一、单项选择题

1 我国肝硬化最常见的病因是（） [单选题] *

A.慢性酒精中毒

B.乙型病毒性肝炎 ✓

C.自身免疫性肝炎

D.丙型病毒性肝炎

E.药物中毒

2 .肝硬化时，门静脉高压可引起（） [单选题] *

A.男性乳腺发育

B.食管静脉曲张 ✓

C.氨中毒

D.凝血因子减少

E.黄疸

3 .关于肝硬化腹水形成的因素，不正确的是（） [单选题] *

A.门静脉压力增高

B.原发性醛固酮增多 ✓

C.低白蛋白血症

D.肝淋巴液生成过多

E.抗利尿激素分泌过多

4 .肝硬化患者肝功能减退的临床表现不包括（） [单选题] *

A. 齿龈出血

B. 脾大 ✓

C. 黄疸

D. 浮肿

E. 肝掌

5 .关于肝硬化自发性腹膜炎，正确的描述是（） [单选题] *

A. 一般起病急，伴高热、寒战，剧烈腹痛，出现板状腹、反跳痛

B. 致病菌多为金黄色葡萄球菌

C. 易出现顽固性腹水 ✓

D. 治疗时应加强利尿治疗

E. 应进行腹水培养，待培养结果出来后有针对性应用抗生素治疗

6 .最能说明肝硬化病人已存在门脉高压的表现是（） [单选题] *

A. 腹水

B. 门静脉增宽 ✓

C. 脾大

D. 痔核形成

E. 食道静脉曲张

7 .对判断肝硬化患者预后意义不大的指标是（） [单选题] *

A. 腹水

8 .白蛋白

C. 血清电解质 ✓

D. 凝血酶原时间

E. 肝性脑病

8. 48岁，男性，肝硬化患者，有腹水。不规则服用利尿剂治疗，二天来出现嗜睡。体检：轻度黄疸，测血钠 120mmol/L ，血钾 2.6mmol/L ，氯化物 92mmol/L ，BUN 10mmol/L ，血 PH 7.50 。此时最好的治疗是静脉滴

注（） [单选题] *

A. 谷氨酸钠

8 . 谷氨酸钠+精氨酸

C. 谷氨酸钠+谷氨酸钾

D. 谷氨酸钠+左旋多巴

E. 谷氨酸钠+精氨酸+10%氯化钾 **V**

9 . 男，42岁，呕吐、腹泻2天，意识模糊、烦躁不安半天急诊入院。查体：BP $110/70\text{mmHg}$ 神志恍惚，巩膜中度黄染，颈部可见数枚蜘蛛痣。心肺未见异常，腹软，肝肋下未触及，脾肋下 3cm 。双上肢散在出血点，Hb 90g/L ，WBC $3.22 \times 10^9/\text{L}$ ，血糖 7.0mmol/L ，尿糖（+），尿酮（-）尿镜检（对确诊最有价值的辅助检查是

（） [单选题] *

A. 血气分析

B. 腹部 CT

C. 肾功能

D. 肝功能

E. 血氨 **✓**

10 . 如果月干性脑病患者躁动不安，不宜选用（） [单选题] *

A. 东莨菪碱

C. 水合氯醛,

D. 扑尔敏

E. 异丙嗪

11 .肝性脑病的治疗,下列各项中不正确的是 () [单选题] *

A. 禁食蛋白质

B. 口服乳果糖

C. 静滴精氨酸

D. 肥皂水灌肠 V

E. 补充支链氨基酸

12 .下列哪项体征对肝性脑病诊断有特征性意义 () [单选题] *

A. 肌张力增强

B. 腱反射亢进

C. 扑翼震颤阳性 V

D. 腹壁反射消失

E. 嗜睡

13 .下列最可能为肝硬化腹水的是 () [单选题] *

A. 腹水比重 < 1.016 , 蛋白 = 20g/l V

B. 腹水比重 > 1.018 , 李凡他 (Rivalta) 试验阳性

C. 乳糜样腹水

D. 腹水细胞总数 $> 10^9/\text{l}$, 分类以中性粒细胞为主

E. 腹水细胞总数为 $10^8/\text{l}$, 分类以间皮细胞为主

- A. 黄疸
- B. 食管静脉曲张
- C. 氨中毒 ✓
- D. 凝血因子减少
- E. 男性乳腺发育

15. 肝硬化患者上消化道出血后，为预防肝 14 脑病的重要治疗措施为（） [单选题] *

- A. 加强保肝治疗
- B. 应用左旋多巴
- C. 弱酸溶液洗肠 ✓
- D. 复方氨基酸静点
- E. 纠正酸碱平衡

16. 常伴皮肤瘙痒的肝硬化是（） [单选题] *

- A. 小结节性肝硬化
- B. 大结节性肝硬化
- C. 淤血性肝硬化
- D. 原发性胆汁性肝硬化 ✓
- E. 日本血吸虫性肝硬化

17. 门脉性肝硬化患者出现消化道出血时，下列可诱发肝昏迷的情况是（） [单选题] *

- A. 输生理盐水
- B. 未及时补充离子造成低钾血症 ✓
- C. 静脉注射 6 氨基己酸
- D. 内镜下高频电灼或激光止血

E.口服去甲肾上腺素

18.查体于肿大的肝脏表面听到血管杂音时,应考虑() [单选题] *

A.Budd-Chiari 综合征

B.门静脉血栓形成

C.肝硬化失代偿期

D.原发性肝癌 ✓

E 慢性肝炎

19.男性,65岁,酒精性肝硬化5年,因感染服用红霉素后肝功能恶化,并出现肝肾综合征。下列检查结果

中与患者的临床情况不符合的是() [单选题] *

A.血尿素氮、肌酐升高

B.尿肌酐浓度均大于血肌酐浓度

C.尿渗透压,血渗透压

D.尿钠 $<10\text{mmol}/1$

E.尿沉渣 RBC $>50/S$ 倍镜视野 ✓

20.女性,26岁,低热、乏力、盗汗1月就诊。体检:神清,消瘦,颈静脉卧位充盈,心尖部2/6级收缩期

吹风样杂音。腹部饱满,腹壁柔韧感,全腹轻压痛及反跳痛,肝肋下2.5cm,边缘钝,质地中等,触痛(+),移动

性浊音(+),双下肢无水肿。ALT $56\text{iu}/1$,总胆汁酸 $8\mu\text{mol}/1$,尿蛋白(+)。为明确诊断应首选的检查是() [单

选题] *

A.腹水检查 ✓

B.胃肠钡餐造影

C.超声心动图

D.腹部B超

E. 肝炎病毒标记物

21. 男性, 45 岁, 饮酒 20 余年, 3 两白酒/日。查体: 肝肋下 2.0cm, 脾肋下 5.0cm。化验检查示外周血三系减少。其主要原因为 () [单选题] *

A. 营养吸收障碍

B. 脾功能亢进 ✓

C. 骨髓抑制

D. 细菌感染, 毒素作用

E. 消化道少量出血

22. 男性 37 岁, 患慢性肝炎合并肝硬化, 出现头昏恶心、呕吐、口苦、血便, 出血量约 200ml, 诊断为上消化道出血, 应给予 () [单选题] *

A 肾上腺素皮下注射

B 冰盐水+去甲肾上腺素口服 ✓

C 去甲肾上腺素静脉注射

D 冰盐水+肾上腺素口服

E 肾上腺素口服

23. 肝肾综合征主要与下列哪项因素有关 () [单选题] *

A. 肾小管坏死

B. 肾小球坏死

C. 肾皮质血流量减少 ✓

D. 肾间质炎性病变

E. 胆红素对肾脏的毒性

24 .肝硬化并发自发性腹膜炎,腹水的性质为() [单选题] *

A.血性

B.乳糜性

C.渗出液

D.漏出液

E.介于渗出液与漏出液之间 ✓

25 .肝硬化病人不会出现下列哪项内分泌失调的表现() [单选题] *

A.雌激素增多

B.雄激素减少

C.醛固酮增多

D.肾上腺糖皮质激素增多 ✓

E.抗利尿激素增多

26 .肝硬化患者有出血倾向,与下列哪项因素关系最小() [单选题]

A.肝合成凝血因子减少

B.低白蛋白血症 ✓

C.毛细血管脆性增加

D.脾功能亢进

E.胃肠道黏膜炎症糜烂

27 .下列哪项实验室检查结果不符合肝硬化失代偿期() [单选题] *

A.胆固醇常低于正常

B.肝硬化严重坏死时天门冬氨酸氨基转移酶(AST)活力常增高

C.血清MAO增高

D.凝血酶原时间延长,注射维生素K可以纠正 ✓

E.血清白蛋白减少， γ 球蛋白显著增高

28 .肝硬化患者因腹泻发生昏迷，查血钾 2.6mmol/L ，血钠 136mmol/L ，血氯化物 110mmol/L ，血氨 $158.7\mu\text{mol/L}$ ，血 $\text{pH}7.40$ 。宜选用的药物是（） [单选题] *

A.谷氨酸钠

B.谷氨酸钾 ✓

C.盐酸精氨酸

D.乳果糖

E.左旋多巴

29 .下列哪项不属于门脉高压症候群（） [单选题] *

A.肝脏增大 ✓

B.脾脏增大

C.食管和胃底静脉曲张

D.痔核形成

E.腹水

30 .肝性脑病患者的饮食治疗不恰当的是（） [单选题] *

A.图热卡

B.高碳水化合物 ✓

C.高蛋白质

D.高维生素

E.不能进食可鼻饲或静滴葡萄糖

31.1. 消化性溃疡活动期大便隐血试验阳性，提示每日出血量为：（） [单选题] *

A.<1m1

B.1-2m1

C.2-3m1

D.3-4m1v

32 .原发性肝癌肝外血行转移最多见于：（） [单选题] *

A.肺

8.骨7

C.肾

D.脑

34 .急性胰腺炎是：（） [单选题] *

A.感染性疾

B.遗传性疾病

C.自身消化性疾病 ✓

D.免疫性疾病

35 肝性脑病病人应当：（） [单选题] *

供给足量的热能与蛋白质

给予足量脂肪以提供热能

供给足量的糖和钠盐

每天给水不少于 2500m1v

36 .可以确诊胰腺炎的血清淀粉酶数值是：（） [单选题]

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/856104025201010043>