2024年浙江丽水市松阳县人民医院招聘笔试参考题库含答案详解

一、A1型题	(每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。	请从中选择一
个最佳答案,	并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。)

- 1、以下哪种疾病最容易发生夜间阵发性呼吸困难? ()
 - A. 高血压
 - B. 房间隔缺损
 - C. 肺源性心脏病
 - O D. 慢性缩窄性心包炎
 - E. 肺动脉瓣狭窄

『正确答案』

Α

『答案解析』

夜间阵发性呼吸困难是指患者入睡后突然因憋气而惊醒,被迫取坐位,重者可有哮鸣音,称为心源性哮喘,常见于冠心病、高血压、风心病和高原性心脏病等左心疾病,其中以高血压最常见。

- 2、下列哪项为中枢性与周围性面瘫的区别? ()
 - A. 前者额纹消失
 - B. 后者病变在皮质脑干束
 - C. 后者多有舌前2/3味觉改变
 - O D. 前者眼睑闭合无力
 - E. 前者口角下垂

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

- 3、女性,29岁,10个月前起病,言语错乱。别人难以理解,骂人毁物,逐渐言语活动减少,不能与周围人沟通。近3个月来呆坐少语,自笑,认为自己的事别人都能知晓,有人要害自己。精神检查:意识清晰,目光表情呆滞,耳边有命令性幻听,被害妄想,被洞悉感,有思维中断。躯体及神经系统检查未见异常。该病人诊断为()。
 - A. 脑肿瘤所致精神障碍
 - B. 精神分裂症
 - C. 抑郁症
 - D. 内分泌疾病所致精神障碍
 - E. 偏执性精神障碍

『正确答案』

В

『答案解析』

暂无解析。

- 4、肾癌典型的临床表现是()。
 - C A. 消瘦、肿块和疼痛
 - B. 高血压、肿块和疼痛
 - C. 血尿、肿块和疼痛
 - O D. 发热、肿块和疼痛
 - E. 水肿、肿块和疼痛

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

- 5、病人自觉大脑突然涌现出大量不自主的、杂乱无章的、不属于自己思想的陌生内容,此症状属于()。
 - A. 强制性思维
 - B. 思维散漫
 - C. 强迫性思维
 - D. 思维奔逸
 - E. 被洞悉感

『正确答案』

Α

『答案解析』

强制性思维突出的特征是异己体验,突然的、大量的异己的思维内容进入脑内;思维散漫是联想连贯性障碍,联想松弛,内容散漫,缺乏逻辑性;强迫性思维:患者能意识到思维内容是自己的,并具有强迫和反强迫的特点;思维奔逸:思维的活动量的增多。转变速度加快;被洞悉感:患者认为其内心所想已经被他人所得知。故本题答案为A项。

- 6、肝性昏迷时,中枢神经系统的多巴胺合成减少,故应给予()。
 - A. 多巴胺
 - B. 复方氨基酸溶液
 - C. 乙酰谷氨酰胺
 - D. 左旋多巴
 - E. 乳果糖

『正确答案』

D

『答案解析』

肝性昏迷时,中枢神经系统的多巴胺合成减少,治疗时应该补充多巴胺。AD两项,直接应用多巴胺效果不佳,因为多巴胺不能透过血脑屏障,但多巴胺的前体左旋多巴却能通过血脑屏障进入脑组织。B项,复方氨基酸溶液(以支链氨基酸为主)可以纠正氨基酸代谢的不平衡,对门体分流性肝性脑病效果较好。C项,乙酰谷氨酰胺对于肝性脑病多巴胺减少的治疗无作用。E项,乳果糖在肠内被细菌分解为乳酸和醋酸,使肠内呈酸性,因而可以减少氨的形成与吸收,在血氨升高的肝性脑病时可以应用。

- 7、不符合颅内压增高病人的一般处理的是()。
 - C A. 静脉补液以保持尿量
 - B. 注意观察意识、瞳孔及生命体征的变化
 - C. 意识不清痰多者做气管切开吸痰
 - O D. 做高位灌肠以疏通大便
 - E. 频繁呕吐时,予以禁食,用脱水剂

『正确答案』

D

『答案解析』

有效的降低颅内压,使患者平稳渡过急性期,是急性颅内高压症抢救成功的关键: 颅内高压症的患者应绝对卧床休息;密切观察病情变化;频繁呕吐时应暂时禁食,防误吸,同时给予脱水剂;保持气道通畅;静脉补液,每日进液量不宜过多,一般控制在2000ml左右。

- 8、不属于甲肝病毒特点的为()。
 - C A. 属于小DNA病毒
 - B. 病后可获体液免疫
 - C. 传染源为患者
 - D. 主要经粪-口传播
 - E. 可用减毒活疫苗预防

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问: https://d.book118.com/85706016214 4006045