

全科医师考试题全科医师考试题（5）（附全部答案）

姓名： 科室： 得分：

一、单选题 1、在克山病的病因学说中，符合生物地球化学说中致病因素的是

- A. 低硒
- B. 低锰
- C. 高钙
- D. 高硒
- E. 以上都不是

2、健康危险因素评价技术是用来研究

- A. 健康危险因素与慢性病发病率及死亡率之间的关系
- B. 健康危险因素与急性病发病率及死亡率之间的关系
- C. 健康危险因素与健康保护因素之间的相互作用的关系
- D. 健康危险因素对健康损害的机制
- E. 以上均不正确

3、子宫肌瘤继发贫血最常见于

- A. 浆膜下子宫肌瘤
- B. 黏膜下子宫肌瘤
- C. 肌瘤囊性变性
- D. 肌瘤红色变性
- E. 肌壁间子宫肌瘤

4、病人，女性，65岁，突发上腹痛3h，伴心悸、恶心、呕吐，第一心音强弱不等，心电图P-P间期1.44s，ST段II、III、aVF抬高0.2mV，呈QR型，有关此病人的症状错误的是

- A. 恶心、呕吐与迷走神经受刺激和心排出量降低组织灌注不足有关
- B. 心电图ST段II、III、aVF导联抬高提示下壁心肌损伤
- C. 第一心音强弱不等是房室分离所致

D. 心电图 II、III、aVF，有病理性 Q 波，应考虑为陈旧性下壁心肌梗

E. 上腹痛、恶心、呕吐等症状不是急腹症所致

5、脑卒中最重要、独立的危险因素是

A. 高血脂

C. 高血压

D. 肥胖

E. 吸烟、饮酒

6、病人，男性，23 岁，打麻将时突然出现剧烈头痛、恶心和呕吐、颈项有阻力。诊断为蛛网膜下腔出血，应进行的检查是

A. 头颅 CT

B. 头颅 MRI

C. TCD

D. DSA

E. 腰穿

7、某家庭历来都由男性掌握家政大权，这个家庭属于哪种权力结构

A. 工具权威型

B. 感情权威型

C. 分享权威型

D. 传统权威型

E. 转换权威型

8、下列属于反治法则的是

A. 热因热用

B. 阴中求阳

C. 虚则补之

D. 阴病治阳

E. 热者寒之

9、子宫颈癌的好发部

- A. 子宫颈阴道部
- B. 子宫颈管内
- C. 子宫颈管外
- D. 子宫颈鳞柱上皮交界处
- E. 子宫颈间质部

10、不属于家庭生活周期发展阶段的是

- B. 学龄期
- C. 恋爱期
- D. 退休期
- E. 空巢期

11、疫源地范围的大小取决于

- A. 传染源的活动范围，排出病原体数量及毒力
- B. 传染源的数量，活动范围及周围人口数多少
- C. 传染源的活动范围、传播途径的特点和周围易感人群的免疫状态等

- D. 传染源的活动范围、数量和周围人群的免疫状态
- E. 传染源的数量、活动范围和疾病传染强度

12、基于突发公共卫生事件管理的信息，仅强调及时、不求准确全面的信息报告是

- A. 发现报告
- B. 初次报告
- C. 进程报告
- D. 结案报告
- E. 病例报告

13、慢性宫颈炎不包括下列哪项

- A. 宫颈糜烂
- B. 宫颈肥大
- C. 宫颈息肉
- D. 宫颈横裂
- E. 宫颈黏膜炎

14、不是治疗子宫内膜异位症的药物是

- A. 甲孕酮
- B. 雌二醇
- C. 达那唑
- D. LH-RH 类似药
- E. 甲睾酮

15、病人，男性，75 岁，有高血压病史多年，最近常于夜间憋醒，昨夜间加重，烦躁不

安、喘憋、咯粉红色泡沫痰，听诊双肺水泡音，你的诊断是

- A. 支气管哮喘
- B. 不稳定性心绞痛
- C. 急性气胸
- D. 急性左心衰竭
- E. 慢性阻塞性肺气肿急性发作

16、某病人慢性乙型病毒性肝炎病史 20 年，1 小时前呛咳后出现呕血，鲜红色，量约

500ml 。最可能的呕血原因是

- A. 急性胃黏膜病变
- B. 食管贲门黏膜撕裂
- C. 食管癌
- D. 食管胃底静脉曲张易破裂
- E. 胆道出血

17、最常见的功血为

- A. 黄体功能不全
- B. 子宫内膜脱落不全
- C. 排卵期出血
- D. 排卵型月经过多
- E. 无排卵性功血

18、一组以系统妄想为主要症状，而病因未明的精神障碍，若有幻觉则历时短暂且不突出。在不涉及妄想的情况下，无明显的其他心

理方面异常。30 岁以后起病者较多。此为

- A. 精神分裂症
- B. 分裂情感性障碍
- C. 双相障碍
- D. 偏执性精神病
- E. 癫痫所致精神障碍

19、病人，女性，66 岁，缓慢起病，双膝、双髋关节疼痛，逐渐加重，行走困难，类风

湿因子阴性，血沉正常。首先考虑的疾病是

- A. 骨性关节炎
- B. 类风湿关节炎
- C. 风湿性关节炎
- D. 红斑狼疮
- E. 感染性关节炎

20、下列哪项不符合肾结核

- A. 一般抗生素治疗无效
- B. 尿沉渣可到抗酸杆菌
- C. 普通细菌培养为阴性
- D. 静脉肾盂造影可发现肾实质虫蚀样缺损
- E. 尿培养结核分枝杆菌阴性

21、尿路感染急性期不宜做哪项检查

- A. X线腹平片
- B. B超
- C. 静脉肾盂造影
- D. 清洁中段尿沉渣涂片
- E. 清洁中段尿细菌培养

22、建立孕期保健册后，孕妇到乡镇卫生院、社区卫生服务中心进行产前检查的次数和时间分别是

- A. 孕 12～16、17～20、21～28、29～36、37～40 周至少各 1 次

B. 孕 12~16、17~20、21~28、29~36、37~40 周至少各 2 次

C. 孕 16~20、21~24、28~36、37~40 周至少各 3 次

D. 孕 16~20、21~24、28~36、37~40 周至少各 2 次

E. 孕 16~20、21~24、28~36、37~40 周至少各 1 次

23、饮水型地方性砷中毒病区的判定依据是

A. 有砷中毒病人

B. 有高砷水源存在

C. 饮用并被含砷废水污染，有砷中毒病人

D. 有高砷水源，有典型慢性砷中毒病人，可排除其他污染

E. 饮水井含砷量超标，有典型砷中毒病人，井旁长期有含高砷废料堆放

24、简易智力状态检查得分，划分痴呆的标准正确的是

A. 文盲（未受教育） ≤ 15 分

B. 小学程度（受教育年限 ≤ 6 年） ≤ 20 分

C. 中学（包括中专）程度 ≤ 25 分

D. 大学（包括大专）程度 ≤ 30 分

E. 以上均不正确

25、出现下列哪种表现提示可能出现白细胞淤滞

A. 纵隔淋巴结肿大

B. 绿色瘤

C. 蓝灰色斑丘疹

D. 头痛、颈项强直

E. 呼吸困难，反应迟钝

26、下列不符合典型心绞痛的是

A. 在体力负荷、情绪激动时发生

B. 常突然发生而迫使病人立即停止活动

C. 疼痛历时 1~5 分钟

D. 疼痛部位在左心前区

E. 疼痛放射至左肩及左上肢内侧

27、有关新生儿病理性黄疸，下列叙述哪项是正确的

- A. 生后 48 小时内出现
- B. 胆红素每日上升 $>85 \mu\text{mol/L}$
- C. 足月儿于 1 周内消退
- D. 早产儿于 3 周内消退
- E. 血清胆红素足月儿 $<221 \mu\text{mol/L}$ (12.9mg/dl)，早产儿 $<221 \mu\text{mol/L}$ (15mg/dl)

28、医学模式不包括以下哪种

- A. 神灵主义的医学模式
- B. 自然医学模式
- C. 机械论医学模式
- D. 生物医学模式
- E. 生物-心理-社会医学模式

29、根据样本资料算得某地健康成人白细胞计数的 95% 可信区间为 $7.2 \times 10^9 /\text{L} \sim$

$9.1 \times 10^9 /\text{L}$ ，其含义是

- A. 估计总体中有 95% 的观察值在此范围内
- B. 有 95% 的总体均数在此范围内
- C. 有 95% 的区间包含样本均数
- D. 该区间包含样本均数的可能性为 95%
- E. 该区间包含总体均数的可能性为 95%

30、假设检验的目的是

- A. 检验参数估计的准确度
- B. 检验参数估计的精确度
- C. 检验样本统计量是否不同
- D. 检验样本统计量与总体参数是否不同
- E. 检验总体参数是否不同

31、小儿营养不良的病因中最常见的是

- A. 饮食因素
- B. 日照不足

- C. 缺少锻炼
- D. 急性疾病
- E. 免疫缺陷

32、医学统计学研究的对象是

- A. 医学中的小概率事件
- B. 各种类型的数据
- C. 疾病的预防与治疗
- D. 有变异的医学事件
- E. 居民健康水平

33、理想的医疗保健体系意味着

- A. 所有病人都可以自由选择医院和医生
- B. 大医院的规模与科室设置能够满足全体民众的卫生需求
- C. 由基层医疗提供首诊服务，基层医疗与大医院各司其职
- D. 医院需向任何就医者开放，所有的病人都能在水平高的大医院

就诊

- E. 大医院负责向公众提供高福利的医疗保健服务

34、室性期前收缩三联律是指

- A. 每个窦性搏动后发生一次室性期前收缩
- B. 每个窦性搏动后发生二次室性期前收缩
- C. 每个窦性搏动后发生三次室性期前收缩
- D. 每两个窦性搏动后发生一次室性期前收缩
- E. 每三个窦性搏动后发生一次室性期前收缩

35、病人，男性，43岁，近2个月来走路不稳，走路似踩棉花样，尤以夜间为重。查体：发现双下肢位置觉、振动觉消失，Romberg征阳性，肌力正常，腱反射（-），跖反射无

反应。其病变定位在

- A. 前庭神经
- B. 锥体外系统
- C. 小脑
- D. 脊髓后索

E. 皮质脊髓侧束

36、洋地黄中毒的特征性改变为

A. 室早

B. 快速房性心律失常并传导阻滞

C. 心房颤动

D. 室早，多呈二联律

E. 房性心动过速

37、当病人对医生所实施的诊治手段有质疑时，医生必须详细介绍，在病人愿意时才能继续进行，这属于病人的

A. 社会责任权

B. 保护隐私权

C. 知情同意权

D. 平等医疗权

E. 疾病认知权

38、急性心肌梗死合并频发、成对室性早搏应首选

A. 普萘洛尔

B. 维拉帕米

C. 胺碘酮

D. 普鲁卡因胺

E. 利多卡因

39、全科医疗的医患关系特征中不包括

A. 从治疗为主转向关怀为主

B. 从以医生为中心转向以病人为中心

C. 从以疾病诊疗为中心转向以满足病人的需要为中心

D. 从主动与被动的需求关系转向需要互补的积极互动关系

E. 从缺乏感情色彩的“商业关系”转向朋友式的互助关系

40、心房扑动心电图表现中，以下哪项是错误的

A. 扑动波间无等电位线，波幅呈锯齿状大小一致

B. 多在II、III、aVF导联清晰可见

C. 扑动波间隔规则，频率为240～350次/分

- D. QRS 波一般呈室上性
- E. P波消失代以大小间距不等的 f 波

41、病人，女性，33 岁，阴道接触性出血，初步诊断为“宫颈癌”。宫颈刮片多次检查为

阳性，而宫颈活检为阴性，为确诊需做进一步检查

- A. CT
- B. MRI
- C. 碘试验
- D. 宫颈锥切术
- E. 不做任何处理，1 个月后再次活检

42、初产妇孕 40 周。临产 16 小时，宫口开口 1cm ，以 5% 葡萄糖液 500ml 及缩宫素 5U ， 40～50 滴/分静脉点滴，4 小时后宫口开大 9cm ；产妇诉腹痛，呕吐、烦躁；检查下腹部压痛、反跳痛明显，子宫轮廓不清，胎动、胎心消失，阴道少量出血。最可能的诊断是

- A. 前置胎盘
- B. 胎盘早剥
- C. 子宫破裂
- D. 先兆子宫破裂
- E. 妊娠合并急性胰腺炎

43、下腹部、会阴部手术后，缝线拆除时间一般为

- A. 术后 4～5 天
- B. 术后 6～7 天
- C. 术后 7～9 天
- D. 术后 10～12 天
- E. 术后 14 天

44、初产妇孕 38 周，下肢水肿伴头晕眼花、视物模糊 1 周，血压 160/104mmHg ，尿蛋白（+）。NSR 有反应型。正确处理为

- A. 立即剖宫产
- B. 积极治疗，等待自然分娩
- C. 积极治疗 1 周，终止妊娠

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/857133003142010010>