

# 糖尿病专科护士护理知识考核一. 选择题

1、糖尿病患者血糖升高时大量葡萄糖从肾脏排出，引起（）而多尿 [单项选择题] \*

A.多饮

B.多食

C.水代谢异常

D.渗透性利尿

2、糖尿病诊断标准中，糖尿病病症+随机血糖（I [单项选择题] \*

A.>7.0mmol/L

B. >12.0mmol/L

C. >11.1mmol/LV

D. >10,0mmol/L

3、糖尿病患者的 HbA1e 应控制在（1 [单项选择题] \*

A. <8.0%

B. <7.0%V

C. <9.0%

D. <10.0%

4、人体内糖的主要形式包括葡萄糖和（I [单项选择题] \*

A 脂肪

B.蛋白质

C.臀部 V

D.大腿

40、胰岛素治疗时最常见的不良反应是（\ [单项选择题] \*

A.低血糖 V

B.胰岛素水肿

C.视力模糊

D.过敏反应

41、以下哪种注射药物既能增强胰岛素分泌，又能抑制胰高血糖素分泌，同时能延缓胃排空，抑制食欲，从而降低血糖浓度（1 [单项选择题] \*

A. 门冬胰岛素

B.利拉鲁肽 V

C.赖脯胰岛素

D. 地特胰岛素

42、胰岛素启封使用后的有效期为（X [单项选择题] \*

A. 28 天 V

B.30 天

C. 40 天

D. 60 天

43、无针注射注射结束后，注射部位仍需继续按压（X [单项选择题] \*

A. 5S

B.10SV

C.15S

D. 20S

44、糖尿病肾病口服降糖药时禁用（工 [单项选择题] \*

A. 磺脲类和格列奈类

B. 双胍类和  $\alpha$ -糖苷酶抑制剂

C. 双胍类和噻唑烷二酮类

D. 磺脲类和双胍类 **V**

45、口服降糖药物中非促泌剂是（X [单项选择题] \*

A. DPP-4

B. 格列奈类

C. 磺脲类

D. 噻唑烷二酮类 **V**

46、2型糖尿病药物治疗的首选药物是（\ [单项选择题] \*

A. 阿卡波糖

B. 瑞格列奈

C. 优降糖

D. 二甲双胍 **V**

47、非促胰岛素分泌剂不包括（I [单项选择题] \*

A. 双胍类

B. 格列奈类 **V**

C.  $\alpha$ -糖苷酶抑制剂

D. 噻唑烷二酮类

- A. 体重增加
- B. 低血糖,
- C. 消化道反响
- D. 过敏反响

49、 ( ) 因具有吸收快、起效快和作用时间短的特点, 故友名为餐时血糖调节剂。 [单项选择题] \*

- A. 双胍类
- B.  $\alpha$ -糖普酶抑制剂
- C. 格列奈类 **V**
- D. 口塞嚶烷二酮类

50、  $\alpha$ -糖甘酶抑制剂的服用方法是 (X [单项选择题] \*

- A. 餐前服
- B. 餐后服
- C. 随意
- D. 餐时嚼服 **V**

51、 不是沙格列汀的最常见副作用的是 ( \ [单项选择题] \*

- A. 上呼吸道感染
- B. 过敏 **V**

C.尿路感染

D.头痛

52、合并 ASCVD 或有高危因素的患者，首选口服用药（1 [单项选择题] \*

A.二甲双胍

B.达格列净

C.沙格列汀 V

D.阿卡波糖

53、肾功能不全时应禁用（）类降糖药。 [单项选择题] \*

A.格列奈类

B. 口塞唾烷二酮类

C.双胍类 V

D. α-糖苷酶抑制剂

54、服用恩格列净最常见的副作用是（1 [单项选择题] \*

A.呼吸道感染

B.泌尿道感染 V

C. 皮肤瘙痒

D.低血糖

55、糖尿病患者 TG 控制良好值为（1 [单项选择题] \*

A.<1.1mmol/L

B. <1.3mmol/L

C. <1.4mmol/L

D. <1.5mmol/LV

56、糖尿病患者的 TC 控制良好值为 (X [单项选择题] \*

A.<4.2mmol/LV

B.<5.3mmol/L

C.<6.7mmol/L

D. <7.5mmol/L

57、糖尿病患者 HDL-C 应控制在 ( \ [单项选择题] \*

A.<0.8mmol/L

B. >0.9mmol/L

C. >1.1mmol/LV

D. <0.5mmol/L

58、合并冠心病的糖尿病患者 LDL-C 应控制在 (1 [单项选择题] \*

A.<2.5mmol/L

B. <1.8mmol/LV

C. <1.6mmol/L

D. <1.5mmol/L

59、以下哪项血症异常不是冠状动脉粥样硬化的危险因素 (1 [单项选择题] \*

A.TC 升高

B.TG 升高

C. LDL-C 升高

D. HDL-C 升高 V

60、对于糖尿病合并冠心病的患者，积极抗血小板及抗凝治疗时，首选 (1 [单项选择题] \*

A.双嘧达莫

B.肝素

C.普罗碘胺



D.阿司匹林 V

A.<0.8g/kgV

B. <0.9g/kg

C. <1.0g/kg

D. <1.5g/kg

62、DKA 患者呼气中有 (X [单项选择题] \*

A.大蒜味

B.烂苹果味 V

C.金属味

D.无味

63、为了有效预防慢性并发症的发生，糖尿病的治疗方案从单纯干预降糖，转为以 ( )  
干预为基础的多重危险因素综合管理。 [单项选择题] \*

A.饮食

B.运动

C.自我监测

D.生活方式 V

64、糖尿病合并肾病的患者，从肾小球滤过率下降起蛋白质每天控制在 ( )，同时补充  $\alpha$ -酮酸。 [单项选择题] \*

B. 0.4g/kg.d

C. 0.5g/kg.d

D. 0.6g/kg.dV

65、保护性感觉丧失的糖尿病患者不可选择的运动方式是（X [单项选择题] \*

A.划船

B.骑自行车

C.坐式运动

D.负重运动 V

66、视网膜病变的糖尿病患者可选择的运动方式是（\ [单项选择题] \*

A. 散步 V

B.慢跑

C.篮球

D.举重

67、为了预防运动后的低血糖，运动前血糖值（）时应补充含糖食物。 [单项选择题] \*

A.<5.5mmol/LV

B.<6.5mmol/L

C. <7.5mmol/L

D. <8.5mmol/L

68、糖尿病患者最常见的急性并发症是（I [单项选择题] \*

A.低血糖 V

B.DKA

C.糖尿病高渗性高血糖状态

D.糖尿病乳酸性酸中毒

69、抢救 DKA 患者的首要和关键措施是 (X [单项选择题] \*

A.胰岛素治疗

B.饮食治疗

C.补液治疗 V

D.禁食

70、重度 DKA 时，二氧化碳结合力往往 (I [单项选择题] \*

A.>20mmol/L

B.>10mmol/L

C. <20mmol/L

D. <10mmol/LV

71、DKA 患者第一小时的补液量为 (I [单项选择题] \*

A.3000ml

B.2000ml

C. 1000mlV

D.5000ml

72、DKA 患者当血糖下降至 ( ) 时改为 5%GS。 [单项选择题] \*

C. 14.9mmol/L

D. 13.9mmol/LV

73、DKA 患者清醒后应以 ( ) 补液为主。 [单项选择题] \*

A. 饮水

B. 静滴

C. 静推

D. 少量

74、血压正常的糖尿病患者应（）监测 1 次血压。 [单项选择题] \*

A 每天

8.1 个月

C.2 个月

D.3 个月

75、糖尿病视网膜病变可分为单纯型和（）两种。 [单项选择题] \*

A.复合型

B.增殖型

C.破坏型

D.减弱型

76、当糖尿病患者眼底检查可见黄白色“硬性渗出”或合并出血斑时为视网膜病变单纯型的（）期。 [单项选择题] \*

A.1 期

8.2 期

C.3 期

D.4 期

77、1型糖尿病发病（）后应每年进行眼底检查。 [单项选择题] \*

A.2年

B.3年

C.4年

D.5年

78、糖尿病妇女，怀孕后应于第（）孕期内进行眼底检查。 [单项选择题] \*

A.1V

B.2

C.3

D.4

79、糖尿病肾病的分期中，哪一期是可逆的（X [单项选择题] \*

A.1期。

B.2期

C.3期

D.4期

80、以持续微量清蛋白为标志的糖尿病肾病是哪一期（X [单项选择题] \*

A.1期

B.2期

C.3期

D.4期

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/865012044322011104>