

妇产科(医学高级)-生殖内分泌疾病

1、闭经时，孕激素试验阳性不能说明（）

- A. 有排卵障碍
- B. 下丘脑-垂体-卵巢轴正常
- C. 体内有一定雌激素水平
- D. 生殖道通畅
- E. 子宫内膜有功能

2、雌激素下列各项中哪项是错误的（）

- A. 全是由合体滋养细胞产生
- B. 雌激素来自胎盘及卵巢
- C. 妊娠早期由黄体产生雌二醇和雌酮
- D. 妊娠 10 周后由胎盘产生
- E. 雌激素为甾体激素

3、以下哪项不是 HRT 的益处（）

- A. 缓解绝经前后出现的更年期症状
- B. 可调整绝经前期月经紊乱周期
- C. 可以改善脑膜瘤
- D. 减少中风及结肠癌的发病危险
- E. 降低冠心病发生的危险性

4、闭经的雌孕激素序贯试验阴性说明（ ）

- A. 病变在下丘脑
- B. 病变在卵巢
- C. 病变在子宫
- D. 病变在垂体
- E. 属第一度闭经

5、继发性闭经的定义是（ ）

- A. 原有月经，现又连续闭经三个周期
- B. 原有月经，现又连续闭经 3 个月
- C. 原有月经，现又连续闭经 2 个月
- D. 原有月经，现又连续闭经 5 个月
- E. 原有月经，现又连续闭经 1 年

6、关于痛经的表述，下述哪项是错误的（ ）

- A. 继发性痛经指生殖器官有器质性病变
- B. 痛经是子宫收缩压力大而持续时间长
- C. 痛经与子宫内膜的前列腺素有关
- D. 痛经者经血中 PGF 低于正常妇女
- E. 痛经即指月经前后或行经期出现腹痛腰酸影响生活和工作

7、以下哪项不是更年期的泌尿生殖道改变（ ）

- A. 生殖器官有不同程度萎缩
- B. 绝经后易发生霉菌性阴道炎
- C. 绝经后易引起尿道肉阜
- D. 绝经后泌尿器官粘膜变薄且发生萎缩，易引起泌尿道感染
- E. 绝经后因支持生殖器的组织和肌肉发生萎缩，且弹性下降，易发生子宫下垂

8、围绝经期妇女所出现的症状多少、严重程度与下列哪项无关（ ）

- A. 与个人精神状态
- B. 与神经类型
- C. 与卵巢功能减退的速度
- D. 与生殖期的生殖健康保健
- E. 与结婚的年龄迟早有关

9、有关绝经下列哪项是正确的（ ）

- A. 50 岁以上妇女月经不规则即可称绝经
- B. 年龄在 40 岁以上，且停经已连续 12 个月以上称绝经
- C. 年龄在 40 岁以上且停经 8 个月即称绝经
- D. 年龄在 35 岁以上而停经半年即称绝经
- E. 凡停经 6 个月未来月经即称绝经

10、以下哪项不是 HRT 的治疗原则 ()

- A. 尽量选用天然雌激素
- B. 胆囊疾病者可以使用
- C. 更年期症状的局部症状为主时采用局部治疗
- D. 预防或治疗骨质疏松可长期使用
- E. 剂量要个体化，以最小有效剂量为佳

11、原发性痛经的主要原因是 ()

- A. PG 含量升高
- B. P 含量升高
- C. PRL 水平升高
- D. E2 升高
- E. LH

12、在痛经的辅助诊断中，以下哪项最有价值 ()

- A. 盆腔 B 超
- B. 测血 PG、E
- C. 核磁共振或 CT
- D. 腹腔镜检查
- E. CA125

13、常用调整月经周期的方法 ()

- A. 雌、孕激素序贯法
- B. 雌、孕激素联合法
- C. 后半周期疗法
- D. 激素替代治疗
- E. 促排卵

14、诊断有无排卵的方法有（ ）

- A. 诊刮
- B. 基础体温测定
- C. B超
- D. 阴道脱落细胞涂片
- E. 激素测定

15、关于功能失调性子宫出血，正确的是（ ）

- A. 常表现为月经周期正常，月经量过多，经期缩短
- B. 是由于神经内分泌调节紊乱引起的异常子宫出血，内外生殖器无器质性病变
- C. 卵巢功能性肿瘤所致的不规则阴道出血
- D. 无排卵型功血多见于生育期妇女
- E. 无排卵型功血可以是子宫内膜脱落不全

16、20岁，未婚少女，18岁初潮，月经周期不规则，2~3个月来潮

1 次，每次经期达 10 余日，量多，无痛经。本例恰当诊断应是（）

- A. 月经过多
- B. 黄体功能不足
- C. 子宫内膜不规则脱落
- D. 无排卵性功血
- E. 以上都不是

17、子宫内膜脱落不全功血患者，正确的是（）

- A. 经前宫颈黏液出现羊齿状结晶
- B. 月经周期缩短，经期正常
- C. 基础体温呈双相型，但上升缓慢
- D. 月经来潮前刮宫，示子宫内膜分泌反应不足
- E. 于月经期第 5 天，子宫内膜仍能见呈分泌反应的腺体

18、子宫内膜不规则脱落常发生在（）

- A. 晚婚晚育妇女
- B. 生育年龄妇女
- C. 青春期少女
- D. 带宫内节育器妇女
- E. 更年期妇女

19、导致青春期无排卵型功血的原因是（）

- A. 不能形成正常月经周期中的 FSH 和 LH 峰状分泌
- B. 雌激素水平低落
- C. 黄体功能不全
- D. 内膜前列腺素含量过高
- E. 雌、孕激素水平均低落

20、帮助诊断无排卵性功血的辅助检查有（）

- A. 基础体温双相
- B. 宫颈黏液拉丝见椭圆小体
- C. 月经后半期血孕酮 2nmol/L
- D. 阴道脱落细胞涂片为底层细胞
- E. 宫腔镜检查见内膜多发息肉

21、27 岁，月经频发，经血量正常，因婚后 4 年未孕来就诊。妇科检查：子宫后倾，正常大小，双附件无异常，基础体温呈双相型。最可能的诊断是（）

- A. 无排卵型功血
- B. 排卵期出血
- C. 黄体功能不全
- D. 子宫内膜脱落不全
- E. 子宫内膜炎

22、29 岁，停经 56 天后阴道出血 10 天。检查：子宫正常大小，质软，宫颈黏液见典型羊齿状结晶。应考虑为（）

- A. 先兆流产
- B. 卵巢性闭经
- C. 异位妊娠
- D. 无排卵型功血
- E. 黄体萎缩不全所致的出血

23、38 岁，继发不育，自然流产 2 次，月经规律（4~5 天/20~23 天），经量正常，无痛经，妇科检查无异常。应首先做下列哪项检查协助诊断（）

- A. 宫颈黏液检查
- B. 血 LH、FSH 测定
- C. B 超检查
- D. 腹腔镜检查
- E. 基础体温测定

24、50 岁，近一年来月经不规律，月经量增多，经期延长，妇科检查无异常发现。血红蛋白 90g/L。应做下列哪项处理（）

- A. 生殖激素测定
- B. B 超检查
- C. 诊断性刮宫

D. 药物调整月经周期

E. 雄激素止血

25、15 岁女性，14 岁初潮，尚无规律月经，因阴道持续流血 20 余天，增多 5 天来诊。查：Hb60g/L，P110 次 / 分。妇科检查无异常所见。首选的止血方法是（）

A. 孕激素止血

B. 雌激素止血

C. 三合激素止血

D. 垂体后叶素止血

E. 雄激素止血

26、24 岁，已婚，有功血史，此次停经 3 个月后，阴道持续出血 4 天，内诊子宫正常大小，双附件（-），血 hCG 正常。选择哪种方案为宜（）

A. 诊断性刮宫

B. 后穹窿穿刺

C. 孕激素药物刮宫

D. 口服避孕药

E. 雄激素止血

27、39 岁，G3P1，自然流产后出现月经不规律，8~10/26 天，基础

体温双相。月经第 5 天刮宫，内膜活检可见部分分泌期子宫内膜。应诊断为（）

- A. 无排卵型月经
- B. 黄体功能不全
- C. 子宫内膜脱落不全
- D. 正常月经
- E. 不全流产

28、35 岁，结婚 3 年未孕，月经周期 3~4/24~25 天，经量正常。妇科检查：子宫正常大小，附件（-）。月经来潮 6 小时诊刮结果为部分内膜分泌反应正常，部分分泌反应不良。本病例最可能的诊断是（）

- A. 正常月经
- B. 无排卵型功能失调性子宫出血
- C. 黄体功能不全
- D. 子宫内膜脱落不全
- E. 子宫内结核

29、24 岁，结婚 3 年不孕，月经周期 24 天，经期正常，经量多，测基础体温曲线高温相为 8 天。本例考虑为（）

- A. 无排卵型功能失调性子宫出血
- B. 黄体功能不全
- C. 子宫内膜脱落不全

- D. 属正常月经周期
- E. 排卵型月经过多

30、受精卵着床必须具备的条件，哪项是错误的（）

- A. 透明带必须消失
- B. 滋养层分化出合体滋养层
- C. 受精卵发育至囊胚期
- D. 囊胚与子宫内膜同步发育
- E. 必须有足够量的雌激素

2、面部痤疮、多毛，血脂代谢未见明显异常，初步诊断为多囊卵巢综合征。下列合适的治疗措施是（）

- A. 腹腔镜下卵巢打孔术
- B. 氯米芬促排卵
- C. 口服二甲双胍
- D. 孕激素后半周期疗法调整月经周期
- E. 服用抗雄药物螺内酯

247、关于围绝经期概念，正确的是（）

- A. 绝经前后因性激素减少所致的一系列症状称围绝经综合征
- B. 一侧卵巢切除可导致绝经
- C. 绝经后进入老年期

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/866011223054010045>