

## 助理医师考试临床助理(习题卷133)

说明：答案和解析在试卷最后

**第1部分：单项选择题，共100题，每题只有一个正确答案，多选或少选均不得分。**

1. [单选题]女，19岁。双下肢水肿3天。2周前患急性扁桃体炎，经口服抗生素后痊愈。查体：BP 150/90mmHg。尿常规：蛋白（++），尿沉渣镜检示红细胞10~20/高倍视野，血肌酐 $91\mu\text{mol/L}$ ，补体C3下降。最可能的发病机制为（）。
- A) 细菌直接对内脏的感染
  - B) 感染导致的中毒反应
  - C) 机体代谢紊乱
  - D) 感染所致的免疫损伤
  - E) 病毒直接对肾脏的破坏
2. [单选题]属于顺式作用元件的是
- A) 转录抑制因子
  - B) 转录激活因子
  - C) 增强子
  - D) 外显子
  - E) 内含子
3. [单选题]6个月~6岁贫血标准
- A)  $\text{Hb} < 150\text{g/L}$
  - B)  $\text{Hb} < 145\text{g/L}$
  - C)  $\text{Hb} < 120\text{g/L}$
  - D)  $\text{Hb} < 110\text{g/L}$
  - E)  $\text{Hb} < 100\text{g/L}$
4. [单选题]对肾盂肾炎的描述，下列哪项不正确？
- A) 肾盂肾炎病史超过一年即为慢性期
  - B) “无症状性菌尿”亦需及时系统治疗
  - C) 容易再次复发
  - D) 诊断慢性肾盂肾炎时，过去可无明确病史
  - E) 判定急性期或慢性期有困难时，可作短期治疗，以利鉴别
5. [单选题]患者，女，45岁，吸烟20多年，每天约15支，间断咳嗽、咳痰8年，加重伴喘息2年，喘息于每年冬春季加重，夏季较轻。吸入过敏原血清抗体过筛试验阴性，这时可借助下列哪一种方法鉴别是支气管哮喘还是慢性阻塞性肺疾病？（）
- A) 胸部X线片
  - B) 吸入支气管舒张剂后 $\text{FEV}_1/\text{FVC}$
  - C) 肺残气量
  - D) 支气管激发试验或舒张试验
  - E) 肺顺应性测定

6. [单选题]男，45岁。发现HBsAg阳性10余年，间断ALT异常。乏力，双下肢水肿2年，查体：肝掌阳性，胸前可见数个蜘蛛痣，血ALB 28g/L，最有可能存在的特征性肝脏组织学病理改变是（ ）。
- A) 肝细胞气球样变  
B) 桥接坏死  
C) 肝细胞碎片状坏死  
D) 肝细胞脂肪样变  
E) 假小叶形成
7. [单选题]蜡样屈曲常在什么基础上发生
- A) 情感淡漠  
B) 情绪高涨  
C) 情绪不稳  
D) 木僵  
E) 违拗症
8. [单选题]男，60岁。急性重症胰腺炎保守治疗中，无尿3天。查体：BP180/92mmHg，P120次/分，双下肺满布细湿啰音。实验室检查：血钾6.9mmol/L，BUN25.2mmol/L，血肌酐577 μmol/L。目前应采取的最有效治疗手段是（ ）。
- A) 静脉滴注甘露醇利尿  
B) 口服甘露醇或硫酸镁导泻  
C) 紧急血液透析  
D) 袢利尿剂静脉注射  
E) 控制入液量，停止补钾
9. [单选题]医生为了帮助病人戒烟，在病人每次吸烟后给他服用某种能引起恶心、呕吐的药物，这样反复几次以后，病人就不再想吸烟了。这样的治疗方法称为
- A) 系统脱敏疗法  
B) 厌恶疗法  
C) 暴露疗法  
D) 冲击疗法  
E) 自我调整法
10. [单选题]1岁内婴儿百白破三联针接种时间为
- A) 出生时、1个月、3个月  
B) 出生时、1个月、6个月  
C) 2个月、3个月、4个月、  
D) 3个月，4个月、5个月  
E) 4个月、5个月，6个月
11. [单选题]女，33岁。间断腹痛，排黏液脓血便半年，加重1周，为明确诊断，最重要的检查是（ ）。
- A) 结肠镜  
B) 腹部X线平片  
C) 腹部B超  
D) 腹部血管造影  
E) 腹部CT
12. [单选题]机体对创伤或感染代谢反应不同于禁食代谢反应的主要特点为
- A) 机体能量消耗减少  
B) 处理葡萄糖的能力降低  
C) 体内蛋白质分解减慢  
D) 尿氮减少  
E) 脂肪动员减慢

13. [单选题]D/G易位型21-三体综合征的母亲为平衡易位染色体携带者，其核型应为
- A) 46, XX
  - B) 46, XX, -14, +t (14q21q)
  - C) 45, XX, -14, -21, +t (14q21q)
  - D) 46, XX, -21, +t (14q21q)
  - E) 45, XX, -21, +t (14q21q)
14. [单选题]患者女性，26岁，初孕妇。妊娠42+2周，无宫缩来院就诊。查子宫高度32cm，枕左前位，胎头已衔接，胎心率120次/分，进行宫缩素激惹试验，宫缩时重复出现晚期减速。最可能的诊断是
- A) 巨大胎儿
  - B) 临产
  - C) 先兆临产
  - D) 胎儿窘迫
  - E) 胎儿生长受限
15. [单选题]男，70岁，前列腺增生10年，口服药物治疗。1天前饮酒后出现不能自行排尿，下腹胀痛。首选的治疗方法是（ ）。
- A) 耻骨上膀胱穿刺
  - B) 前列腺切除手术
  - C) 耻骨上膀胱穿刺造瘘
  - D) 口服 $\alpha$ 1受体阻滞剂
  - E) 导尿并留置尿管
16. [单选题]男，6个月。患法洛四联症。近2天反复于哭闹时突然四肢抽搐，青紫加重，神志不清，呼吸急促，持续时间2~3分钟。主要原因是
- A) 脑栓塞
  - B) 心力衰竭
  - C) 肺动脉梗阻
  - D) 心包炎
  - E) 脑炎
17. [单选题]患儿女，4岁，自10个月起出现口唇青紫，哭闹后加剧，会走后常有蹲踞，平日少动。查体：胸骨左缘3、4肋间闻及Ⅲ级收缩期杂音，无震颤。股动脉血氧饱和度85%。胸部X线片：心脏轻度增大，右心室增大，肺纹理减少，肺动脉段凹陷。心电图示右心室肥大。最可能的诊断是
- A) 艾森门格综合征
  - B) 法洛四联症
  - C) 肺动脉瓣狭窄+房间隔缺损
  - D) 原发性肺动脉高压
  - E) 单纯肺动脉瓣狭窄
18. [单选题]市场经济对医学实践的作用决定了医学服务
- A) 与市场机制相容
  - B) 应该市场化
  - C) 不能引入市场机制
  - D) 必须有控制地引入市场机制
  - E) 以上都不是
19. [单选题]急性脓胸在病程上超过几周为慢性脓胸
- A) 3周
  - B) 6周

- C) 12周
- D) 24周
- E) 48周

20. [单选题]1岁以后小儿最常见的青紫型先天性心脏病

- A) 室间隔缺损
- B) 动脉导管未闭
- C) 法洛四联症
- D) 肺动脉狭窄
- E) 房间隔缺损

21. [单选题]木僵不见于

- A) 脑器质性精神障碍
- B) 焦虑症
- C) 精神分裂症
- D) 急性应激障碍
- E) 抑郁症

22. [单选题]男性，40岁，曾在国外居住多年，3年前回国，近半年持续低热，伴乏力，周身淋巴结肿大，口腔黏膜反复感染，大量抗生素治疗效果不佳，近来体重减轻，血常规示：白细胞低和贫血。此时应注意哪种疾病更合适

- A) 结核病
- B) 白塞病
- C) 传染性单核细胞增多症
- D) 艾滋病
- E) 亚急性变应性败血症

23. [单选题]与人兽共患病有关的病原体不包括

- A) 布鲁菌
- B) 炭疽芽胞杆菌
- C) 霍乱弧菌
- D) 鼠疫耶尔森菌
- E) 钩端螺旋体

24. [单选题]女，36岁。甲状腺功能亢进1年，甲状腺Ⅲ度肿大，待手术治疗，空腹、安静、平卧位时，T 37.8℃，P 104次/分，BP 130 / 90mmHg。应用简单方式计算该患者的基础代谢率为（ ）。

- A) 33kcal/d
- B) 57kcal/d
- C) 44kcal/d
- D) 22kcal/d
- E) 25kcal/d

25. [单选题]持续快促呼吸产生的酸碱平衡紊乱是

- A) 代谢性酸中毒
- B) 代谢性碱中毒
- C) 呼吸性酸中毒
- D) 呼吸性碱中毒
- E) 以上都不对

26. [单选题]比较微弱而持久的，具有一定渲染性的情绪状态，指的是

- A) 心境
- B) 激情

- C) 挫折
- D) 应激
- E) 情感

27. [单选题]大叶性肺炎主要病理学特点是

- A) 肺泡内出血
- B) 肺肉质变
- C) 肺组织广泛炎症并破坏
- D) 并发支气管扩张
- E) 肺泡腔内纤维素渗出

28. [单选题]抗尿崩症的药物是

- A) 氨苯蝶啶
- B) 螺内酯
- C) 塞米
- D) 他尼酸
- E) 氯噻嗪

29. [单选题]分娩时最主要的产力是

- A) 肛提肌收缩力
- B) 腹肌收缩力
- C) 膈肌收缩力
- D) 腹压力
- E) 子宫收缩力

30. [单选题]吡嗪酰胺不正确的叙述是

- A) 单独使用易产生耐药性
- B) 与异烟肼和利福平合用有协同作用
- C) 酸性环境下对结核杆菌有较强的抑制和杀灭作用
- D) 与其他抗结核药联合用于经一线抗结核药（如链霉素、异烟肼、利福平及乙胺丁醇）治疗无效的结核病
- E) 常用于肝功能不良者

31. [单选题]坐位乘车时，急刹车，右膝前方受到撞击，出现右髌剧痛，髌关节运动障碍，处于屈曲、内收、内旋畸形状态。应诊断为

- A) 股骨颈骨折
- B) 股骨转子间骨折
- C) 股骨转子下骨折
- D) 髌关节后脱位
- E) 髌关节前脱位

32. [单选题]一农妇，56岁，诉阴道一物脱出3年，妇查：宫颈已脱出至阴道口外，子宫体在阴道内，双附件正常，应该诊断子宫脱垂几度

- A) I度重
- B) II度轻
- C) II度重
- D) III度
- E) I度轻

33. [单选题]下列哪种乳腺疾病可引起橘皮样外观

- A) 纤维腺瘤
- B) 纤维囊性乳腺病

- C) 导管原位癌
- D) 导管浸润癌
- E) 小叶原位癌

34. [单选题]为探讨儿童白血病的病因，选择200例 确诊白血病的儿童，同时选择200例同期同医院无白血病的儿童，然后调查其母亲孕期X线照射情况，此研究方法为

- A) 现况研究
- B) 病例对照研究
- C) 队列研究
- D) 回顾性前瞻研究
- E) 临床试验研究

35. [单选题]以下不会引起低血容量休克的是

- A) 患者发生大出血，但是已经给予输血、输液治疗
- B) 严重体液丢失
- C) 各种创伤致有效血容量减少
- D) 迅速失血超过全身总血量的百分之二十
- E) 包括流产大出血致血容量减少

36. [单选题]智能低下，特殊面容是

- A) 先天性甲状腺功能减低症
- B) 佝偻病
- C) 软骨发育不全
- D) 垂体性侏儒症
- E) 先天性巨结肠

37. [单选题]急性白血病的骨髓象特点是

- A) 骨髓增生极度低下
- B) 大量原始细胞
- C) 一系以上病态造血
- D) 骨髓纤维化
- E) R-S细胞

38. [单选题]下列哪项不是桡骨头半脱位的发病因素

- A) 环状韧带薄弱
- B) 前臂的旋转外力
- C) 患肢前臂受牵引力后桡骨头向远端滑移
- D) 桡骨头未发育好
- E) 环状韧带卡压在肱桡关节内

39. [单选题]不法人员干扰医疗秩序妨碍医务人员工作生活时，必须

- A) 受到刑事处罚
- B) 受到相应行政处罚
- C) 依法承担法律责任
- D) 被处以高额罚款
- E) 剥夺其就医的权利

40. [单选题]中度：pH值正常，PaO<sub>2</sub>偏低，PaCO<sub>2</sub>仍正常，提示

- A) 哮喘处于早期，有轻度过度通气，支气管痉挛不严重
- B) 哮喘处于早期，有过度通气，支气管痉挛较重
- C) 患者通气不足，支气管痉挛较明显，病情转重

D) 严重通气不足，支气管痉挛和严重阻塞，多发生在哮喘持续状态

E) 严重通气不足，支气管痉挛较明显，多发生在哮喘持续状态

41. [单选题] 环丙沙星抗菌范围不包括

A) 铜绿假单胞菌

B) 伤寒沙门菌

C) 放线菌属

D) 沙眼衣原体

E) 金黄色葡萄球菌

42. [单选题] 下尿路梗阻可引起

A) 急性心衰

B) 肾前性肾衰竭

C) 肾后性肾衰竭

D) 肾性肾衰竭

E) 急性肝衰竭

43. [单选题] 肝素、双香豆素

A) 脑保护剂

B) 抗凝治疗

C) 溶栓治疗

D) 血液稀释疗法

E) 脑代谢活化剂

44. [单选题] 有关炎症介质的描述，错误的是

A) 可引起组织增生

B) 可引起血管扩张

C) 可引起血管通透性增加

D) 可具有趋化作用

E) 可引起发热和疼痛

45. [单选题] 心肌炎病因多是

A) 细菌感染

B) 真菌感染

C) 原虫感染

D) 病毒感染

E) 立克次体感染

46. [单选题] 大量呕吐可导致（ ）。

A) 低渗性脱水

B) 高渗性脱水

C) 慢性脱水

D) 等渗性脱水

E) 继发性脱水

47. [单选题] 能使胰蛋白酶原转变为胰蛋白酶最重要的物质是

A) 胃酸

B) 胰蛋白酶

C) 糜蛋白酶

D) 肠激活酶

E) 组织液

48. [单选题]3岁女孩，反复咳嗽2个月。查体：体温正常，浅表淋巴结（-），咽（-），两肺布满哮鸣音，无水泡音，反复抗生素治疗不愈，以往无呛咳病史，有过敏性鼻炎。首选的治疗是
- A) 抗生素+沙丁胺醇
  - B) 利巴韦林（病毒唑）+特布他林
  - C) 丙酸倍氯米松+沙丁胺醇
  - D) 骨化三醇+氨基酸
  - E) 多巴酚丁胺+丙酸倍氯米松
49. [单选题]最容易导致股骨头无菌性坏死的药物是（ ）。
- A) 长春新碱
  - B) 糖皮质激素
  - C) 雷公藤多苷
  - D) 甲氨蝶呤
  - E) 羟基热氯唑
50. [单选题]丙米嗪
- A) 使突触间隙的NA浓度下降
  - B) 对心肌有奎尼丁样作用
  - C) 阻断N胆碱受体
  - D) 阻断D1、D2受体
  - E) 以上均不是
51. [单选题]脓肿
- A) 具有两端开口的病理性通道
  - B) 只有一端开口的盲管
  - C) 表面或粘膜上皮坏死脱落形成较深缺损
  - D) 单个毛囊发生的化脓性炎
  - E) 多个毛囊发生的化脓性炎
52. [单选题]血管紧张素转化酶抑制药卡托普利降压作用不包括
- A) 抑制局部组织中肾素-血管紧张素-醛固酮系统
  - B) 抑制循环中的肾素-血管紧张素-醛固酮系统
  - C) 减少缓激肽的降解
  - D) 阻滞钙通道，抑制Ca<sup>2+</sup>内流
  - E) 抑制体内醛固酮和肾上腺素的释放
53. [单选题]男，63岁。因小肠穿孔行小肠部分切除吻合术后5天，诉切口疼痛，查体：敷料上少量脓性分泌物，切口下端红肿，压痛，挤压时有少量脓性分泌物。正确的处理是（ ）。
- A) 拆开皮肤缝线，彻底清创后再次缝合
  - B) 伤口全层拆开，彻底清创后缝合
  - C) 无需拆开皮肤缝线，直接塞入引流物
  - D) 无需拆开皮肤缝线，用酒精湿敷伤口
  - E) 拆开皮肤缝线，清创后放置引流物
54. [单选题]人体运动时导致血压升高，可引起
- A) 外周血管收缩
  - B) 主动脉弓压力感受器抑制
  - C) 颈动脉窦压力感受器兴奋
  - D) 心迷走神经传出冲动减少
  - E) 心率加快



55. [单选题]女，46岁。糖尿病史3年，经饮食治疗并服二甲双胍，病情控制良好。近日受凉后发热，咳嗽，咳黄痰。X线检查为右下肺炎。血糖 $18.6\text{mmol/L}$ ，尿糖++++。对该患者除治疗肺炎外，糖尿病的处理应
- A) 用胰岛素治疗
  - B) 增加二甲双胍剂量
  - C) 改用格列吡嗪
  - D) 加用格列吡嗪
  - E) 加用 $\alpha$ -葡萄糖苷酶抑制剂
56. [单选题]下列各项中，不属于医学道德基本原则的是
- A) 保密原则
  - B) 尊重原则
  - C) 不伤害原则
  - D) 有利原则
  - E) 公正原则
57. [单选题]肝源性水肿的特点是
- A) 从头面部开始延及全身
  - B) 失代偿期肝硬化主要表现为腹水
  - C) 软而移动性大
  - D) 主要与钠水潴留有关
  - E) 以上都不是
58. [单选题]能阻断组胺 $H_2$ 受体且不良反应较少的药物是
- A) 西咪替丁
  - B) 氯苯那敏
  - C) 雷尼替丁
  - D) 奥美拉唑
  - E) 哌仑西平
59. [单选题]男，47岁，农民。持续高热3天，尿少1天。查体：意识清楚，皮肤及巩膜轻度黄染，面部及前胸不明显充血，双腋下可见“鞭击样”出血点。实验室检查：血WBC  $18.2 \times 10^9/L$ ，PLT  $60 \times 10^9/L$ ，ALT  $140U/L$ ，TBIL  $45\mu\text{mol/L}$ ，尿蛋白（++）。最可能的诊断是（ ）。
- A) 肾综合征出血热
  - B) 急性肾小球肾炎
  - C) 急性黄疸型肝炎
  - D) 钩端螺旋体病
  - E) 败血症
60. [单选题]关于闭经的诊断，下列哪项是错误的
- A) 孕激素试验（+）--卵巢能分泌雌激素
  - B) 雌孕激素试验（-）--原因在子宫
  - C) 刮取内膜检查可确定闭经类型
  - D) 女性第二性征发育良好--原因在子宫
  - E) 基础体温双相--原因在子宫
61. [单选题]女，47岁，4年反复胃区不适，疼痛暖气，胃镜检查：胃窦部粘膜红白相间以白为主，可见血管分支透见并做活检病理。哪项病理改变为癌前病变
- A) 炎症细胞浸润
  - B) 腺体萎缩
  - C) 中度以上不典型增生

- D) 肠腺化生
- E) 假性幽门腺化生

62. [单选题] 失眠症治疗时最常用的药物是

- A) 多塞平
- B) 阿米替林
- C) 奋乃静
- D) 地西洋类
- E) 氯丙嗪

63. [单选题] 产褥感染中最常见的为

- A) 急性输卵管炎
- B) 急性盆腔结缔组织炎
- C) 急性子宫内膜炎及子宫肌炎
- D) 急性盆腔腹膜炎
- E) 血栓性静脉炎

64. [单选题] 患者，男，15岁。足部刺伤2小时，已接受计划性混合疫苗注射，为预防破伤风，最重要的正确的处置是

- A) 刺伤部切开不予缝合
- B) 注射TAT750U
- C) 注射TAT1500U
- D) 注射TAT3000U
- E) 注射破伤风类毒素0.5ml

65. [单选题] 患者男性，60岁，突发胸痛、呼吸困难2小时入急诊。查体：BP140/90mmHg，R28次/分，端坐呼吸，口唇青紫。双肺可闻及大中水泡音，HR130次/分，可闻及S4奔马律。1年来有间断胸骨后胸痛发作，多在行走速度较快或体力活动时出现，休息后约3~5分钟可自行缓解。该患者突发呼吸困难最可能的原因是

- A) 支气管哮喘
- B) 气胸
- C) 双侧肺炎
- D) 急性左心衰
- E) 主动脉夹层

66. [单选题] 可引起促胰液素的释放，从而促进胰液、胆汁和小肠液的分泌最强的物质是

- A) 脂肪酸
- B) 氨基酸
- C) 甘油
- D) 盐酸
- E) 乳酸

67. [单选题] 男，35岁。B超发现右输尿管上段结石，大小1.2cm×0.8cm，合并轻度右肾积水。无发热，静脉尿路造影（IVU）显示右输尿管上段结石，右肾轻度积水，输尿管显影。首选的治疗方法是（ ）。

- A) 体外冲击波碎石
- B) 输尿管镜碎石取石
- C) 经皮肾镜碎石取石
- D) 开放输尿管切开取石
- E) 腹腔镜输尿管切开取石

68. [单选题] 男，46岁，右季肋部不适，食欲下降两年，腹胀、下肢浮肿1个月，近4天来腹痛、发热、腹胀加重。体检：脾肋下2.0cm，移动性浊音(+)，Hb72g/L，ALB26g/L。腹水检查：淡黄色，比重1.017，蛋白25g/L，细胞总数6000×10

6

/L, 白细胞 $560 \times 10$

6

/L, 中性80%。最可能的诊断是

- A) 肝硬化合并结核性腹膜炎
- B) 肝硬化合并自发性腹膜炎
- C) 肝硬化门静脉血栓形成
- D) 肝硬化合并原发性肝癌
- E) 肝肾综合征

69. [单选题]治疗变异型心绞痛疗效最好的是

- A) 硝酸酯类
- B)  $\alpha$ 受体阻滞剂
- C)  $\beta$ 受体阻滞剂
- D) 钙拮抗剂
- E) 血管紧张素转换酶抑制剂

70. [单选题]吸烟男性, 近一年来右下肢行走后疼痛, 休息后好转, 出现间歇性跛行, 近一月来, 右脚趾指变黑、皱缩, 失去知觉, 该病变属于

- A) 固缩坏死
- B) 干性坏疽
- C) 液化性坏死
- D) 干酪样坏死
- E) 湿性坏疽

71. [单选题]女, 30岁。低热、盗汗、腹痛、腹胀2个月。查体: 巩膜无黄染, 颈静脉无怒张, 腹部移动性浊音阳性。腹水比重1.024, 蛋白定量40g/L。最可能的诊断是( )。

- A) 肝硬化腹水
- B) 门静脉血栓形成
- C) 卵巢囊肿
- D) 缩窄性心包炎
- E) 结核性腹膜炎

72. [单选题]梨形心见于

- A) 主动脉瓣狭窄
- B) 二尖瓣狭窄
- C) 肺动脉瓣狭窄
- D) 三尖瓣狭窄
- E) 主动脉瓣关闭不全

73. [单选题]患者女, 50岁。患有慢性阻塞性肺疾病(COPD)支气管炎型, 近1周受凉后咳嗽、气急加重, 咳脓性痰。血气分析: PaO

2

7.3kPa(55mmHg), PaCO

2

10kPa(75mmHg)。根据血气分析结果, 该患者的呼吸功能障碍为

- A) 通气功能障碍
- B) 换气功能障碍
- C) 通气和换气功能障碍并存

- D) 肺泡膜增厚所致弥散功能降低
- E) 通气 / 血流比例增高

74. [单选题]发生心脏骤停后，应首先进行的抢救措施是（ ）。

- A) 胸外按压
- B) 清理呼吸道
- C) 心前区撞击
- D) 注射肾上腺素
- E) 人工呼吸

75. [单选题]关于内耳的描述错误的是

- A) 位于颞骨岩部的骨质内
- B) 是听觉和位觉感受器所在的部位
- C) 膜迷路内充满内淋巴
- D) 骨迷路和膜迷路之间充满外淋巴
- E) 内、外淋巴经蜗孔相通

76. [单选题]脑出血病人CT扫描图像为

- A) 起病24~48小时后可见异常高密度影
- B) 起病后即可见低密度异常影
- C) 可见脑室扩大
- D) 起病后24小时内无变化
- E) 起病后即可见异常高密度影

77. [单选题]双胍类降血糖药物主要适用于

- A) 妊娠期糖尿病
- B) 肥胖的1型糖尿病
- C) 消瘦的1型糖尿病
- D) 肥胖的2型糖尿病
- E) 消瘦的2型糖尿病

78. [单选题]呼吸呈蒜味的毒物是

- A) 亚硝酸盐
- B) 安定
- C) 阿托品
- D) 酒精
- E) 有机磷农药

79. [单选题]胆道蛔虫病的疼痛是

- A) 阵发性绞痛
- B) 持续性疼痛
- C) 持续性疼痛阵发性加剧
- D) 持续闷胀痛
- E) “钻顶样”绞痛

80. [单选题]有关意志行动的基本特征描述不正确的是

- A) 意志行动体现在克服困难的行动中
- B) 意志行动是受情绪、情感调节
- C) 意志行动有三项基本特征
- D) 意志行动是有目的的行动
- E) 意志行动以随意运动为基础

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/878001040114006072>