

肿瘤科远秋部分题库

1、区别良、恶性肿瘤的重要形态学依据是

- A、生长方式
- B、实质与间质的比例
- C、异型性
- D、生长速度
- E、间质的类型

正确答案：C

异型性是指肿瘤组织在细胞形态和组织结构上，都与其发源的正常组织有不同程度的差异。区别异型性的大小是诊断肿瘤、确定其良恶性的主要组织学依据。

2、下列哪项关于恶性肿瘤发生、发展的描述是错误的

- A、肿瘤是一种基因病
- B、累计癌基因的改变
- C、单个基因改变即可引起细胞恶性转化
- D、累计肿瘤抑制基因的改变
- E、累计DNA修复基因的改变

正确答案：C

肿瘤在本质上是基因病。各种环境和遗传致癌因素以协同或序贯的方式引起DNA损害，从而激活原癌基因和(或)灭活肿瘤抑制基因，加上凋亡调节基因和(或)修复基因的改变，继而引起表达水平的异常，使靶细胞发生转化。被转化的细胞呈克隆性的增生，经过一个漫长、多阶段的演进过程，选择性地形成具有不同特点的亚克隆(异质化)，从而获得浸润和转移的能力(恶性转化)。

3、胃癌术后患者的晚期并发症不包括

- A、倾倒综合征
- B、贫血
- C、反流性食管炎
- D、吻合口瘘
- E、残胃癌

正确答案：D

吻合口瘘属于胃癌术后早期并发症，原因多为组织水肿、营养不良、吻合技术欠缺等。其余选项均属于胃癌术后晚期并发症。

4、世界卫生组织提出的肿瘤治疗近期客观反映标准病灶稳定(SD)是指

- A、肿瘤缩小不足50%或增大不足25%
- B、肿瘤缩小不足50%或增大不足50%
- C、肿瘤缩小不足25%或增大不足25%
- D、肿瘤缩小不足25%或增大不足50%
- E、肿瘤增大不足50%至少4个星期

正确答案：A

WHO实体瘤疗效评价标准：完全缓解(CR)：肿瘤完全消失超过1个月。部分缓解(PR)：肿瘤最大直径及最大垂直直径的乘积缩小达50%，其他病变无增大，持续超过1个月。病变稳定(SD)：病变两径乘积缩小不超过50%，增大不超过25%，持续超过1个月。病变进展(PD)：病变两径乘积增大超过25%。

5、下列哪项不是WHO癌痛药物治疗的主要原则

- A、口服给药
 - B、按需给药
 - C、按时给药
 - D、按阶梯给药
 - E、用药应个体化
- 正确答案：B

癌痛应首选口服给药，尽可能避免创伤性给药途径，便于病人长期用药。止痛药应当有规律地按时”给药(3~6小时给药一次)，而不是“按需”给药(即只在疼痛时给药)。按照患者疼痛评分，予以三级阶梯止痛治疗原则。镇痛药用量因人而异，不同病人的有效止痛剂量差别很大。对每一个体具体选定符合该个体的剂量，即实施个体化。

6、WHO提出通过合理的生活饮食习惯预防癌症的五点建议不包括

- A、增加动物脂肪
- B、增加粗纤维的摄入
- C、增加新鲜水果和蔬菜
- D、减少肉食
- E、避免肥胖

正确答案：A

世界卫生组织提出通过合理的生活饮食习惯预防癌症的5条建议：①避免动物脂肪。②增加粗纤维。③减少肉食。④增加新鲜水果和蔬菜。⑤避免肥胖。

7、不属于癌前病变的是

- A、腺纤维腺瘤
- B、乳腺纤维囊性病
- C、结肠腺瘤性息肉病
- D、慢性萎缩性胃炎
- E、黏膜白斑

正确答案：A

从正常组织到发生癌变的中间阶段称为癌前病变。常见的癌前病变有：黏膜白斑、宫颈糜烂、乳腺纤维囊性病、慢性萎缩性胃炎、胃肠多发性息肉、慢性溃疡、卵巢囊肿、慢性乙肝、肝硬化、色痣等。

8、鼻咽癌治疗的主要手段首选是

- A、手术
- B、化疗
- C、放疗
- D、生物治疗
- E、中药治疗

正确答案：C

鼻咽癌病变位于头颅中央，常侵犯至邻近的咽旁间隙、颅底骨质及脑神经等，外科手术困难。鼻咽癌对放射线较敏感，故放疗

成为其首选及主要的治疗方法，目前常用放化疗联合方案提高疗效。

9、下列关于肿瘤病因的叙述中，错误的是

- A、吸入放射污染粉尘可致骨肉瘤和甲状腺肿瘤等
- B、生物致癌主要是指致癌真菌
- C、烧伤深瘢痕长期存在易癌变
- D、遗传因素是不容忽视的致癌因素之一
- E、先天或后天免疫缺陷者易发生恶性肿瘤

正确答案： B

肿瘤发病生物因素主要是病毒，如EB病毒、乳头瘤病毒、乙型肝炎病毒等均有促癌作用，正确答案是B。

10、与肿瘤的临床表现无关的是



- A、肿瘤的性质
- B、发生组织
- C、所在部位
- D、发展程度
- E、地域差别

正确答案： E

肿瘤类型可能有地区差异，但是临床表现却与此无关。

11、对于肿瘤的全身症状，描述较为严谨的是

- A、疼痛
- B、食欲欠佳
- C、多无明显的全身症状，或仅有非特异性的全身症状
- D、出血
- E、感染

正确答案： C

肿瘤可以导致疼痛、食欲欠佳、出血和感染，但大多数没有显著的全身症状，或仅有非特异性的全身症状。

12、肿瘤确诊直接而可靠的证据是

- A、肿瘤特异标志物
- B、影像学检查
- C、内镜检查
- D、病理形态学检查
- E、基因诊断

正确答案： D

病理学诊断是确诊的“金指标”。

13、恶性肿瘤目前最有效的治疗方法

- A、手术治疗
- B、化学疗法
- C、放射疗法
- D、生物治疗
- E、中医药治疗

正确答案：A

尽管目前治疗肿瘤的方法越来越多，但目前最为有效的治疗方法仍然是手术切除。

14、对于术前进行过化疗的患者，麻醉方式的选择主要是



- A、局部麻醉
- B、硬膜外麻醉
- C、全身麻醉
- D、局麻加硬膜外麻醉
- E、针刺麻醉

正确答案：C

绝大多数肿瘤化疗后会导致骨髓抑制，尤其会导致凝血功能障碍，所以选择全身麻醉为宜。

15、下列是肿瘤特异性抗原的是

- A、CEA
- B、黑色素细胞分化抗原
- C、MAGE家族
- D、肝炎病毒HBV
- E、AFP

正确答案：D

肿瘤抗原分为肿瘤特异性抗原和肿瘤相关抗原两大类。特异性抗原包括：化学致癌剂或物理因素诱发的肿瘤抗原、病毒抗原和突变抗原；而肿瘤相关抗原主要包括：过表达抗原、CT抗原和分化抗原。除肝炎病毒以外均是肿瘤相关抗原。

16、下列属肿瘤特异性免疫疗法的是

- A、接种卡介苗
- B、接种短棒状杆菌
- C、转移因子
- D、干扰素
- E、接种自身的瘤苗

正确答案：E

17、患者男，59岁。大便带鲜血，坠胀感半年，近月来排脓血样便，按“痢疾”治疗2周，稍好转，疑有肿瘤。首选的检查是

- A、直肠指检
- B、肛肠镜检查

- C、乙状结肠镜检
- D、X线钡剂灌肠检查
- E、腹部B超检查

正确答案：A

18、患者男，40岁。痰中带血半月，经纤支镜检查，病理示小细胞未分化癌，应首选

- A、手术治疗
- B、全身化疗
- C、局部放疗
- D、局部化疗
- E、中药治疗

正确答案：B

细胞类型决定应首选全身化疗。

19、患者男，42岁。右上腹痛2个月，伴发热、乏力、纳差。查体：T 38.6°C，巩膜轻度黄染，心肺正常，肝肋下3cm，质硬，表面有结节，最有助于诊断的诊断是

- A、腹部CT
- B、测血清AFP
- C、肝穿刺病理检查
- D、腹部B超
- E、肝脏血管造影

正确答案：C

20、为IV期肿瘤患者拟订的治疗方案是

- A、以手术治疗为主
- B、以局部治疗为主，辅以全身化疗
- C、以全身治疗为主，辅以局部对症治疗
- D、采取综合治疗，手术前、后及术中放化疗
- E、局部放疗，辅以全身治疗

正确答案：C

肿瘤综合治疗方案：I期以手术治疗为主；II期以局部治疗为主，原发肿瘤切除或放疗，必须包括转移灶的治疗，辅以有效的全身化疗；III期采取综合治疗，手术前、后及术中放疗或化疗；IV期则以全身治疗为主，辅以局部对症治疗。

21、肿瘤化疗不常见的副反应有

- A、白细胞、血小板减少
- B、消化道反应
- C、毛发脱落
- D、过敏反应
- E、免疫功能降低，容易并发细菌或真菌感染

正确答案：D

22、对于鼻咽癌患者，为明确病变侵犯范围、颈淋巴结的转移情况应选下列哪种检查方法?



- A、X线平片检查
- B、同位素检查
- C、MRI
- D、超声检查

正确答案: C

23、免疫功能状态评估主要包括体液免疫功能检测和细胞免疫功能检测。不属于细胞免疫功能检测的是:

- A、T细胞计数
- B、NK细胞活性测定
- C、吞噬细胞功能测定
- D、B细胞计数

正确答案: D

24、轻链病患者本周氏蛋白检测时应考虑以下哪项因素?

- A、化学法较灵敏
- B、化学法操作繁琐
- C、血标本的检出率不如尿标本
- D、化学法可确定轻链的型别

正确答案: C

25、肿瘤细胞与正常细胞的区别在于其分化程度相对低下，达不到正常细胞的成熟程度。良性肿瘤细胞分化程度_____，与其起源组织相似；恶性肿瘤细胞分化程度_____，其形态和功能代谢与正常细胞差别很大。

- A、高，高
- B、高，低
- C、低，高
- D、低，低

正确答案: B

26、NK细胞是一类在肿瘤早期起作用的效应细胞，是机体抗肿瘤的第一道防线。NK细胞杀伤肿瘤细胞_____预先致敏，杀伤作用_____MHC限制性和肿瘤特异性。

- A、需要，有
- B、不需，无
- C、需要，无
- D、不需，有

正确答案: B

27、将有免疫活性的自体或异体的免疫细胞输给患者，提供其现有的免疫力以对抗肿瘤，如输入LAK细胞或肿瘤浸润细胞等。造血干细胞移植可重建受者的造血与免疫功能，也属于这类治疗。这种免疫为:

- A、主动性免疫

- B、被动性免疫
- C、继承免疫
- D、细胞因子

正确答案: C

28、基因突变的方式有简单的转换、颠换、移码突变和动态突变。诱发关键基因产生突变是导致肿瘤发生的启动事件。细胞内突变可引起肿瘤的基因包括:

- A、原癌基因和抑癌基因
- B、原癌基因
- C、抑癌基因
- D、以上均不是

正确答案: A

29、患者, 女性, 30岁, 突然呕血, 黑便, 阴道出血及全身紫癜, 伴发热及贫血。血液检查: Hb70g/L, RBC 2.3×10^{12} /L, WBC 35×10^9 /L, PLT 38×10^9 /L。此病人目前首先需要检查的是:

- A、骨髓涂片检查
- B、毛细血管脆性试验
- C、Hams试验
- D、Coombs试验

正确答案: A

30、下列哪项可能是导致血清总蛋白增高的原因?

- A、营养不良
- B、消耗增加
- C、脱水
- D、肝功能障碍

正确答案: C

31、男, 30岁, 出现头痛、走路不稳1周, 疑小脑占位, 最好应选择下列哪种检查方法确诊?

- A、头颅正侧位X线片
- B、头颅CT平扫
- C、头颅MRI平扫
- D、头颅MRI平扫+增强

正确答案: D

32、8岁男性儿童, 因生长发育迟滞, 头颅平片发现蝶鞍区域有钙化, 疑为颅咽管瘤, 需进一步确诊, 可选择以下哪种检查方法?

- A、头颅CT或MRI
- B、PET-CT
- C、超声波
- D、SPECT

正确答案: A

33、CT的全称是什么？

- A、计算机体层摄影
- B、高千伏摄影
- C、X线断层片
- D、SPECT

正确答案：A

34、不会引起中性粒细胞增加的疾病是：

- A、脾功能亢进
- B、尿毒症
- C、急性链球菌感染
- D、烧伤

正确答案：A

35、下列哪种组织使超声传播的衰减最小？

- A、肌肉
- B、脂肪
- C、骨骼
- D、血液

正确答案：D

36、下列关于磁共振检查叙述不正确的是：

- A、无放射性损伤，安全可靠
- B、无骨伪影存在
- C、是胃肠道病变的首选检查方法
- D、对呼吸系统的病变显示和诊断还远远不及CT

正确答案：C

37、对于梗阻性黄疸患者，可以替代ERCP检查的方法是：



- A、MRI
- B、MRCP
- C、CT
- D、B超

正确答案：B

38、对于子宫内膜癌、宫颈癌分期最具价值的检查方法是哪种？

- A、MRI
- B、X线
- C、超声

D、CT

正确答案：A

39、对于骨转移瘤最敏感的影像学检查方法是：

A、MRI

B、CT

C、X线

D、核素扫描

正确答案：A

40、为了获得多参数、多方位的图像，应选择下列哪种检查方法？

A、CT

B、MRI

C、X线

D、超声

正确答案：B

41、早期妊娠只能用哪种检查诊断？

A、透视

B、摄片

C、CT

D、B超

正确答案：D

42、对于青年致密型乳腺病变最有价值的检查方法是：

A、X线钼靶摄片

B、超声检查

C、CT

D、MRI 正确答案：D

43、恶性黑色素瘤免疫组化标记物是：

A、CDX-2

B、UEA-1

C、HMB-45

D、TTF-1

正确答案：C

44、X线数字成像的优点有：

A、提高了图像密度分辨力与显示能力

B、不能进行图像处理，降低了信息的显示功能

C、增加了X线曝光量

D、曝光宽容度减少

正确答案: A

45、超声波是人耳听不到的声波, 其频率大于多少赫兹?

A、1000Hz

B、2000Hz

C、20kHz

D、10kHz

正确答案: C

46、滤泡树突状细胞免疫组化标记物是:

A、CD10

B、CD23

C、CD138

D、CD21

正确答案: D

47、下列不属于胆囊癌声像图类型的是?

A、硬化型

B、蕈伞型

C、厚壁型

D、混合型

正确答案: A

48、属于癌基因和抑癌基因的是:

A、c-erbb-2

B、ER

C、PR

D、ALK

正确答案: A

49、B淋巴细胞免疫组化标记物是:

A、CD45RO

B、CD3

C、CD20

D、CD34

正确答案: C

50、下列关于磁共振检查叙述正确的是:

A、磁共振检查对钙化显示敏感

B、比CT有更高的软组织分辨力

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/887044055126006063>