

护理三基复习题库与答案

1、慢性肾衰竭病人的内生肌酐清除率(Ccr)为多少时提示已进入尿毒症期:

()

A、 $<10 \text{ ml / min}$

B、 $<20 \text{ ml / min}$

C、 $<25 \text{ ml / min}$

D、 $<50 \text{ ml / min}$

答案: A

2、关于血尿的叙述, 错误的是:()

A、血尿即尿液中带血液

B、1000ml 尿中含 10ml 血液即呈肉眼血尿

C、借助显微镜见到尿液中含红细胞即为镜下血尿

D、根据尿液中血液含量的多少将血尿分为镜下血尿和肉眼血

答案: B

3、在代谢性酸中毒的治疗和护理中, 错误的做法是: ()

A、密切观察呼吸频率和深度的变化

B、仔细记录 24 小时出入液量及体重的改变

C、应快速、足量补碱

D、注意神志改变

答案: C

4、消化道内支架放置术后几小时可进食: ()

A、0 小时

B、2 小时

C、6 小时

D、12 小时

答案: B

5、临终病人经常抱怨, 甚至斥责医护人员和家属, 此心理反应期为: ()

A、否认期

B、愤怒期

C、协议期

D、忧郁期

答案: B

6、使用甘露醇时错误的一项是: ()

A、静滴时不与其他药物混合使用

B、心功能不全及急性肺水肿病人禁用

- C、可用作肌内注射
- D、密切观察病人的血压、脉搏和呼吸，以防出现心功能不全

答案：C

7、下列哪项不是清洁的目的：（ ）

- A、去除潜在的病原微生物
- B、减少接触感染的机会
- C、保持物品美观
- D、预防医院感染

答案：C

8、决定护理质量的关键因素是护理人员的：（ ）

- A、工作态度和行为
- B、护理技术
- C、经验
- D、学历

答案：A

9、重症肌无力病人注射腾喜龙后症状减轻，此时应采取的措施为：（ ）

- A、减少抗胆碱酯酶药物剂量
- B、增加抗胆碱酯酶药物剂量
- C、停用抗胆碱酯酶药物
- D、对抗胆碱酯酶药物不敏感，改用其他治疗方法

答案：B

10、慢性肾衰病人要求热能供应充足，每日应摄入：（ ）

- A、2000~2500 kcal
- B、1500kcal
- C、3000kcal
- D、1000kcal

答案：A

11、临床上最常见的胎方位是：（ ）

- A、枕右前位
- B、枕左前位
- C、骶左前位
- D、枕左后位

答案：B

12、脊神经共有多少对：（ ）

- A、7对

- B、8 对
- C、12 对
- D、31 对

答案：D

13、原发性闭经是指年满几岁后无月经来潮者：（ ）

- A、12 岁
- B、14 岁
- C、16 岁
- D、18 岁

答案：D

14、原发性血小板减少性紫癜的发病机理为：（ ）

- A、机体产生血小板抗体
- B、骨髓造血功能紊乱
- C、毛细血管变态反应性疾病
- D、凝血因子缺乏

答案：A

15、在倾听病人说话时，不妥的行为是：（ ）

- A、全神贯注地听
- B、及时评论病人所谈内容
- C、保持目光接触
- D、适宜的距离

答案：B

16、急性肾衰竭病人每日饮食中所提供的热量应为：（ ）

- A、 $>126 \text{ kJ/kg} \cdot \text{d}$
- B、 $>146 \text{ kJ} / \text{kg} \cdot \text{d}$
- C、 $>1500 \text{ kJ/kg} \cdot \text{d}$
- D、 $>100 \text{ kJ} / \text{kg} \cdot \text{d}$

答案：A

17、抗疟原虫治疗的常用药物中，用于控制复发、中断传播途径的药物是：
（ ）

- A、氯奎
- B、奎宁
- C、伯氨奎
- D、乙胺嘧啶

答案：C

18、先天性巨结肠患儿行回流灌肠时，错误的是：（ ）

- A、选用生理盐水溶液
- B、选用清水灌肠
- C、灌肠前需摄片确定插肛管深度和方向
- D、以轻柔手法按肠曲方向缓慢插入肛管

答案：B

19、滴虫性阴道炎白带的特征为：（ ）

- A、干酪样
- B、豆渣样
- C、黄水样
- D、稀薄泡沫状

答案：D

20、急性肾衰竭病人接受血液透析治疗时蛋白质摄入量应为：（ ）

- A、0.5 g/kg·d
- B、1.0~1.2 g/kg·d
- C、1.2~1.3 g/kg·d
- D、0.8 g/kg·d

答案：B

21、高血压的诊断标准是：（ ）

- A、收缩压 \geq 130 mmHg 和或舒张压 \geq 90 mmHg
- B、收缩压 \geq 140 mmHg 和或舒张压 \geq 100 mmHg
- C、收缩压 \geq 150 mmHg 和或舒张压 \geq 100 mmHg
- D、收缩压 \geq 140 mmHg 和或舒张压 \geq 90 mmHg

答案：D

22、内源性感染又称为：（ ）

- A、自身感染
- B、交叉感染
- C、显性感染
- D、隐性感染

答案：A

23、护士在制定计划中列出“3天内病人自觉腹胀症状减轻”，这是：（ ）

- A、护理诊断
- B、护理措施
- C、护理目标
- D、护理评价

答案：C

24、常用的呼吸机管路消毒方法不包括：（）

- A、2%戊二醛溶液浸泡消毒
- B、甲醛熏蒸消毒
- C、高温、高压消毒
- D、环氧乙烷消毒

答案：B

25、借空气传导的声音受到外耳道、中耳病变的阻碍，到达内耳的声能减弱，致使不同程度听力减退者称：（）

- A、感音性聋
- B、传导性聋
- C、混合性聋
- D、噪声性聋

答案：B

26、服用吩噻嗪类抗精神病药物的病人应注意：（）

- A、服药后卧床1小时，起床动作宜慢，不应突然改变体位
- B、服药后卧床半小时，起床动作宜慢，不应突然改变体位
- C、服药后可活动，动作慢，突然改变体位不受影响
- D、服药后卧床1小时起床，改变体位不受影响

答案：A

27、骨折的局部症状不包括：

- A、畸形
- B、弹性固定
- C、骨擦音
- D、异常活动

答案：B

28、沿胸骨外侧缘所作的垂线称为：（）

- A、胸骨旁线
- B、胸骨线
- C、前正中线
- D、锁骨中线

答案：B

29、全髋关节置换术后病人的健康教育内容不包括：（）

- A、禁止病人转向手术侧取物
- B、禁止使用足底静脉泵或弹力袜

C、禁止二郎腿动作

D、避免坐凳过低

答案：B

30、以下皮肤科外用药物剂型的选择，错误的是：（ ）

A、急性渗出性皮肤损害选择振荡剂

B、亚急性皮肤损害选择油剂或糊剂

C、慢性皮肤损害选择软膏

D、有皮肤破损以瘙痒为主的选择酊剂

答案：D

31、食管内支架术后病人宜采取的体位是：（ ）

A、平卧位

B、侧卧位

C、端坐位

D、床头抬高 5~10cm

答案：D

32、下列哪项是老年人生理功能变化引起的：（ ）

A、老视

B、高血压

C、糖尿病

D、冠心病

答案：A

33、有关新生儿病理性黄疸的特点，错误的是：（ ）

A、黄疸出现早、进展快

B、黄疸程度重

C、黄疸持续 1~2 周

D、直接胆红素大于 $26 \mu\text{mol/L}$

答案：C

34、使用容量控制通气(VCV)时，重点监测的内容不包括：（ ）

A、呼出潮气量

B、气道压力

C、分钟通气量

D、通气模式

答案：D

35、遵医嘱指导消化道溃疡病人进半流质饮食，下列适宜的是：（ ）

A、牛奶

- B、豆浆
- C、米汤
- D、蒸蛋

答案：D

36、牙拔除术后多长时间取出压迫棉球：（ ）

- A、20 分钟
- B、30 分钟
- C、1 小时
- D、2 小时

答案：B

37、骨折的急救处理不包括：

- A、抢救休克
- B、包扎伤口
- C、手术复位
- D、迅速转运

答案：C

38、龋病是指牙体硬组织在以细菌为主的多种因素影响下发生的一种：（ ）

- A、急性破坏性疾病
- B、慢性破坏性疾病
- C、急性进行性破坏性疾病
- D、慢性进行性破坏性疾病

答案：D

39、下列哪项不属于纽曼的保健系统模式：（ ）

- A、压力原
- B、机体防御功能
- C、物理治疗
- D、预防性护理活动

答案：C

40、黄疸是由于血液中哪种物质升高引起的：（ ）

- A、胆红素
- B、胆绿素
- C、血清转氨酶
- D、碱性磷酸酶

答案：A

41、关于冠状动脉搭桥术叙述，错误的是：（ ）

- A、冠状动脉搭桥术常取腿部的大隐静脉
- B、冠状动脉搭桥术是在升主动脉和冠状动脉堵塞的远端之间搭桥
- C、冠状动脉搭桥术可改善心肌缺血、缺氧
- D、冠状动脉搭桥术是在升主动脉和冠状动脉堵塞的近端之间搭桥

答案：D

42、中医学的基本特点是：（ ）

- A、整体护理，辨证论治
- B、整体观念，辨证论治
- C、整体观念，辨证施护
- D、整体护理，辨证施护

答案：B

43、慢性肾炎的治疗目的是：（ ）

- A、防止或延缓肾功能进行性减退
- B、促进痊愈
- C、防止并发症
- D、减轻肾脏负担

答案：A

44、护理技术管理的先导是：（ ）

- A、开展新业务、新技术
- B、基础护理技术
- C、提高护理质量
- D、提高护理技术

答案：A

45、下列有关原发性痛经叙述，正确的是：（ ）

- A、生殖器官无器质性病变
- B、由子宫内膜异位症引起
- C、由盆腔炎引起
- D、由宫颈狭窄引起

答案：A

46、产后出血是指：（ ）

- A、产褥期阴道出血达 500ml 以上
- B、胎儿娩出后 24 小时内阴道流血量超过 500ml 者
- C、胎盘娩出后 24 小时内阴道流血量达 500ml 以上
- D、临产后到胎盘娩出, 阴道流血量达 500ml 以上

答案：B

47、下列有关糖尿病概念的叙述，错误的是：（ ）

- A、是一种常见的内分泌代谢疾病
- B、以慢性高血糖为特征的代谢紊乱
- C、除碳水化合物外，很少有蛋白质、脂肪代谢异常
- D、此病可引起多系统损害，如眼、肾、神经、大血管等的慢性进行性病变、

答案：C

48、总产程不应超过多少小时：（ ）

- A、2 小时
- B、8 小时
- C、16 小时
- D、24 小时

答案：D

49、评价机体活动能力时，以下哪项不是主要观察内容：（ ）

- A、行走
- B、书写
- C、穿衣
- D、洗漱口

答案：B

50、尿毒症行血液透析病人要严格控制体重增加，两次透析间期体重增加不应超过：（ ）

- A、2.5 kg
- B、4 kg
- C、1 kg
- D、0.5 kg

答案：A

51、角膜移植手术为预防排斥反应术后应使用哪一种眼液：（ ）

- A、匹鲁卡品眼液
- B、可的松眼液
- C、噻吗咯尔眼液
- D、阿托品眼液

答案：B

52、革兰染色法的临床意义不包括：（ ）

- A、鉴别细菌
- B、确定毒素
- C、选择药物

D、分析致病性

答案：B

53、急性细菌性痢疾的临床表现，不包括下列哪项：（ ）

A、发热

B、腹痛、腹泻、里急后重

C、呕吐物及粪便呈米泔水样

D、黏液脓血便

答案：C

54、导致压疮发生的最主要的原因是：（ ）

A、年老、体弱

B、局部组织长期受压

C、营养不良

D、石膏夹板使用不当

答案：B

55、脊髓损伤病人康复开始的时间为：（ ）

A、损伤后立即开始

B、损伤后1个月开始

C、损伤后2个月开始

D、生命体征稳定后开始

答案：D

56、脉搏血氧饱和度(SpO₂)的正常值范围是：（ ）

A、76%~100%

B、96%~100%

C、86%~100%

D、99%~100%

答案：B

57、慢性肾衰竭病人血肌酐为多少时提示进入尿毒症期：（ ）

A、491 μmol/L

B、178 μmol/L

C、560 μmol/L

D、707 μmol/L

答案：D

58、孙先生，60岁。因骨折卧床已3周，体质虚弱，近日骶尾部皮肤出现水疱并有破溃，上面附有少量黄色渗出液，护士观察后认为是压疮。该病人的压疮属于哪一期：（ ）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/895143110123011111>