

# 第9讲 中药的应用

第一节 中药的配伍

第二节 用药禁忌（重点）

第三节 中药的用量、用法（重点）

第四节 中药的优势病种



# 第一节 中药的配伍

## ➤ 何为配伍

配伍，就是按照病情需要和药物性能，有选择地将两种以上的药物合在一起应用。

## ➤ 配伍的种类

单行、相须、相使、相畏、相恶、相杀、相反



# 配伍的种类

**相须：**就是功用相类似的药物，配合应用后可以起到协同作用，加强了药物的疗效。

- 石膏与知母：明显增强清热泻火功效。
- 大黄与芒硝：增强攻下泻热的治疗效果。
- 全蝎与蜈蚣：增强止痉定痛的效果。

**相使：**就是用一种药物作为主药，配合其它药物来提高主药的功效。

- 黄芪与茯苓：茯苓增强黄芪补气利水的作用。
- 黄连与木香：治湿热痢疾，腹痛里急。以黄连为主，清热燥湿解毒止痢，木香调中宣滞、行气止痛，增强黄连治疗湿热泻痢的效果。
- 雷丸驱虫，配以通便的大黄，可增强雷丸的驱虫效果。



**相畏：**一种药物的毒性或副作用，能被另一种药物减轻或消除。**半夏畏生姜：**生半夏有毒性，可以用生姜来消除它的毒性。

**相杀：**一种药物能消除或减轻另一种药物的毒性或副作用。**绿豆杀巴豆：**绿豆能减轻巴豆毒性。



**相恶：**一种药物能破坏或降低另一种药物的某些功效。人参恶莱菔子：人参能大补元气，配合莱菔子同用，就会损失或减弱补气的功能等。

**相反：**两种药物同用能产生剧烈的毒副作用（甘草反甘遂）

**单行：**单用一味药来治疗疾病。例如用一味马齿苋治疗痢疾；独参汤单用一味人参大补元气、治疗虚脱等。



# 配伍的目的

- ◆ 发挥协同作用
- ◆ 利用相畏、相杀配伍，抑制毒副作用
- ◆ 利用相反配伍，起到相反相成效果
- ◆ 利用配伍药味，发挥一药多效作用



## 分煎、合煎的研究

- 化学成分差异性的研究
- 药效学差异性研究



# 化学成分差异性研究

## ➤ 溶解度差异

- 增溶：当归承气汤 当归磷脂 大黄总蒽醌；  
麻黄汤 甘草酸
- 减溶：葛根芩连汤 葛根素的量





- 溶出物反应引起的差异：鞣质与蛋白；鞣质与B；鞣质与皂苷；石膏与甘草酸、绿原酸、黄芩苷；生脉散 5-羟甲基-2-糠酸



- 溶出物自身结构转化引起的差异：生脉散合煎Rg1, Rb1, Rc, Rd, Re均消失, Rg3, Rh1, Rh2的量增加。



## 第二节 用药禁忌

- 配伍禁忌（十八反、十九畏）
- 妊娠用药禁忌
- 服药禁忌



# 配伍禁忌

## 十八反歌

本草明言十八反，  
半蒺贝藜及攻乌，  
藻戟遂芫俱战草，  
诸参辛芍叛藜芦。



# 十九畏歌

硫黄原是火中精，朴硝一见便相争。  
 水银莫与砒霜见，狼毒最怕密陀僧。  
 巴豆性烈最为上，偏与牵牛不顺情。  
 丁香莫与郁金见，牙硝难合京三棱。  
 川乌草乌不顺犀，人参最怕五灵脂。  
 官桂善能调冷气，若逢石脂便相欺。  
 大凡修合看顺逆，炮熅炙煨莫相依。



# 妊娠禁忌

妊娠禁忌：专指妇女妊娠期除中止妊娠及引产外，禁忌使用的药物。

- ◆ 禁用药：有剧毒药、药性作用峻猛之品及堕胎药。如水银、砒霜、莪术、水蛭。
- ◆ 慎用药：包括活血化瘀药（如红花、川芎）；行气药（如枳实）、攻下药（如芒硝、番泻叶）。



# 妊娠禁忌歌

虻斑水蛭及虻虫，乌头附子配天雄；  
野葛水银并巴豆，牛膝薏苡与蜈蚣；  
三棱芫花代赭麝，大戟蛇蜕黄雌雄；  
牙硝芒硝牡丹桂，槐花牵牛皂角同；  
半夏南星与通草，瞿麦干姜桃仁通；  
硃砂干漆蟹爪甲，地胆茅根与螻虫

**虻：** 1、即“虺”，蝮蛇。 2、即“龟壳花蛇”



# 服药禁忌

服药禁忌：指服药期间对某些食物的禁忌，也称“忌口”

- 如肝阳上亢者忌食辣椒、胡椒、白酒等助阳之品。
- 胸痹者忌食肥肉、动物内脏、烟酒等。
- 疮疡、皮肤病患者：鱼、虾、蟹等腥膻发物及刺激性食品。
- 热性病：辛辣、油腻、煎炸类分物
- 寒性病：生冷
- 脾虚：油炸粘腻、寒冷固硬、不易消化之物







# 第9讲 中药的应用

第一节 中药的配伍

第二节 用药禁忌

第三节 中药的用量、用法

第四节 中药的优势病种



# 第三节 中药的用量、用法

## ◆中药的用量

## ◆中药的用法

- 给药途径
- 应用形式
- 煎煮方法
- 服药方法

# 1、中药的用药剂量

中药剂量指每一味药成人的一日量。以克计算，常用量5-10g；较大量15-30g；新鲜药物常用量30-60g。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/895223023113011304>