

2020 年护理三基模拟测试题[含参考答案]

一、单选题

1. 为防止急性白血病患者继发感染，错误的护理措施是 答案：E

A:做好口腔护理，经常漱口

B:保持皮肤清洁，防止破损

C:保持大便通畅，以防肛裂

D:限制探视

E:使用药物尽量采用肌内注射

2. 终板电位是

A.动作电位

B.阈电位

C.局部电位

D.静息电位

E.后电位

正确答案：C

3. 各种麻醉前，最常用的药物是 答案：A

A:苯巴比妥钠

B:哌替啶(唛啶)

C:阿托品

D:氯丙嗪

E:东莨菪碱

4. 按新九分法计算躯体部体表面积是 答案：C

A:9%

B:18%

C:27%

D:46%

E:37%

5. 使用止血带止血时，持续捆扎时间一般不超过 答案：D

A:30min

B:40min

C:50min

D:60min

E:70min

6. 一骨科病人肌力测定为：抗引力时有完全运动幅度，其肌力为 答案：C

A:1 级

B:2 级

C:3 级

D:4 级

E:5 级

7. 脱水病人补液的第 1 天，对已丧失液量的补充应是 答案：A

A:先补充 1 / 2

B:一次补足

C:先补充 2 / 3

D:先补充 1 / 3

E:先补充 1 / 4

8. 男，40 岁，胫骨骨折石膏管型固定后 8h，诉患肢疼痛难忍，检查：肢端苍白，温度降低，足趾不能主动活动，应考虑 答案：D

A:骨折端移位

B:衬垫不妥

C:继发感染

D:血管受压

E:体位不当

9. 杨女士，34 岁，患原发性甲状腺功能亢进，清晨未起床测其脉率 110 次/min，

血压 140/80mmHg，按简便公式计算，该病人的 BMR（基础代谢率）为 答案：C

A:30%

B:50%

C:59%

D:69%

E:72%

10 . 梁女士,30 岁,体重 50kg,烧伤面积 80%,第一个 24h 应补液体总量是 答案：E

A:3000ml

B:4000ml

C:5000ml

D:6000ml

E:8000ml

11 . 男性，60 岁，诊断为原发性肝癌，行肝叶切除术后第 3 天，出现嗜睡、烦躁不安、黄疸、少尿等，应考虑 答案：C

A:胆汁性腹膜炎

B:膈下脓肿

C:肝性脑病

D:内出血

E:休克

12. 使用鼻导管给氧时，下列哪项是错误的 答案：E

A:插导管前用湿棉签清洁鼻孔

B:鼻导管轻轻插至鼻咽部

C:应用氧气时先调节流量

D:中途改变流量时，先分离导管，后调流量

E:停用氧气时，先关流量开关

13. 男性患者，25岁，患肺结核半年，入院后为配合治疗，应给予 答案：A

A:高蛋白、高热量饮食

B:高脂肪、高热量饮食

C:高热量、低脂肪饮食

D:低盐、高蛋白饮食

E:高热量、低蛋白饮食

14 . 术前准备错误的是 答案：E

A:术前灌肠

B:术前排空膀胱

C:戒烟

D:治疗呼吸道感染

E:备皮剃破皮肤,可涂碘酒,不影响手术

15 . 接台手术更换手术衣和手套的方法，下列哪一项步骤错误 答案：A

A:先脱手套，后脱手术衣

B:手只能接触手套内面

C:流水冲净滑石粉，并揩干

D:酒精浸泡手、臂 5min

E:穿无菌手术衣，戴手套

16 . 护理老年病人，哪项错误 答案：E

A:鼓励参加力所能及的活动

B:进食不宜过快

C:洗澡不宜过勤

D:大小便宜用坐式便器

E:改变早睡早起的习惯

17 . 中毒性肺炎病人出现哪种表现提示病情严重 答案：E

A:烦躁不安

B:尿量增加

C:体温升高

D:脉搏加快

E:脉压差变小

18 . 某病人甲状腺功能亢进 3 年，短期服他巴唑后病情好转，自行停药，其后又复发，3 日来腹泻，每日 5~7 次，高热多汗，频发早搏，诊为甲亢危象，下列护理应除外
答案：A

A:停用抗甲状腺药物

B:绝对卧床

C:采取物理降温措施

D:必要时人工冬眠降温

E:补充足够液体

19 . 类风湿性关节炎不会出现 答案：B

A:不规则热

B:蝶形红斑

C:晨僵

D:关节肿痛

E:关节畸形

20 . 血栓闭塞性脉管炎的早期症状是 答案：B

A:患肢休息痛

B:间歇性跛行

C:患肢营养障碍

D:足背动脉搏动消失

E:肢端干性坏疽

21 . 胃酸分泌增多最明显的疾病是 答案：D

A:慢性胃炎

B:胃癌

C:慢性胃体炎

D:十二指肠溃疡

E:胃溃疡

22 . 颅脑手术后 答案：E

A:去枕平卧，头侧向一侧

B:侧卧位

C:去枕平卧 6 ~ 8h

D:半卧位

E:头高斜坡位

23 . 有机磷农药中毒选用 答案：C

A:生理盐水

B:稀释醋

C:碳酸氢钠

D:茶叶水

E:1 : 1000 高锰酸钾溶液

24 . 对诊断尚未明确的急腹症患者，可以采取的措施是 答案：B

A:用吗啡止痛

B:用阿托品解痉

C:给患者灌肠

D:使用腹泻药

E:用热水袋热敷

25 . 心电图检查对下列哪项不能做出直接诊断 答案：C

A:心律失常

B:心室肥大

C:心功能级别

D:血钾水平

E:心肌梗死

26 . 血红蛋白尿颜色呈 答案：E

A:乳白色

B:黄褐色

C:淡棕红色

D:黄色

E:酱油色

27. 急性呼吸衰竭可见于 答案：E

A:呼吸窘迫综合征 (ARDS)

B:颅脑损伤

C:麻醉过深

D:急性肺不张

E:其余各项都是

28 . 以下关于损伤的现场急救方法错误的是

A.对休克病人，首要措施是立即送医院抢救

B.迅速将病人转移出现场

C.做简要的全身检查

D.严密观察生命体征

E.注意观察有无神志.瞳孔变化

正确答案：A

29. MBR 的实测值与正常平均值比较，正常变动范围是

A.±(3% ~ 5%)

B.±(5% ~ 8%)

C.±(10% ~ 15%)

D.±(15% ~ 25%)

E.±(20% ~ 30%)

正确答案：C

30. 红细胞悬浮稳定性差会导致

A.溶血

B.红细胞凝集

C.血液凝固

D.血沉加快

E.出血时间延长

正确答案：D

31 . 决定 A , B 及 H 抗原的基因是控制细胞合成某种特异的

A.抗原的糖链

B.蛋白质水解酶

C.磷脂酶

D.转糖基酶

E.蛋白质合成酶

正确答案：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/897064145020006035>