

## 护理基本技能模拟题库含答案

1、护士小李准备为患者输血,为预防溶血反应的发生小李应采取的措施是()

- A、 输血前静注地塞米松
- B、 做好血液质量检查
- C、 输血前肌注异丙嗪
- D、 输血前静注 10%葡萄糖酸钙
- E、 严格执行无菌操作

答案: B

2、凝血测定取真空采血管的:

- A、 蓝色
- B、 红色
- C、 紫色
- D、 黑色
- E、 粉色

答案: A

3、采集粪便培养标本应:

- A、 在加热便盆中取粪便少许放纸盒中送验
- B、 用无菌干棉签由肛门插入 6-7cm 取粪便少许
- C、 用无菌干棉签取便盆中的脓血或粘液部分少许
- D、 用灭菌棉签蘸生理盐水插入肛门取粪便少许放入培养试管中送验
- E、 取不同部位带血或粘液部位 5-10g

答案: D

4、皮内注射的方法,正确的是()

- A、 药物过敏试验取前臂掌侧下端
- B、 用碘町消毒皮肤
- C、 与皮肤呈 10 度角刺入
- D、 推药液至真皮下
- E、 拔针后用干棉球按压

答案: A

5、留置导尿管病人定期更换导尿管是为了

- A、 防止导尿管老化
- B、 防止尿道疼痛
- C、 防止逆行感染
- D、 训练膀胱的反射功能
- E、 保持引流通畅

答案：C

6、患者,女性,30岁。高热 39℃,医嘱给予冰袋物理降温,冰袋正确放置的位置是(2012年)

- A、枕部
- B、足底
- C、颈前颌下
- D、前额
- E、胸部

答案：D

7、抢救过敏性休克的首选药物是(护考真题):

- A、去甲肾上腺素
- B、异丙基肾上腺素
- C、盐酸肾上腺素
- D、地塞米松
- E、糖皮质激素

答案：A

8、患者,男性,55岁。因上消化道大出血导致失血性休克急诊入院,遵医嘱大量输入库存血 800ml,患者出现全身发冷,输血静脉周围局部皮温正常。护士首先应

- A、拔针后另外穿刺,继续输血
- B、热敷患者穿刺局部
- C、使用恒温器加热血液
- D、轻者减慢输血速度,继续观察,重者立即停止输血
- E、给予吸氧

答案：D

9、为男病人留置导尿,不妥的方法是:

- A、术者站在病人右侧
- B、病人取仰卧、两腿平放略分开
- C、左手用纱布裹住阴茎,将包皮向后推,暴露尿道口,从冠状沟向尿道口进行消毒
- D、提起阴茎与腹壁呈 60° 角
- E、见尿后再插入 7-10cm

答案：C

10、中度缺氧时,血气分析 PaO<sub>2</sub> 指标为

A、PaO<sub>2</sub>11.6~12.33kPa

- B、 Pa026.65~9.33kPa
- C、 Pa023.33~4.66kPa
- D、 Pa024.6~6.6kPa
- E、 Pa029.33~11.65kPa

答案：D

11、为减少对组织的压力,预防压疮的措施不正确的是()

- A、 每 2h 翻身一次
- B、 必要时 30min 翻身一次
- C、 气圈充满气
- D、 气圈上垫布
- E、 身体空隙处垫软枕

答案：C

12、炎症早期用热疗法的目的( )

- A、 促进白细胞吞噬能力下降
- B、 促进炎症局限
- C、 促进炎性渗出物的吸收与消散
- D、 降低新陈代谢
- E、 使组胺类物质堆积

答案：C

13、抽吸药液的方法正确的是()

- A、 自安瓿内抽药,应首先轻弹安瓿,将药液流至颈部
- B、 自密封瓶内抽药,注射器内应先抽吸 1ml 空气注入瓶内
- C、 吸取混悬液应先稍加温,并选择细长针头
- D、 吸取油剂,应选择较粗针头
- E、 吸药时手握活塞轴

答案：D

14、吴老太太,处于昏迷状态。近日病人骶尾部皮肤出现 2cm×4cm 压疮,破溃的水泡上脓性分泌物增多,出现皮下组织感染、坏死。此时病人压疮属于()

- A、 淤血红润期
- B、 炎性浸润期
- C、 浅度溃疡期
- D、 坏死溃疡期
- E、 淤血浸润期

答案：D

15、下列关于床上擦浴的叙述不正确的是()

- A、 天冷时可在被内操作
- B、 擦洗眼部时由外眦向内眦
- C、 为患者脱上衣时,先脱近侧后脱远
- D、 擦洗时注意防止浸湿床单
- E、 擦浴时注意保护患者隐私

答案: B

16、 以下关于出院护理说法错误的是

- A、 协助患者尽快适应原生活和工作
- B、 整理病案
- C、 停止一切医嘱
- D、 指导患者办理出院手续
- E、 自动出院者无需告知可自行离院

答案: E

17、 患者, 男性, 68 岁, 肝硬化腹水, 体质虚弱, 生活不能自理。 护士为患者做口腔护理时, 应特别注意观察口腔有无()

- A、 糜烂
- B、 烂苹果味
- C、 臭鸡蛋味
- D、 肝臭味
- E、 腥臭味

答案: D

18、 目前医学界主张判断死亡的诊断标准是

- A、 瞳孔散大固定
- B、 各种反射消失
- C、 呼吸停止
- D、 心跳停止
- E、 脑死亡

答案: E

19、 伤寒患者灌肠筒内液面距离肛门不得高于

- A、 10cm
- B、 20cm
- C、 30cm
- D、 60cm
- E、 80cm

答案: C

20、配制青霉素皮试液选用的溶媒是(护考真题):

- A、 蒸馏水
- B、 生理盐水
- C、 注射用水
- D、 葡萄糖溶液
- E、 白开水

答案: B

21、皮下注射时,错误的做法是()

- A、 药液量少于 1mL,须用 1mL 注射器抽吸
- B、 注射部位要常规消毒
- C、 持针时,右手食指固定针栓
- D、 针头与皮肤呈 20° 角刺入
- E、 进针时针尖斜面向上

答案: D

22、患者,男性,36岁。因咳嗽发热前来就诊,医嘱给予青霉素 80 万 U 肌内注射,每日 2 次。护士为患者首先进行青霉素皮试,操作时错误的是(护考真题):

- A、 在皮试盘内准备盐酸肾上腺素和注射器等急救用品
- B、 皮试前详细询问用药史、过敏史
- C、 因常温下易降解,所以皮试液一定要现用现配
- D、 配制青霉素皮试液用注射用水进行稀释
- E、 按皮内注射的要求在前臂掌侧下段注射皮试液 0.1ml

答案: D

23、患者男,70岁。因慢性阻塞性肺气肿入院治疗。今晨护理查房时发现患者躁动不安,有幻觉,对自己所处的位置,目前的时间无法做出正确判断。医嘱给予吸氧,最适合该患者的吸氧流量为

- A、 2L/min
- B、 4L/min
- C、 6L/min
- D、 8L/min
- E、 12L/min

答案: A

24、可用于补充血容量的是

- A、 浓缩红细胞
- B、 血浆
- C、 白蛋白液

D、 免疫球蛋白

E、 血小板

答案： B

25、 输注红细胞时正确的护理措施是

A、 选择细小的末端静脉血管

B、 输注时间要大于 4 小时

C、 洗涤红细胞必须在 48 小时内输完

D、 悬浮红细胞在使用前必须充分摇匀

E、 输入前不需进行交叉配血试验

答案： D

26、 下列哪种患者禁忌洗胃

A、 食管静脉曲张者

B、 幽门梗阻者

C、 胃溃疡患者

D、 昏迷者

E、 胆囊炎患者

答案： A

27、 充血性心力衰竭的患着禁用的灌肠液是

A、 高渗盐水

B、 肥皂水

C、 生理盐水

D、 碳酸氢钠

E、 温开水

答案： B

28、 患者, 女性, 74 岁。 输液过程中发生肺水肿, 吸氧时需用 20%~30%乙醇湿化, 其目的是

A、 减低肺泡表面张力

B、 消毒吸入的氧气

C、 使患者呼吸道湿润

D、 使痰液湿薄, 易咳出

E、 减低肺泡内泡沫表面张力

答案： E

29、 腹部禁用冷疗是为了防止( )

A、 体温骤降

B、 循环障碍

- C、 腹泻
- D、 心率失常
- E、 掩盖病情

答案： C

30、 鼻饲液的温度为

- A、 28~30℃
- B、 30~31℃
- C、 32~34℃
- D、 35~36℃
- E、 38~40℃

答案： E

31、 胶体溶液的性质不包括

- A、 分子量大
- B、 具有较高的渗透压
- C、 常用于纠正电解质紊乱
- D、 有维持循环血量和升压作用
- E、 在血管内停留时间较长

答案： C

32、 患者邢某, 男, 19 岁, 因切割伤在急诊清创缝合, 需注射破伤风抗毒素。

注射部位皮肤消毒时, 正确的方法是(护考真题):

- A、 以注射点为中心, 由内向外呈螺旋形涂擦
- B、 以注射点为轴, 由外向内呈环形涂擦
- C、 横形涂擦至注射点
- D、 以注射点为中心, 自上而下的涂擦
- E、 离心法消毒 2 次

答案： A

33、 简易呼吸器挤压一次可产生的气体量是

- A、 100~500ml
- B、 500~1000ml
- C、 800~1200ml
- D、 1000~1200ml
- E、 1200~1500ml

答案： B

34、 不需留置导尿管的病员是:

- A、 昏迷尿失禁

- B、 会阴部损伤
- C、 截瘫引起尿潴留
- D、 胸腔内器官手术前
- E、 需记录每小时尿量

答案： D

35、 病人, 女性, 28 岁。 因异位妊娠破裂后大量输血, 现病人出现手足抽、 血压下降, 可静脉缓慢注射

- A、 10%葡萄糖酸钙 10ml
- B、 4%碳酸氢钠 10ml
- C、 0.9%氯化钠 10ml
- D、 盐酸肾上腺素 2ml
- E、 地塞米松 5mg

答案： A

36、 导尿中, 哪项与防止感染无关:

- A、 严格消毒物品
- B、 导尿管误插入阴道应更换, 重新从尿道插入
- C、 一次放尿不超过 1000ml
- D、 严格消毒外阴
- E、 戴无菌手套

答案： C

37、 膀胱高度膨胀的病人, 首次导尿排完膀胱会引起:

- A、 休克
- B、 腹部剧痛
- C、 血尿、 虚脱
- D、 膀胱炎症
- E、 以上都不对

答案： C

38、 胆红素尿的颜色是:

- A、 红棕色
- B、 黄褐色
- C、 咖啡色
- D、 淡黄色
- E、 酱油样色

答案： B

39、 高蛋白饮食适用于( )



- A、 肝炎患者
- B、 结核患者
- C、 高热患者
- D、 急性肾炎患者
- E、 肠炎患者

答案： B

40、 李先生, 臀部出现 2cmx2cm 的创面. 且有黄色渗出液此皮肤改变为压疮的()

- A、 淤血红润期
- B、 炎性浸润期
- C、 浅度溃疡期
- D、 坏死溃疡期
- E、 淤血浸润期

答案： C

41、 下列青霉素皮试结果, 哪一种情况可以注射青霉素:

- A、 局部红晕直径 1 厘米以上, 无自觉症状
- B、 局部红晕直径 0.5 厘米以上, 有胸闷、 头晕
- C、 局部红晕直径 0.5 厘米以上, 周围有伪足, 有痒感
- D、 局部红晕直径 0.7 厘米, 无自觉症状
- E、 局部红晕直径 1.1 厘米, 无自觉症状

答案： D

42、 青霉素过敏性休克时, 中枢神经系统症状是:

- A、 头晕, 眼花, 面及四肢麻木, 意识丧失, 抽搐, 二便失禁
- B、 瘙痒, 皮疹, 严重者可发生剥脱性皮炎
- C、 哮喘, 喉头水肿, 胸闷, 气促伴濒死感
- D、 过敏性紫癜, 腹痛, 便血
- E、 面色苍白, 出冷汗, 发绀, 脉细弱, 血压下降, 烦躁不安

答案： A

43、 病人, 女性, 35 岁。 在输液过程中突然感到胸闷、 不适, 并出现呼吸困难和严重发绀, 心前区听诊可闻及一个响亮持续的“水泡声”, 应考虑为

- A、 过敏反应
- B、 发热反应
- C、 肺水肿
- D、 空气栓塞
- E、 右心衰竭

答案：D

44、不宜用热疗法的病人是()

- A、 出血性疾病
- B、 腹痛
- C、 关节扭伤 2 天后
- D、 痉挛
- E、 早产儿

答案：A

45、患者林先生,男,45岁,因外伤致截瘫两月,病人一般状况差,骶尾部有一创面,面积 2.5cm×5cm,创面较深,有脓液流出。创面周围有黑色坏死组织,你认为如何处理()

- A、 用生理盐水冲洗并敷盖新鲜蛋膜
- B、 用 50%酒精按摩创面及周围皮肤
- C、 涂厚层滑石粉后用无菌纱布包扎
- D、 剪去坏死组织,用 3%过氧化氢冲洗,抗感染治疗
- E、 暴露创面、紫外线每日照射 1 次

答案：D

46、白班药疗护士不用提前为夜班护士配制肌肉注射药物,应现用现配,目的是()

- A、 防止发生差错
- B、 防止出现配伍禁忌
- C、 防止降低药物的效价
- D、 防止浪费药液
- E、 减少毒性反应

答案：C

47、慢性细菌性痢疾病人在保留灌肠时应采取的卧位是

- A、 右侧卧位
- B、 左侧卧位
- C、 俯卧位
- D、 仰卧位
- E、 膝胸卧位

答案：B

48、患者,男。36岁,因车祸内脏破裂大出血而欲行急诊手术。去手术室之前,护士遵医嘱迅速为患者建立了一个静脉通道并进行输血治疗。因时间紧迫,护士从血库取回血后,为了尽早将血输给患者,便将血袋放在热水中提温,5min

后便给患者输入。当输入 10min 后, 患者头部胀痛, 并出现恶心呕吐, 腰背部剧痛。此患者最可能出现了

- A、 过敏反应
- B、 溶血反应
- C、 高钾血症
- D、 酸中毒
- E、 低钾血症

答案: B

49、下列病人需留置导尿的是:

- A、 留尿培养标本
- B、 测膀胱压力
- C、 检查残余尿量
- D、 为会阴部有伤口的病人引流尿液
- E、 膀胱化疗

答案: D

50、肾病综合征患者宜采用的饮食是

- A、 高热量饮食
- B、 低脂肪饮食
- C、 低蛋白饮食
- D、 正常量优质蛋白饮食
- E、 少渣饮食

答案: D

51、不能引起排尿和尿量异常的疾病是:

- A、 心力衰竭
- B、 肾小球肾炎
- C、 胃溃疡
- D、 膀胱炎
- E、 尿崩症

答案: C

52、患儿, 女, 1 岁。细菌性肺炎入院。目前患儿烦躁不安、呼吸困难。医嘱: 吸氧。适合该患儿的吸氧方式为

- A、 单侧鼻导管法
- B、 面罩法
- C、 鼻塞法
- D、 漏斗法

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/897143016026006040>