

2023 年住院医师规范化培训《全科医学》模拟试卷三

[单选题]1. 被认为是梅毒螺旋体权威的诊断方法是（江南博哥）（）

- A. 性病研究实验室试验
- B. 荧光螺旋体抗体吸收试验
- C. 快速血清反应素环状卡片试验
- D. 不加热血清反应素试验

参考答案：B

[单选题]2. 妊娠晚期阴道出血的处理哪项不正确

- A. 在排除前置胎盘之前应禁止肛指检查
- B. 有必要用阴道拉钩或窥阴器协助窥视宫颈有无息肉或糜烂出血
- C. 应常规作 B 超检查
- D. 可以用阴道穹隆扪诊以确定有否前置胎盘
- E. 如胎儿已死，原则上尽量阴道分娩

参考答案：E

[单选题]3. 一期梅毒的主要临床特征为（）

- A. 硬下疳
- B. 软下疳
- C. 下疳样脓皮病
- D. 扁平湿疣

参考答案：A

[单选题]4. 下述哪项不是妊高征的并发症

- A. 巨大儿
- B. 脑溢血
- C. 弥散性血管内凝血（DIC）
- D. HELLP 综合征
- E. 视网膜剥离

参考答案：A

[单选题]5. 病毒性肝炎的临床类型不包括

- A. 肝炎肝硬化
- B. 慢性肝炎
- C. 重型肝炎
- D. 淤胆型肝炎
- E. 药物性肝损害

参考答案：E

参考解析：病毒性肝炎分为急性肝炎、慢性肝炎、重型肝炎、淤胆型肝炎、肝炎肝硬化五型。药物性肝损害不属病毒性肝炎分型。

[单选题]6. 心脏性猝死最主要的病因是

- A. 二尖瓣脱垂

- B. 心肌病
- C. 主动脉瓣狭窄
- D. 冠心病及其并发症
- E. 急性心肌炎

参考答案：D

参考解析：在西方国家，心脏性猝死中约 80%由冠心病及其并发症引起。各种心肌病引起的心脏性猝死是冠心病易患年龄前（<35 岁）心脏性猝死的主要原因，如肥厚梗阻型心肌病、致心律失常型右室心肌病

[单选题]7. 可引起秃睫和睫毛乱生的疾病是

- A. 眦部睑缘炎
- B. 鳞屑性睑缘炎
- C. 溃疡性睑缘炎
- D. 睑腺炎

参考答案：C

[单选题]8. 关于视网膜渗出，错误的是()

- A. 硬性渗出说明视网膜内屏障破坏
- B. 硬性渗出是血管内渗出液体吸收后，遗留下的脂质沉着，故呈黄白色
- C. 硬性渗出边界清楚，可缓慢吸收，在黄斑区呈星芒状
- D. 软性渗出说明视网膜外屏障破坏
- E. 软性渗出为毛细血管闭塞，神经纤维层轴索肿胀断裂所致，故呈白色，边界不清

参考答案：D

参考解析：软性渗出不是血管内物质的渗出形成，软性渗出的出现说明缺血状态的存在。

[单选题]9. 内分泌功能减退性疾病常用的替代治疗是给予

- A. 生理剂量的靶腺激素
- B. 药理剂量的靶腺激素
- C. 药理剂量的促垂体激素
- D. 药理剂量的垂体激素
- E. 调节神经递质或受体的药物

参考答案：A

参考解析：对于内分泌功能减退类型，主要采用：①有关缺乏激素的替代治疗或补充治疗，激素替代治疗一般均为生理剂量的靶腺激素替代；②内分泌腺组织移植，提供身体的需要，如胰岛细胞或胰腺移植、甲状旁腺组织移植等。

[单选题]10. 阻止精子流入宫腔的避孕方法为

- A. 使用避孕套
- B. 放置宫内节育器
- C. 运用安全期

- D. 口服长效避孕药
- E. 口服短效避孕药

参考答案：A

[单选题]11. 老年人发生大肠梗阻时，首先应想到的病因是

- A. 蛔虫阻塞
- B. 肠粘连
- C. 嵌顿性腹外疝
- D. 肿瘤
- E. 肠系膜血管栓塞

参考答案：D

[单选题]12. 下列喉部疾病中，最易引起喉阻塞的是：

- A. 喉水肿
- B. 喉角化症
- C. 喉白斑病
- D. 喉淀粉样变
- E. 喉气囊肿

参考答案：A

[单选题]13. 男，40岁，右眼反复发作虹膜睫状体炎3年。检查：眼压：右40mmHg，左18mmHg，右角膜透明KP(-)，房水闪光(-)，瞳孔完全后粘连、虹膜膨隆，左眼前房正常，双眼底正常，双眼房角开放。本患者应诊断为

- A. 双继发性青光眼，右陈旧性虹膜睫状体炎
- B. 右继发性青光眼，右陈旧性虹膜睫状体炎
- C. 双原发性闭角型青光眼，右陈旧性虹膜睫状体炎
- D. 双原发性开角型青光眼，右陈旧性虹膜睫状体炎
- E. 右继发性青光眼，右急性虹膜睫状体炎

参考答案：B

[单选题]14. 二尖瓣狭窄时，下列哪项是前叶运动曲线的典型改变

- A. 吊床样
- B. 城墙样
- C. 钻石样
- D. 帐篷样
- E. 圆顶样

参考答案：B

[单选题]15. 某患者左耳流脓1年，脓稀不臭。检查发现左鼓膜紧张部穿孔，鼓室有黏膜，不能用的耳局部用药是：

- A. 酚甘油滴耳液
- B. 3%双氧水
- C. 氯霉素滴耳液

- D. 氧氟沙星滴耳液
- E. 以上都不是

参考答案：A

[单选题]16. 下列关于硬食管镜检查，错误的是：

- A. 可明确食管异物的诊断，取出食管异物
- B. 可应用于切除食管内小的良性肿瘤
- C. 对食管静脉曲张施行填塞止血或注射硬化剂治疗
- D. 食管腐蚀伤后的即刻检查
- E. 严重颈椎疾病或张口困难者为禁忌证

参考答案：D

[单选题]17. 特发性肺纤维化动脉血气的主要改变是()

- A. PaCO<sub>2</sub>升高
- B. PaO<sub>2</sub>降低
- C. pH 降低
- D. BE 正值增高
- E. HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>降低

参考答案：B

[单选题]18. 最为常见又较肯定的心身疾病是

- A. 流行性感冒
- B. 原发性高血压
- C. 肺结核
- D. 肺癌
- E. 水俣病

参考答案：B

[单选题]19. 下列不属于绞窄性肠梗阻特点的是

- A. 持续性剧烈腹痛、阵发性加重
- B. 早期出现休克
- C. 明显腹膜刺激征
- D. 胃肠减压抽出液为血性
- E. X线检查示大、小肠充气扩张

参考答案：E

[单选题]20. 老年性耳聋的特点为

- A. 对声音的高频域区敏感性不稳定
- B. 对声音的高频域区敏感性最早发生障碍
- C. 对声音的低频域区敏感性最早发生障碍
- D. 对声音的低频域区敏感性不稳定
- E. 对声音的高、低频域区敏感性都不稳定

参考答案：B

[单选题]21. 社区护士小陈到一糖尿病病人家中访视，给病人的足部溃疡换药，并向病人讲解糖尿病的相关知识，在换药时，她担负的角色是

- A. 照顾者
- B. 教导者
- C. 咨询者
- D. 管理者
- E. 研究者

参考答案：A

[单选题]22. 20岁，男性患者。近5天来食欲不振，恶心，呕吐，乏力，尿色黄来院就诊，病前半年因外伤曾输血，病前3周曾吃海鲜。检查：巩膜黄染，肝肋下1cm，脾未触及，化验：ALT480U/L，胆红素 $105\mu\text{mol/L}$ ，抗HAV-IgM(+)，抗HAV-IgG(+)，HBsAg(+)，抗HBe-IgM(+)。应诊断为

- A. 急性甲型肝炎，乙肝病毒携带者
- B. 急性乙型肝炎，既往感染过甲型肝炎
- C. 急性甲型肝炎、乙型肝炎
- D. 被动获得甲肝抗体，急性乙型肝炎
- E. 被动获得甲肝抗体，急性甲型肝炎，乙肝病毒携带者

参考答案：A

参考解析：20岁男性患者，急性起病，有食欲不振、恶心、呕吐、乏力、尿黄、皮肤黄染、肝大等消化道症状，有输血史，肝酶、胆红素升高明显，抗HAV-IgM(+)，支持急性甲肝；HbsAg(+)，抗HBe-IgM(+)，说明乙肝携带状态。

[单选题]23. 我国采用了世界卫生组织提出的盲和视力损伤的标准。在下列关于盲的标准的叙述中，正确的一项是

- A. 一个人较好眼的视力小于0.05
- B. 一个人较好眼的最好矫正视力小于0.3
- C. 一个人较差眼的最好矫正视力小于0.3
- D. 一个人较好眼的最好矫正视力小于0.05

参考答案：D

[单选题]24. 前列腺增生症状与哪项无关()

- A. 病变发展的速度
- B. 梗阻的程度
- C. 合并膀胱炎症
- D. 合并膀胱结石
- E. 前列腺增生体积大小

参考答案：E

[单选题]25. 急性痘疮样苔藓状糠疹的皮损特点是

- A. 皮疹为多形性，有丘疹、丘疱疹、坏死、结痂和鳞屑

- B. 皮疹为水疱
- C. 皮疹为淡红斑鳞屑
- D. 皮疹为脓疱
- E. 皮疹为单侧分布的红斑水疱群

参考答案：A

[单选题]26. 幼儿急疹的病原体是

- A. 风疹病毒
- B. 人疱疹病毒 6 型
- C. 带状疱疹病毒
- D. 腺病毒
- E. 合胞病毒

参考答案：B

参考解析：幼儿急疹由人疱疹病毒 6 型引起，传染性不强。

[单选题]27. 诊断绞窄性肠梗阻最可靠的依据是

- A. 阵发性腹部绞痛
- B. 有气过水音和金属音
- C. X 线检查小肠有多个阶梯状液
- D. 频繁呕吐，呕吐物为胃肠液
- E. 腹肌紧张，有压痛和反跳痛

参考答案：E

[单选题]28. 男性，32 岁，既往有风湿性关节炎史，因发热、胸痛、气急逐渐加重半个月入院，胸水为草黄色，利凡他试验（+），比重 1.024，白细胞  $300 \times 10 / L$ ，淋巴细胞 60%，X 线胸片右胸腔中等量积液，右肺门淋巴结肿大，最可能的诊断是

- A. 风湿性胸膜炎
- B. 癌性胸腔积液
- C. 漏出性胸腔积液
- D. 化脓性胸膜炎
- E. 结核性渗出性胸膜炎

参考答案：E

[单选题]29. 进行期银屑病的特点是

- A. 发热明显
- B. 同形反应
- C. 皮损呈钱币状
- D. 点状出血现象
- E. 渗出明显

参考答案：B

[单选题]30. 急性肺脓肿的感染菌中，50%~90%为厌氧菌，首选的抗生素是

- A. 磺胺药物
- B. 林可霉素
- C. 甲硝唑
- D. 青霉素
- E. 先锋霉素

参考答案：D

参考解析：急性肺脓肿感染细菌中绝大多数为厌氧菌，并对青霉素敏感，一般都很满意，且价廉、副作用小。若青霉素治疗效果不好，则可选用林可霉素、甲硝唑等。

[单选题]31. 真菌性角膜炎临床特点是

- A. 症状严重、发展迅猛
- B. 迅速发展为真菌性眼内炎、角膜穿孔
- C. 中央基质溃疡，且溃疡较深
- D. 常伴有虹膜睫状体炎

参考答案：D

[单选题]32. 局部用药后用塑料薄膜封包吸收系数会增高 100 倍，原因在于()

- A. 封包增大了局部液体压力，使其渗透速度加快
- B. 封包阻止了局部水分蒸发，角质层水合程度提高
- C. 封包后角质层细胞间隙增大，渗透量增多
- D. 封包后角质层形成水溶性通道，帮助物质渗透

参考答案：B

[单选题]33. 白内障膨胀期患者诱发了急性闭角型青光眼，首先要考虑的原因是

- A. 眼内出血
- B. 晶状体溶解性（皮质过敏）青光眼
- C. 睫状环阻滞性青光眼
- D. 晶状体体积增大致晶体-虹膜隔前移

参考答案：D

[单选

题]34.

某女，30岁，肌肉疼痛，周期性发热，盗汗，体重减轻，反应性神经错乱。查体：体温 37.2℃，心率 75 次/分，血压 110/70mmHg；腋下淋巴结肿大，对称，可活动，有弹性，大小为 1.0cm，无压痛及触痛，心肺检查(-)。有不洁性交史。血常规示：Hb90g/L，WBC3.5.0×10<sup>9</sup>/L；免疫学检测：CD4<sup>+</sup>0.2×10<sup>9</sup>/L，抗-HIV(+)，该患者可能会感染何种疾病

- A. 卡氏肺囊虫肺炎
- B. 隐球菌脑膜炎
- C. 结核病
- D. 卡波济肉瘤

E. 以上均可

参考答案: E

[单选题]35. 鸡皮疙瘩的产生是由于()

- A. 毛囊收缩
- B. 立毛肌收缩
- C. 皮脂腺收缩
- D. 大汗腺收缩

参考答案: B

[单选

题]36.

某患慢性咳嗽、咳脓痰，反复咯血10多年，胸透多次无异常。近两周来高热，脓痰量增多，味臭，胸片右下肺大片致密阴影，中有空洞及液平，白细胞 $18 \times 10^9$ /L，诊断是( )

- A. 金黄色葡萄球菌肺炎
- B. 右下肺炎球菌肺炎
- C. 支气管扩张，继发肺脓肿
- D. 阿米巴肺脓肿
- E. 肺结核继发肺脓肿

参考答案: C

[单选题]37. 避免新生儿窒息不正确的做法是

- A. 孕妇定期作产前检查
- B. 提高产科技术
- C. 对高危妊娠进行产时胎心监护
- D. 产妇在胎儿娩出后，即刻给予吸氧
- E. 做好新生儿复苏的准备工作

参考答案: D

[单选题]38. 一位病人初次妊娠前3个月时自然流产，她想知道本次流产的可能原因。下述除哪项外均是自然流产诱发因素

- A. 遗传因素
- B. 外界因素
- C. 免疫因素
- D. 母体因素
- E. 营养因素

参考答案: E

[单选题]39. 周围血反应骨髓幼红细胞增生程度准确的指标是()

- A. 网织红细胞百分数
- B. 血红蛋白和红细胞数
- C. 网织红细胞绝对数

- D. 出现有核红细胞
- E. 出现染色质小体

参考答案：C

[单选题]40. 检查某人视力，能在 3m 处看清 0.1 行字符，其实际视力应为

- A. 0.03
- B. 0.06
- C. 0.3
- D. 0.6

参考答案：B

[单选题]41. 直接免疫荧光检查梅毒螺旋体呈()

- A. 蓝色荧光
- B. 紫色荧光
- C. 红色荧光
- D. 绿色荧光

参考答案：D

[单选题]42. 痤疮治疗原则

- A. 去脂
- B. 溶解角质
- C. 杀菌
- D. 消炎
- E. 以上都是

参考答案：E

[单选题]43. 不通过眶下裂的组织结构有

- A. 眼下静脉
- B. 第V脑神经的上颌支
- C. 第III、IV脑神经
- D. 颧神经
- E. 蝶腭神经节分支

参考答案：C

参考解析：本题考查眼解剖结构的基础知识。第III、IV脑神经通过眶上裂，其他选项的结构均通过眶下裂，故选择C。

[单选题]44. 慢性肾盂肾炎患者，尿培养为变形杆菌，尿沉渣白细胞为 5~10 个/HP，经严格内科治疗，症状可暂时缓解，但选用敏感抗生素后，实验室检查结果均未改善，下步应采取哪种方法处理()

- A. 做结核菌培养
- B. 做病毒检查
- C. 做高渗培养
- D. 再次做药敏试验，选择敏感抗生素

E. 做静脉肾盂造影了解是否有尿路梗阻

参考答案: E

[单选题]45. 下列关于软腭瘫痪的描述错误的是:

- A. 软腭瘫痪的原因可为中枢性或周围性的
- B. 双侧软腭瘫痪者出现开放性鼻音
- C. 双侧软腭瘫痪者吞咽时食物逆行入鼻腔
- D. 双侧软腭瘫痪者不能做吸吮、吹哨动作
- E. 单侧软腭瘫痪者软腭松弛下垂

参考答案: E

[单选题]46. 患儿5岁, 睡眠张口呼吸、打鼾, 双侧扁桃体III度大, 拟手术治疗, 为明确局部情况, 术前尚需要做的检查是:

- A. 间接喉镜检查
- B. 纤维喉镜检查
- C. 鼻咽侧位片检查
- D. 颈部超声检查
- E. 以上均不是

参考答案: C

[单选题]47. 未清洁、大面积开放、新鲜的手部创伤, 止血主要靠

- A. 止血药物
- B. 体表主要供血动脉的压迫止血及局部压迫、包扎止血
- C. 伤口内的钳夹止血
- D. 阻断浅表静脉回流
- E. 靠体位如抬高患肢止血

参考答案: B

[单选题]48. 哮喘严重发作时, 下列哪项是通气不足的可靠指标()

- A. 明显发绀
- B. 弥漫性哮鸣音
- C. 呼气性呼吸困难
- D.  $PaO_2 < 60\text{mmHg}$
- E.  $PaCO_2 > 50\text{mmHg}$

参考答案: E

[单选题]49. 内脏真菌感染率高与下列因素有关

- A. 长期应用四环素
- B. 青霉素用量不足
- C. 磺胺用量不足
- D. 先锋霉素用量不足
- E. 对阿奇霉素耐受

参考答案: A

[单选题]50. 用抗焦虑药物时主要应注意

- A. 锥体外系反应
- B. 抗胆碱能不良反应
- C. 对心脏的影响
- D. 成瘾
- E. 出现意识障碍

参考答案: D

[单选题]51. 一名 25 岁男性患者出现右侧睾丸无痛性肿胀，到社区卫生服务中心就诊。他感觉睾丸实际上是每日逐渐长大的。他的最后一次性活动是 6 个月前，没有尿路症状。体检发现右侧睾丸大，无触痛，不透光。附睾外表正常，没有触痛。以下哪项是最合适的

- A. 转诊行经阴囊穿刺活检
- B. 转诊到上级医院进行超声检查，并请专科医生会诊
- C. 告知患者在未来数天射精多次
- D. 适当的抗生素治疗 2 周
- E. 6 个月后重新检查

参考答案: B

参考解析: 这个病例是一个典型的睾丸癌。如果怀疑附睾炎，抗生素将是适当的治疗，但病史和体格检查不支持此诊断。性活动减少所产生的睾丸充血，可出现压痛和肿胀的睾丸，但是无痛快速增长的睾丸，直到证明并非如此之前，都应该考虑是癌症。经阴囊活检的方法是禁忌，因为有把癌播散到另一个淋巴结系统的风险。阴囊皮肤和睾丸有着不同的淋巴流出通道。从胚胎学上来说，睾丸原先是在腹部，后通过腹股沟管下降到阴囊，其次是它的血管系统、淋巴流出管道和神经也经此道下行。随诊观察不适合这个患者。

[单选题]52. 关于脂肪瘤的治疗，下列说法错误的是

- A. 多数情况下，可不处理
- B. 多发脂肪瘤不行手术，仅取其一作病理
- C. 无症状的皮下脂肪瘤应积极手术，以防恶变
- D. 脂肪瘤切除后应送病理，进一步明确其性质
- E. 切除时，应尽量连同包膜一并切除

参考答案: C

[单选题]53. 鳞状细胞癌的好发部位是()

- A. 头面部
- B. 颈部
- C. 躯干
- D. 足底

参考答案: A

[单选题]54. ROP4A 期病变指()

- A. 周边视网膜有血管区与无血管区之间隆起呈嵴状
- B. 嵴伴有视网膜外纤维血管组织增殖
- C. 局部视网膜脱离累及黄斑
- D. 局部视网膜脱离，黄斑区未脱离
- E. 视网膜全脱离

参考答案：D

参考解析：ROP1 期病变：有血管与无血管的视网膜交界处出现一条白色分界线，位于视网膜平面内。2 期病变：分界线增粗、隆起呈嵴状，颜色可从白色转为粉色。3 期病变：嵴伴有视网膜外纤维血管组织增殖。4 期 A：局部视网膜脱离，黄斑附着。4 期 B：局部视网膜脱离，黄斑脱离。5 期：视网膜全脱离。

[单选题]55. 通过让病人观察和模仿来矫正其不良行为，属于行为矫正中的

- A. 脱敏法
- B. 强化法
- C. 厌恶法
- D. 示范法
- E. 消除法

参考答案：D

[单选题]56. 以下选项中，错误的是()

- A. 原始玻璃体中充满玻璃体血管
- B. 视网膜神经上皮和色素上皮分别由视杯内、外层发育而来
- C. 眼眶由中胚叶发育而成，且较眼球发育缓慢
- D. 虹膜睫状体均由中胚叶发育而来
- E. 视网膜中央血管系统由玻璃体动脉逐渐形成

参考答案：D

参考解析：虹膜睫状体内面两层上皮来源于神经外胚叶，其余部分来源于中胚叶。

[单选题]57. 当关节活动受限时应

- A. 先测主动关节活动度，后测被动关节活动度
- B. 先测被动关节活动度，后测主动关节活动度
- C. 主动关节、被动关节活动度先测哪项不影响结果
- D. 被检查者在检查过程中体位变动无所谓
- E. 以上均不对

参考答案：A

[单选题]58. 扫视运动的特点，除外

- A. 速度快
- B. 持续久
- C. 启动快
- D. 想象性目标也可以引发

E. 听觉目标可以引起

参考答案：B

参考解析：扫视运动是急骤发生的快速的眼球运动，跟随运动才是持久的。

[单选题]59. 机体的免疫系统具有杀灭或排斥突变细胞功能的是

- A. 免疫防御
- B. 免疫稳定
- C. 免疫监视
- D. 细胞免疫
- E. 体液免疫

参考答案：C

[单选题]60. 关于创伤愈合过程中，炎症期的描述不正确的是

- A. 创口或组织裂隙，先为积血充满，而后凝固为血块
- B. 由于伤后变质，渗出，增生，可表现为局部红肿痛
- C. 周围组织炎症反应活跃，伤后2~3天达高峰，若无继发感染随后减轻
- D. 损伤性炎症不利于局部防御和修复
- E. 若炎症反应剧烈，伤口感染可使胶原纤维增多，疤痕严重

参考答案：D

[单选题]61. 内源性凝血系统始动反应首先是：

- A. X因子被激活
- B. VIII因子被激活
- C. XII因子被激活
- D. VII因子被激活
- E. 组织因子（III因子）激活

参考答案：C

[单选题]62. 患者女，32岁。小阴唇内侧密集小丘疹，表面光滑，不融合，呈“鱼籽状”，自觉症状缺如，醋酸白试验（-），应诊断为

- A. 尖锐湿疣
- B. 扁平湿疣
- C. 生殖器疱疹
- D. 女阴假性湿疣
- E. 鳞癌

参考答案：D

参考解析：女性假性湿疣表现为小阴唇内侧密集小丘疹，呈鱼籽状，无自觉症状，醋酸白试验阴性。

[单选题]63. 股骨骨折患者，复位后，用长腿石膏固定，4个月骨折愈合拆除石膏后，发现膝关节功能障碍，其原因是

- A. 肌肉萎缩
- B. 关节僵硬

- C. 关节强直
- D. 骨折复位不理想
- E. 骨折畸形愈合

参考答案：B

参考解析：关节僵硬：多因长期固定，或在治疗中没有进行适当功能锻炼所致。

[单选题]64. 扁桃体的神经主要来自

- A. 舌咽神经咽支
- B. 迷走神经咽支
- C. 副神经
- D. 舌神经
- E. 交感神经

参考答案：A

[单选题]65. 喉垂直部分切除术的适应证中，不包括：

- A. 病变侵犯一侧声带
- B. 病变侵及甲状软骨，但未波及环状软骨
- C. 病变波及前联合
- D. 病变波及声带突
- E. 病变波及喉室、室带

参考答案：B

[单选题]66. 关于全科医生的描述正确的是

- A. 全面掌握各科业务技术的临床医生
- B. 提供全部“六位一体”社区卫生服务的基层医生
- C. 能熟练处理常见健康问题，为社区群众提供上门医疗服务的基层医生
- D. 经全科医学专业培训合格，在社区提供长期负责式医疗保健照顾的医生
- E. 以预防工作为主的医生

参考答案：D

参考解析：不同的国家和地区，对全科医生均有不同的理解。D项相对最全面。

[单选题]67. 尼氏征阳性见于()

- A. 类天疱疮
- B. 水痘
- C. 疱疹样皮炎
- D. 天疱疮

参考答案：D

[单选题]68. 抗病毒药的代表药是

- A. 5-氟胞嘧啶
- B. 阿昔洛韦
- C. 氟康唑

- D. 酮康唑
- E. 两性霉素 B

参考答案: B

[单选题]69. 蛛网膜下腔出血最常见的病因为

- A. 先天性动脉瘤
- B. 脑血管畸形
- C. 颅内肿瘤
- D. 脑底异常血管网
- E. 高血压动脉硬化性动脉瘤

参考答案: A

参考解析: 备选答案均是蛛网膜下腔出血的病因, 其中先天性动脉瘤最常见, 约占 50% 以上。

[单选题]70. 氨茶碱属于()

- A. 胆碱能 M 受体阻滞剂
- B. 肾上腺素能  $\beta$  受体兴奋剂
- C. 肾上腺素能  $\alpha$  受体阻滞剂
- D. 前列腺素活性抑制剂
- E. 以上都不是

参考答案: E

[单选题]71. 室间隔缺损、房间隔缺损、动脉导管未闭及法洛四联症, 上述的先天性心脏病患儿平时最常见的并发症是:

- A. 肺炎
- B. 脑栓塞
- C. 心律失常
- D. 喉返神经麻痹
- E. 感染性心内膜炎

参考答案: A

[单选题]72. 老年人跌倒发作后最常见最严重的合并症是

- A. 内脏损伤
- B. 外伤
- C. 抑郁症
- D. 癫痫
- E. 肢体功能障碍

参考答案: B

[单选题]73. 新世纪人们医学模式和健康观念的改变是由于

- A. 传染病病死率太高
- B. 发明了治疗传染病的抗菌药物
- C. 环境严重污染

- D. 城市人口增多
- E. 慢性非传染性疾病的发病率和死亡率增加

参考答案：E

[单选题]74. 以下那一内分泌腺体的退行性改变与血中胆固醇水平提高相关

- A. 腺垂体
- B. 甲状腺
- C. 胰岛
- D. 卵巢
- E. 睾丸

参考答案：B

[单选题]75. 患者，女，30岁，右中指外伤，检查发现右中指近侧指间关节屈曲不能，考虑为

- A. 指深屈肌肌腱损伤
- B. 指浅屈肌肌腱损伤
- C. 指总深屈肌肌腱损伤
- D. 指总神经损伤
- E. 中指固有伸肌肌腱损伤

参考答案：B

参考解析：指浅屈肌司第2~5指近端指间关节与腕关节屈曲的作用。该患者右中指外伤后近侧指间关节屈曲不能，示为右中指指浅屈肌肌腱损伤。

[单选题]76. 视网膜中央动脉阻塞时形成的樱桃红斑是

- A. 中心凹的脉络膜反光
- B. 中心凹的出血
- C. 中心凹的充血
- D. 中心凹的裂孔形成

参考答案：A

[单选题]77. 性传播疾病的预防措施为

- A. 对高危人群主动监测，推广使用安全套
- B. 性病者应及时、正规治疗，按照要求复查
- C. 同时对患者性伴侣检查及治疗，治愈前做好预防措施
- D. 重视宣传教育
- E. 以上均是

参考答案：E

[单选题]78. 下述相关肝炎的描述不正确的是

- A. 甲型和戊型肝炎仅引起急性肝炎而不转为慢性
- B. 乙型与丙型肝炎可导致肝硬化
- C. 丙型肝炎在我国是肝细胞癌的主要病因
- D. 慢性乙型肝炎可导致膜性肾小球肾炎

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/898027001013006032>