

## 临床核医学习题与参考答案

### 一、单选题（共 71 题，每题 1 分，共 71 分）

1. 吸入高浓度可产生“电击样死亡”的有害气体是（ ）

- A、氮氧化物、H<sub>2</sub>S
- B、H<sub>2</sub>S、HCN
- C、HCN、光气
- D、NO<sub>2</sub>、HCN
- E、NO<sub>2</sub>、NO

正确答案：B

2. 抢救大咯血窒息时病人的体位是（ ）

- A、头高足低位
- B、平卧位
- C、仰卧位
- D、俯卧位
- E、俯卧头低足高位

正确答案：E

3. 急性虹膜睫状体炎最重要的局部治疗方法（ ）

- A、使用高渗脱水药
- B、1%阿托品扩瞳
- C、抗病毒
- D、1%毛果芸香碱缩瞳
- E、抗感染

正确答案：B

4. 呼吸衰竭通常是由于（ ）

- A、外呼吸功能障碍
- B、内呼吸功能障碍
- C、二氧化碳排出功能障碍
- D、呼吸系统病变造成机体缺氧
- E、血液携带、运输氧障碍

正确答案：A

5. 呕血病人的饮食应该是( )

- A、暂禁食
- B、软食
- C、普食
- D、冷流质
- E、半量流质

正确答案：A

6. 心肌梗死病人血清 CK 值在发病几小时即开始增高( )

- A、2~4 小时
- B、6~12 小时
- C、3~10 小时
- D、4~8 小时
- E、12~24 小时

正确答案：A

7. 引起副溶血性弧菌食物中毒的主要食物是( )

- A、剩米饭、凉糕
- B、海产品及盐渍食品
- C、罐头食品
- D、家庭自制豆制品
- E、奶及奶制品

正确答案：B

8. 处理骨折病人时, 应首先掌握的原则是( )

- A、立即将骨折端嵌入进行复位
- B、抢救生命
- C、迅速安全转运伤员
- D、输液或输血
- E、妥善处理伤口, 并简单有效固定

正确答案：B

9. 门脉高压的临床表现是( )

- A、脾大、腹水、胃肠淤血、侧支循环建立

- B、腹水、胃肠淤血、侧支循环建立、肝大
- C、脾大、黄疸、腹水、肝大
- D、肝萎缩、腹水、胃肠淤血
- E、脾大、腹水、胃肠淤血、肝大

正确答案：A

10. 免疫系统包括( )

- A、胸腺、骨髓
- B、T 细胞、B 细胞
- C、免疫器官、免疫细胞
- D、免疫器官、免疫分子
- E、免疫组织、免疫器官、免疫细胞、免疫分子

正确答案：E

11. 脑室穿刺引流术后一般每天引流脑脊液量不超过( )

- A、100ml
- B、400ml
- C、500ml
- D、300ml
- E、200ml

正确答案：C

12. 病原菌侵入血流并在其中大量繁殖, 造成机体严重损伤, 引起严重的症状称为( )

- A、毒血症
- B、脓毒血症
- C、菌血症
- D、败血症
- E、病毒血症

正确答案：D

13. 氧气加压舱急排放应能使最高工作压到降至表压 0.01MPa 的时间不超过( )

- A、2 分钟

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/898061003137007005>