CDFI 彩超上岗证《历年彩超上岗题考试资料》考试题

姓名:	年级:	学号:
/ 	1 -2/2	J J ·

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分		

1、单项选择题:三尖瓣返流时超声检查能观察到什么表现: A. 左心房扩大

- B. 主动脉增宽
- C. 三尖瓣口明显变小, 瓣叶可合拢
- D. 彩色多普勒及频谱多普勒显示血流从右心室流向右心房
- E. 二尖瓣增厚
- 2、单项选择题: 原发孔房间隔缺损在二维超声检查时有什么所见: A. 显示房间隔最低位处(房室间隔连接处) 缺损
 - B. 显示左心室扩大
 - C. 显示房间隔最上部(近心房顶部处)缺损
 - D. 显示室间隔上段缺损
 - E. 显示房间隔中央部缺损
- 3、单项选择题:关于输尿管结石的诊断,不正确的是:A. 患侧常伴有肾绞痛
 - B. 结石易出现在输尿管狭窄部
 - C. 积水输尿管远端末见强回声团者即除外输尿管结石
 - D. 积水的输尿管远端出现结石强回声团
 - E. 患侧输尿管出口喷尿减弱或消失
- 4、多项选择题:接收体或振动源如何运动可使接收频率减小(选择二项)
 - A、接收体背离振动源运动
 - B、振动源向着接收体运动
 - C、振动源背离接收体运动
 - D、接收体向着振动源运动
 - E、振动源与接收体对向运动
- 5、单项选择题: 胃肠道最常出现的伪像是
 - A、声影
 - B、侧边折射声影伪像
 - C、振铃效应
 - D、棱镜伪像
 - E、后方回声增强
- 6、单项选择题:一患者查体发现肝后叶下段一个 0.8cm 强回声斑块,后伴明显声影,周围无门静脉分支,肝内外胆管无扩张,其可能诊断是为: A. 肝内胆管结石
 - B. 肝内钙化灶

- C. 肝内胆管积气
- D. 肝圆韧带断面
- E. 以上都不是
- 7、单项选择题:简化的伯努利(Bernoulli)方程是
 - A, $\triangle P = 4 \vee 2min$
 - $B \land \triangle P = 4 \lor 2 \max$
 - $C \land \triangle P = (V22-V22) \lor 2min$
 - $D \cdot P = C / 2 gh$
 - $E \setminus \triangle P = dv/dt + R(V)$
- 8、单项选择题:人体软组织平均衰减系数大致为 A. O. 5dB/cmMHz
 - B. 1dB/cmMHz
 - C. 2dB/cmMHz
 - D. 3dB/cmMHz
 - E. 5dB/cmMHz
- 9、单项选择题:下列哪一种组织或界面回声最强:A. 肾中央区(肾窦区)
 - B. 主动脉壁
 - C. 脏层胸膜--肺
 - D. 腹直肌
 - E. 横膈(包括膈胸膜)
- 10、单项选择题: 超声波在人体软组织中传播的主要方式是
 - A、表面波
 - B、横波
 - C、纵波
 - D、反射波
 - E、折射波
- 11、单项选择题:检查肝细胞癌的病灶内血流,用哪一项彩色多普勒技术最简便有效())
 - A、M 型彩色多普勒
 - B、彩色多普勒血流成像
 - C、频谱多普勒
 - D、彩色多普勒能量图与超声造影并用
 - E、以上都不是
- 12、单项选择题: 下述心肌超声造影对冠心病的诊断用途, 哪一项是错误的 A. 检测心肌梗塞区
 - B. 使冠脉扩张, 血流加速
 - C. 检测心肌缺血区
 - D. 评价介入治疗疗效
 - E. 鉴别心肌存活与否
- 13、单项选择题:妊娠头三个月,盆腔超声检查,下列哪一项最常见:A. 黄素囊肿
 - B. 黄体囊肿
 - C. 皮样囊肿
 - D. 卵巢旁囊肿
 - E. 卵巢囊腺瘤
- 14、单项选择题: 超声波产生的原理是

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载 或阅读全文,请访问: https://d.book118.com/906040044144010122