

胸外科专科理论知识考核

一、选择题

1 . 男性, 55 岁, 有吸烟嗜好, 每日 1 包。曾患肺结核疾病, 两个月前因高热、呼吸困难住院, 诊断为结核性胸膜炎, 治疗后胸片示左侧胸腔内大量积液。穿刺抽出脓液, 给予胸腔抽脓及全身抗菌药物治疗, 病人体温正常后要求出院, 未进一步做胸片检查。病人主诉近来一直咳嗽, 食欲不好, 并日渐消瘦。体检发现胸廓内陷, 呼吸运动减弱, 肋间隙变窄, 听诊示呼吸音减弱。支气管偏向左侧。RBC $3 \times 10^9/l$, Hb $6.5g/l$ 该病人目前的诊断可能为

() [单选题] *

A. It11B®

BT 慢性脓胸 ✓

C. 张力性气胸

D. 闭合性气胸

E 急性脓胸

2 . 男性, 18 岁, 慢性咳嗽, 左侧胸痛, 经摄片诊断为左侧结核性胸膜炎并中量积液, 积极抗结核治疗 3 周, 积液未减少, 穿刺 3 次, 共抽出淡黄清亮液体 1600ml , 每次胸穿后均向胸腔内注射异烟肼 0.3g 昨日起突发高热, 呼吸困难, 血象: WBC $16 \times 10^9/l$, 中性粒细胞比率为 0.89。胸部 X 片示胸膜腔内积液量较前增多。为明确诊断, 首

选的辅助检查是 () [单选题] *

A. 胸部 X 线检查

B 胸部 CT

C.胸部超声波检查

D.胸腔镜检查

E.胸膜腔穿刺 V

3 .男，58 岁，因进行性吞咽困难 4 个月就诊入院，经食管镜检查示食管中段 6cm 长之管腔狭窄，黏膜中断，病理报告为鳞癌口级。查体：锁骨上无肿大淋巴结。无声嘶。手术后最严重的早期并发症有（） [单选题]

*

A.胸膜腔感染

8 .反流性食管炎

C.吻合口瘘 ✓

D.吻合口狭窄

E.肺不张或肺感染

4. 开放性气胸病人的主要病理生理变化为（） [单选题] *

A.反常呼吸运动

B.纵隔扑动 ✓

C.纵隔向健侧移位

D.肺内气体对流

E.呼吸衰竭

5 男性，55 岁，有吸烟嗜好，每日 1 包。曾患肺结核疾病，两个月前因高热、呼吸困难住院，诊断为结核性胸膜炎，治疗后胸片示左侧胸腔内大量积液。穿刺抽出脓液，给予胸腔抽脓及全身抗菌药物治疗，病人体温正常后要求出院，未进一步做胸片检查。病人主诉近来一直咳嗽，食欲不好，并日渐消瘦。体检发现胸廓内陷，呼吸

运动减弱，肋间隙变窄，听诊示呼吸音减弱。支气管偏向左侧。RBC $3 \times 10^9/L$, Hb $6.5g/L$ 该病人如行胸廓成形术，

进行康复训练错误的是（） [单选题] *

- A. 采取正直姿势
- B. 练习头部前后左右回转运动
- C. 练习上半身的前屈运动
- D. 练习上半身的左右弯曲运动
- E. 启术后第 3 日开始上肢运动 ✓

6. 女，56 岁，进行性吞咽困难 2 月余，体重明显减轻，临床诊断为食管癌，择期近日行手术治疗，术前护理错误的是（） [单选题] *

- A. 术前应纠正营养不良
- B. 因是食管手术，无需戒烟 ✓
- C. 每日刷牙、漱口，保持口腔清洁
- D. 嘱病人术前练习深呼吸
- E. 教会病人有效咳痰方法

7. 男，63 岁，进行性吞咽困难 3 个月，近 1 周出现声音嘶哑。下列检查可明确诊断的是（） [单选题]

*

- A. 胸部 X 线+心电图+胸部 CT
- 8. 腹部 B 超+痰细胞学检查
- C. 食管镜+胸部 MRI+ 纤支镜
- D. 食管吞钡+食管镜 ✓

9. 癌胚抗原+核素 ^{32}P 扫描+胃液分析

8. 心绞痛病人询问护士引起该疾病的主要原因时，护士最好的回答是（） [单选题] *

A 很多原因引起这个疾病，目前病因不清楚

B.是吸烟引起的

C.可能与血管退行性病变有关

D.高血压是引起该病的常见危险因素 ✓

E.主要是冠状动脉畸形引起的

9. 男性，45 岁，酒后驾车发生车祸，急诊收入院，查体：左侧胸部夕附，左侧肋骨骨折伴开放性伤口，呼吸时，伤口处可闻及“嘶嘶”声，BP65 / 39mmHg.经处理后病人病情好转，医生考虑为其拔出引流管，以下不符合拔管条件的指征是（） [单选题] *

A.无气体逸出

B. 24小时引流脓液 15ml ✓

C. 24小时引流液 20ml

D. 24 小时引流液 40ml

X 线胸片示肺膨胀情况较好

10. 食管癌病人出现持续性胸背痛多提示（） [单选题] *

A.癌肿部位有炎症

B.癌肿已侵犯食管外组织 ✓

C.有远处血行转移

D.有食管气管瘘

E.癌肿较大

I1 主动脉狭窄病人术前一日护士评估时发现其血离子水平不稳定，护士需要通知医师采取措施的指标是（）

[单选题] *

- A. 血钠 140mmol/l
- B. 血钙 2.32mmol/l
- C. 血钾 3.1mmol/l ✓
- D. 血氯 101mmol/l
- E. 血糖 6.6mmol/l

12. 李先生，70岁，因突发性心前区疼痛急诊入院。入院后，护士应首先采取的措施是（） [单选题]

- A. 介绍急诊室环境
- B. 吸痰
- C. 应用止痛药控制心前区疼痛
- D. 抽血测量血淀粉酶
- E. 心电监护 ✓

13. 女性，22岁，因阵发性胸闷、气短、心悸13年，加重1年，以“先天性二尖瓣狭窄”收入院，计划在“全麻体外循环下行二尖瓣成形术”。术后病人监测血气分析，需通知医师进行处理的结果是（） [单选题] *

- A. pH7.40
- B. PaCO₂40mmHg
- C. SaO₂95%
- D. PaO₂75mmHg ✓
- E. HCO₃⁻25mmol/l

14. 男，58岁，因吞咽哽噎感半年来院就诊，目前仅能进半流质食物。查体：稍消瘦，锁骨上可扪及肿大淋巴结。食管吞钡X线片示食管中下段4cm长之局限性管壁僵硬，黏膜部分中断。钡剂尚能通过。首先考虑的诊断为（） [单选题] *

A.食管炎

15 食管癌 ✓

C.食管良曲中瘤

D.贲门失迟缓症

E.食管憩室

15. 男, 63 岁, 进行性吞咽困难 3 个月, 近 1 周出现声音嘶哑。如该病人行手术治疗, 术后 5 日, 胸腔引流管已拔除, 进食后突感胸痛气短, 体温 38°C , 应高度怀疑的并发症是 () [单选题]

A.吻合口瘘 ✓

B.乳糜胸

C.胸膜腔感染

D.吻合口狭窄

E.反流性食管炎

16. 与动脉导管未闭病人心输出量降低无关的是 () [单选题] *

A.心脏畸形

B.高血压 ✓

C.血容量不足

D.心律失常

E.水、电解质失衡

17. 下列有关肺切除术后并发症支气管胸膜瘘的描述中, 错误的是 () [单选题]

A.多发生于术后 1 周

B.由于支气管残端血运不良, 支气管缝合处破裂引发

C.表现为从胸腔引流管持续引出大量气体

D.用亚甲蓝注入胸膜腔，病人可咳出带有亚甲蓝的痰液

E.一旦发生，应置病人于健侧卧位，使用抗生素防感染 V

18.反常呼吸运动常见于（） [单选题] *

A.开放性气胸

B.闭合性气胸

C.张力性气胸

D.多根多处肋骨骨折 ✓

E.损伤性血胸

19.王先生，47岁。右上叶肺癌切除术后24小时，肺癌的非转移性全身症状即逐渐消失。此类症状一般不包括（） [单选题] *

A.骨关节病综合征

B.重症肌无力

C.多发性肌肉神经痛

D. Cushing综合征

E.女性闭经 ✓

20.男性，55岁，有吸烟嗜好，每日1包。曾患肺结核疾病，两个月前因高热、呼吸困难住院，诊断为结核性胸膜炎，治疗后胸片示左侧胸腔内大量积液。穿刺抽出脓液，给予胸腔抽脓及全身抗菌药物治疗，病人体温正常后要求出院，未进一步做胸片检查。病人主诉近来一直咳嗽，食欲不好，并日渐消瘦。体检发现胸廓内陷，呼吸运动减弱，肋间隙变窄，听诊示呼吸音减弱。支气管偏向左侧。RBC $3 \times 10^9/l$ ，Hb $6.5g/l$ 。该病人的护理措施不正确的是（） [单选题] *

A.鼓励病人有效咳嗽、排痰

B.用较细的引流管进行引流以便减少刺激，减轻疼痛 V

C.指导病人作腹式深呼吸

D.可给予少量多次输血

E.行胸膜纤维板剥脱术后应严密观察生命体征

21 .以引流积液为目的的胸腔闭式引流管放置于（） [单选题] *

A.锁骨中线第2肋间

B.锁骨中线第3肋间

C.锁骨中线第4~5肋间

D.腋中线和腋后线之间第6或第7肋间 ✓

E.腋前线第6~8肋间

22 .下列有关预防肺结核病人肺切除术后并发症的措施中，错误的是（） [单选题] *

A.术前予有效抗结核6~8个月

B.正确掌握手术适应证和手术时机

C.严格无菌操作，防止胸膜腔污染

D.保持术后胸膜腔引流通畅，注意观察引流液的量、色和性状

E.术后抗菌和抗结核治疗1周，

23 .男，63岁，进行性吞咽困难3个月，近1周出现声音嘶哑。行该手术6日后，病人恢复普食，餐后出现胸闷、呼吸困难，正确的处理是（） [单选题] *

A.嘱病人平卧

B.建议病人少食多餐，症状多可缓解 ✓

C.给病人吸氧

D.给病人行鼻导管吸痰

E.给病人行纤维支气管镜吸痰

24 .男，56岁。咳嗽、咳痰、痰中带血丝、低热2月余，吸烟30余年。精神差，消瘦。胸片示左上肺第2肋间近外侧胸壁处有直径约3.5cm的密度不均匀阴影，边缘模糊，痰液抗酸染色发现抗酸杆菌。若在一段时间后该病人返院行肺叶切除术，术后护理措施中错误的是（） [单选题] *

- A.病人在麻醉清醒、生命体征平稳后取半坐位
- B.术后3小时内，每15分钟测1次生命体征
- C.已连续3小时胸腔引流出血性液体150ml / h,继续观察 ✓
- D.病人清醒后立即鼓励并协助其做深呼吸和咳嗽
- E.遵医嘱应用抗生素预防感染

25 .王先生，59岁。近2个月出现咳嗽、咳少量痰，胸闷、气促等表现，来门诊就诊。经询问得知病人为石棉装饰材料公司生产车间员工，10年前曾患右上肺结核，吸烟40年，每日2包，现已戒烟4年，喜食甜食。20年前父亲因肺癌去世，母亲健在，门诊X线检查发现右肺门处有一直径约3.2cm球形阴影，后行CT检查和经胸壁穿刺检查，确诊为肺鳞癌。拟行右侧全肺切除术+淋巴结清扫术。术后病人麻醉清醒、生命体征平稳，应采取的体位是（） [单选题] *

- A.平卧位
- B.健侧卧位
- C.俯卧位
- D.患侧卧位
- E. 1/4侧卧位 ✓

B

一、AI型题

1、关于肋骨骨折的临床特点，下列选项不正确的是（） [单选题] *

- A.较易发生骨折的是第4~7肋骨

B.肋骨骨折可引起胸内脏器和膈肌的损伤

C.血胸和气胸是肋骨骨折的常见并发症

D.老年人肋骨骨质疏松，不容易发生骨折 ✓

E.多根多处肋骨骨折可出现呼吸反常运动

2、结肠代食道手术患者术前（）应禁食。 [单选题] *

A. 2小时

26 1天 ✓

C. 3天

D. 8小时

3、关于肋骨骨折发生部位与年龄的特点，下列选项不正确的是（） [单选题] *

A.第1~3肋骨粗短，不易发生骨折

B.第4~7肋骨长而薄，最易折断

C.第8~10肋骨前端肋软骨形成肋弓与胸骨相连，不易骨折

D.儿童肋骨不易骨折，老年人肋骨容易骨折

E.第11、12肋骨前端游离不固定，易发生骨折 ✓

4、胸壁失去完整的肋骨支撑而软化，出现反常呼吸运动，即吸气时软化区胸壁内陷，呼气时外突，又称为连枷胸。发生的原因是（） [单选题] *

A.肋骨骨折伴胸骨骨折

B.多根多处肋骨骨折，

C.两根以上肋骨骨折

D.肺挫伤增加呼吸肌做功

E.肋骨骨折合并气胸

5、下列进行性血胸的诊断依据，错误的是（） [单选题] *

A.中心静脉压 $>10\text{cmH}_2\text{O}$ ✓

B.血压逐渐下降，脉搏逐渐增快

C.补液后血压不升或升高后又迅速下降

D.血红蛋白、血细胞比容持续下降

E.胸腔闭式引流 $>200\text{ml/h}$,持续3小时

6、以引流积气为目的的胸腔闭式引流管位置放置于 [单选题] *

A.锁骨中线第2肋间 ✓

B.锁骨中线第3肋间

C.腋中线和腋后线之间第6或第7肋间

D.锁骨中线第6-8肋间

7、下列对开放性气胸的紧急处理措施中，首先要采取的是（） [单选题] *

A.立即行气管内插管呼吸器辅助呼吸

B.立即面罩给氧

C.立即行清创术

D.立即用无菌不透气材料覆盖包扎伤口 ✓

E.立即行胸腔闭式引流术

8、胸腔闭式引流术的适应证是（） [单选题] *

A.脓胸脓液黏稠需要持续排脓者

B.中等量血胸者

C.气胸需要持续排气者

D.剖胸手术者

E.以上都是 ✓

9、下列肋骨骨折的处理原则，不正确的是（） [单选题] *

- A. 镇痛
- B. 清理呼吸道分泌物，早期下床活动
- C. 尽早施行切开复位内固定术 ✓
- D. 固定胸廓
- E. 防治并发症

10、张力性气胸的急救处理措施是（） [单选题] *

- A. 气管切开
- B. 患侧锁骨中线第2肋间粗针头穿刺排气 ✓
- C. 开胸探查
- D. 面罩吸氧
- E. 输血、输液抗休克

11. 胸部手术后鼓励患者咳嗽深呼吸的主要目的是 [单选题] *

- A. 促进伤口愈合
- B. 预防肺不张 ✓
- C. 保持呼吸道通畅
- D. 有利于引流通畅

12、关于张力性气胸的病理生理改变,下列选项错误的是（） [单选题] *

- A. 气管、支气管或肺损伤处形成活瓣，气体随吸气进入胸膜腔积累增多，胸膜腔压力>大气压
- B. 引起纵隔扑动 ✓
- C. 伤侧肺严重萎缩，纵隔显著向健侧移位，健侧肺受压，导致腔静脉回流障碍
- D. 高于大气压的胸膜腔内压，驱使气体进入纵隔形成纵隔气肿
- E. 进入胸壁软组织,形成面、颈、胸部的皮下气肿

13、下列哪项不是食管癌术后常见的严重并发症? [单选题] *

A、吻合口瘘

B、乳糜胸

C、肺部感染

D、喉上神经损伤 ✓

14、发生支气管胸膜瘘时，应将病人置于 [单选题] *

A 患侧卧位 ✓

B.平卧位

C 半卧位

D.健侧卧位侧位片气体聚积在颈深筋膜下

15、肺癌的早期常见的症状是 [单选题] *

A.食欲减退

B 持续性胸痛

C.刺激性干咳、痰中带血 ✓

D.大咯血

16、食管恶性肿瘤病人化疗期间，白细胞降至 $3 \times 10^9 / l$ 以下，处理首先应 [单选题] *

A.加强营养

B.服用生血药

C.隔离保护

D.暂停用药影 ✓

17、食管癌好发部位，是 [单选题] *

A.颈部食管

B.胸部食管上段

C.胸部食管中段 ✓

D.胸部食管下段

- A.挫伤的肺应根据情况做肺段或肺叶切除 ✓
- B.进行性血胸应剖胸探查
- C.少量血胸可保守治疗
- D.胸腔中量以上积血应早期胸穿或闭式引流
- E.凝固性血胸应在出血停止数日内剖胸清除血块

19、食道吻合口瘘多发生在术后 [单选题] *

- A. 2-3天
- B. 2-10天
- C. 5-10天 ✓
- D. 5-7天

20、食管癌切除术后出现乳糜胸多发生在 [单选题] *

- A.术后 2-10天 ✓
- B.术后 10-15天
- C.术后 15-20天
- D.术后 3-4周

21、下列施行胸腔闭式引流术的要领中，不正确的是（） [单选题]

- A.取半卧位
- B.气胸引流在胸壁锁骨中线第2肋间
- C.血胸或脓胸在腋中线与腋后线间第6或第7肋间隙
- D.引流管的侧孔应深入胸腔内6~8cm ✓
- E.术后保持引流管通畅

- A.患侧卧位
- B.头低足高仰酣立
- C.健侧卧位 ✓
- D. 1/4 侧卧位

23、王先生，59岁。拟行右侧全肺切除术+淋巴清扫术。该病人术后护理措施错误的是 [单选题] *

- A.密切观察生命体征
- B.记录24小时出入量
- C.遵医嘱严格掌握输液量和输液速度
- D.术后给予镇咳药，防止咳嗽引起切口疼痛 ✓

24、对全肺切除术后病人，正确的护理措施是 [单选题] *

- A.24小时 卜液量 3000ml
- B.输液速度速度以 50 滴/分钟
- C.取全患侧卧位
- D.取 1/4 侧卧位 ✓

25、胸外科病人术前护理要点是 [单选题] *

- A.做好呼吸道准备，改善肺功能 ✓
- B.密切监测生命体征变化
- C.补充营养和能量
- D.维持水电解质与酸碱平衡

26、胸腔闭式引流出血性液体，下列哪种情况提示可能出血 [单选题] *

- A.每小时引流出 100ml,连续三个小时
- B.每小时引流出 200ml,连续三个小时 ✓

C.每小时引流出 300ml ,连续三个小时

D.每小时引流出 400ml ,连续三个小时

27、护士可以执行医生口头医嘱的情况是 [单选题] *

A.医生抢救患者时 ✓

B.医生手术结束后

C.医生电话告知时

D.医生换药期间

二、A2 型题

30、男性，40岁，因气胸行胸膜腔闭式引流时，发现胸瓶长玻璃管内水柱无波动，嘱病人作深呼吸后，水柱仍无波动，提示 [单选题] *

A.胸膜腔内负压尚未恢复

B.胸膜腔内负压已恢复

C.胸膜腔内负压过大

D.引流管阻塞 ✓

31、女性，20岁，胸外伤导致血气胸，行气胸闭式引流术，下列哪项不是拔管指证 [单选题] *

A.胸部 X 线检查显示肺膨胀良好

B.病人无呼吸困难

C. 24h 引流量小于 200ml ✓

D.引流 48-72h 后

32、患者男，52岁。胸部撞伤 2 小时。查体：血压 105/75mmHg。气管向左侧移位，右胸壁广泛皮下捻发音，右胸叩诊鼓音，呼吸音明显减弱。X 线胸片：右第 4、8、9 肋骨骨折，左第 7、8、9 肋骨骨

A.牵引固定

B.胸带固定

C.胸腔闭式引流术 ✓

D.剖胸探查术

E.气管插管，辅助呼吸

33、患者，女，60岁拟择期行食管癌切除手术。现患者能进食米粥之类的食物，护士建议的饮食为 [单选题]

*

A.高热量、低蛋白、低脂肪流食

B.高热量、低蛋白、低脂肪半流食

C.高热量、高蛋白、高维生素半流食 ✓

D.高热量、低蛋白、高维生素半流

34、患者女，32岁。2周前因受凉后咳嗽，咳黄痰，伴寒战、高热。经用抗生素治疗后症状缓解。3天前出

现胸痛，伴呼吸困难。X线胸片：右侧胸腔有外高内低弧形密度增高影。胸腔穿刺抽出脓液。目前应采取的治疗

是 () [单选题] *

A.卧床休息，持续低流量给氧

B.应用广谱抗生素

C.全身支持治疗

D.立即施行胸腔闭式引流术 ✓

E.保守治疗观察三天，再决定治疗方案

35、男性，38岁，车祸伤半小时。查体.发绀，烦躁不安，呼吸困难。左胸第5肋间处见直径约4cm不规则

创口并可闻及气体进出声。此病例的病理生理改变是男性，38岁，车祸伤半小时。查体.发绀，烦躁不安，呼吸

困难。左胸第5肋间处见直径约4cm不规则创口并可闻及气体进出声。此病例的病理生理改变是 [单选题] *

- A.纵隔扑动造成循环衰竭 ✓
- B.急性肺水肿导致气体交换降低
- C.纵隔向健侧移位，伤侧肺代偿性膨胀
- D.胸膜腔内压力不断升高导致呼吸衰竭

36、患者女，42岁。摔倒后右胸痛4小时。查体：右胸压痛，两肺呼吸音稍低，无啰音。X线胸片：右侧

第5、6肋骨骨折，双侧肋膈角锐下列治疗中，最重要的是（） [单选题] *

- A.应用镇痛药或肋间神经阻滞
- B.鼓励咳嗽排痰
- C.防治肺部并发症
- D.多头胸带或弹力束胸带固定 ✓
- E.手术复位内固定或肋骨牵引固定

37、患者男，34岁。高处坠落后昏迷，呼吸困难1小时。查体：左侧胸壁大面积软化，两肺满布痰鸣音。动

脉血气分析：PaO₂58mmHg, PaCO₂50mmHg 首先应采取的急救措施是（） [单选题] *

- A.伤侧胸壁胶布固定
- B.胸壁加压包扎
- C.胸壁牵引
- D.气管插管或气管切开 ✓
- E.手术切开复位内固定肋骨

38、30岁男性闭合性气胸患者，胸片示肺组织压缩30%，进一步处理应选择 [单选题] *

- A.闭式胸腔引流
- B.闭式胸腔引流同时应用抗生素

C.胸腔穿刺抽尽气体，择期剖胸探查

D.保守治疗，密切随访 ✓

39、患者男，60岁。咳嗽，痰中带血，间歇低热3个月。有肺结核病史。X线胸片：右肺下叶底部可见3cm×3cm球形病灶，3次痰找癌细胞阴性。对于该患者，诊断首先应考虑（） [单选题] *

A.肺结核

B.肺脓肿

C.肺囊肿

D.肺癌 ✓

E.肺炎

三、A3/A4型题（每题2分，共20分）

（40题~41题共用题干）患者男，21岁。胸部挤压伤1小时。查体：气急，眼睑结膜及头面部皮下广泛紫蓝色点状瘀斑。双肺听诊散在细湿啰音。X线胸片：未见明显异常。

40、根据患者情况，最可能的诊断是（） [单选题] *

A.心脏挫伤

B.创伤性窒息 ✓

C.心包压塞

D.气胸

E.血胸

41、正确的急诊处理措施是（） [单选题] *

A.气管插管，呼吸机辅助呼吸

B.气管切开，呼吸机辅助呼吸

C.吸氧、镇静、观察生命体征 ✓

D.应用止血药

E.应用抗生素

(42题~44题共用题干) 男性, 60岁, 不明原因咳嗽3个月, 痰中偶带血丝。胸部X线平片显示右上肺炎症表现。

42、为进一步明确诊断, 下列哪项检查程序最恰当 () [单选题] *

A.核素扫描一痰细胞学检查

B.痰细胞学检查一开胸探查

C.胸腔穿刺肺组织活检一CT检查

D.痰细胞学检查一CT一纤维支气管镜检查 V

E.纵隔镜检查一前斜角肌脂肪垫活检

43、患者1个月前出现右侧眼睑下垂, 眼球内陷, 瞳孔缩小, X线检查示右肺尖部有一密度增高影, 其最可能临床诊断是 () [单选题] *

A.浸润型肺结核

B.中央型肺癌

C.肺上沟瘤 ✓

D.转移瘤

E.结节型细支气管肺泡癌

44、患者出现上述Horner综合征是由于肿瘤压迫 () [单选题] *

A.臂丛神经

B.膈神经

C.上腔静脉

D.喉返神经

E.颈交感神经,

四、B型题(每题2分,共4分)

(45题~46题共用题干)

A.联合应用广谱抗生素

B.胸腔闭式引流

C.消除脓腔

D.胸膜纤维板剥脱术

E.彻底排净脓液

45、急性脓胸最重要的治疗原则是() [单选题] *

答案:EV

46、慢性脓胸最重要的治疗原则是() [单选题] *

答案:CV

五、X型(多选题)(每题2分,共2分)

47、确诊肺癌的依据是() [多选题] *

A.痰细胞学检查 ✓

B.咳嗽、咯血、胸闷

C.胸部X线摄片有圆形阴影

D.纤维支气管镜检查及活组织检查 ✓

E.以上均不正确

六、案例分析题(每题3分,共9分)

(48题~50题共用题干)

患者,男性,25岁,车祸伤1小时。查体:脉搏130次/分,血压86/60mmHg,烦躁不安,发绀,严重呼吸困难,皮肤湿冷,左颈胸部皮下捻发感,气管右移,左胸饱满,左肺呼吸音消失。胸片示左肺完全萎陷。

48、最可能的诊断为() [单选题] *

- A.左侧进行性血胸
- B.左侧闭合性气胸
- C.左侧开放性气胸
- D.左侧张力性气胸 ✓

49、张力性气胸穿刺排气的部位（） [单选题] *

- A.伤侧腋前线第2肋
- B.伤侧腋前线第4肋
- C.伤侧锁骨中线第2肋 ✓
- D.伤侧腋后线第3-4肋

50、胸部损伤后与预防肺部并发症无关的是（） [单选题] *

- A.使用抗生素
- B.疼痛时用杜冷丁止痛 ✓
- C.保持呼吸道通畅
- D.鼓励深呼吸

C

1、代谢性酸中毒的临床表现为（） [单选题] *

- A、呼吸快而浅
- B、呼吸慢而浅
- C、尿液呈碱性
- D、钾离子进入细胞内
- E、呼吸深而快 ✓

2、休克病人的神志意识变化可反映（） [单选题] *

- A、血容量变化情况

B、周围血管阻力变化情况

C、心排血量变化情况

D、脑部血液灌流情况 ✓

E、组织缺氧情况

3、破伤风病人最常见的死因（） [单选题] *

A、强烈痉挛引起的骨折

B、水、电解质平衡紊乱

C、急性肾衰竭

D、心力衰竭

E、窒息 ✓

4、胃大部分切除术后 24 小时内因特别注意（） [单选题] *

A、切口情况

B、腹痛情况

C、体温变化

D、出血情况 ✓

E、肛门排气、排便情况

5、关于腹外疝手术前后的护理哪一项是错误的（） [单选题] *

A、腹股沟疝术后，应在患侧膝下点一小枕头

B、择期手术前，应治愈或控制可引起腹内压升高的疾病

C、股疝和腹股沟疝术前应严格准备会阴部皮肤

D、腹股沟斜疝术后阴囊托起是无意义的 ✓

E、术后 3 个月内应避免重体力劳动

6、胃、十二指肠溃疡穿孔病人术前护理哪项不正确（） [单选题] *

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/906200043154010151>