

# 2024 年公共卫生与预防医学题库

## 第一部分 单选题(300 题)

1、护士上午铺好无菌盘后,因临时有事离开 2 个小时后需使用该无菌盘,其应采取【单选题】——

- A. 将原来铺好的重新消毒
- B. 另取一个未经消毒的
- C. 使用昨天使用过的
- D. 使用原来铺好的                      使用未使用但经消毒的

【答案】： D

2、判断某传染病患者是否为医院感染引起的主要依据是【单选题】——

- A. 临床症状期
- B. 检查结果
- C. 病程
- D. 潜伏期                      传染期

【答案】： D

3、手术间通常保持的温度【单选题】——

- A. 22~26℃
- B. 18~20℃
- C. 22~25℃
- D. 20~22℃                      16~18℃

【答案】： C

4、霍乱病人应采取【单选题】——

- A. 接触隔离
- B. 保护性隔离
- C.

呼吸道隔离

D. 消化道隔离 严密隔离

【答案】：E

5、手术部位感染的常见诱因【单选题】——

A. 留置导尿管

B. 气管切开

C. 两者均是

D. 两者均否

【答案】：D

6、除灭菌速度快、灭菌效果好、经济、环境污染小的压力蒸气灭菌法外,目前最常用的低温灭菌方法是【单选题】——

A. 环氧乙烷灭菌法

B. 戊二醛浸泡灭菌法

C. 辐射灭菌法

D. 过氧乙酸浸泡灭菌法 微波灭菌法

【答案】：A

7、医院发现一次性使用无菌医疗用品不合格产品或质量可疑产品时,应【单选题】——

A. 立即停止使用,与供应商联系进行退、换货处理

B. 立即停止使用,并报告医院管理部门进行退、换货处理

C. 可继续使用,但应注意密切观察有无不良反应发生

D. 立即停止使用,并及时报告当地药品监督管理部门,不得自行作退、换货处理 立即停止使用,并及时报告医院管理部门,就地销毁不合格产品

【答案】：D

8、手术区皮肤消毒的正确方法是【单选题】——

A. 消毒范围超过手术切口 15cm

B. 会阴部用碘酊消毒

C.

消毒范围与备皮范围一致

D. 用 2.5~3%的碘酊消毒 3 遍 用 95%乙醇脱碘

【答案】： A

9、接触传染病患者后隔离衣应放在【单选题】——

A. 治疗区,清洁面向外

B. 走廊,清洁面向外

C. 走廊,清洁面向内

D. 办公室,清洁面向外 病室,清洁面向外

【答案】： B

10、输液反应中属于医院内感染的是【单选题】——

A. 由液体或输液通路中的毒素引起的发热

B. 由于液体被细菌污染引起的发热

C. 由于输注液体中的药物引起的发热

D. 由于输液管中的内毒素引起的发热 由于输注的液体中含有热源物质引起的发热

【答案】： B

11、下列消毒剂中哪一种为高效消毒剂【单选题】——

A. 聚维铜碘

B. 碘酊

C. 乙醇

D. 含氯消毒剂 酚类消毒剂

【答案】： D

12、取无菌纱布的正确方法是【单选题】——

A. 戴手套拿取纱布

B. 以上都不是

C. 用灭菌换药镊子夹取纱布

D. 用无菌持物钳夹取纱布 用消毒的手指拿取纱布

【答案】： D

13、传染性非典型肺炎的最主要传播途径是【单选题】——

- A. 经消化道传播
- B. 接触传播
- C. 经呼吸道飞沫传播
- D. 虫媒传播 经粪一口途径传播

【答案】： C

14、根据我国下列卫生标准回答:接触皮肤的医疗用品的卫生标准是【单选题】——

- A. 必须无菌
- B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{cfu/g}$  或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$ ,致病性微生物不得检出
- C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$  或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$ ,致病性微生物不得检出
- D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$ ,致病性微生物不得检出 细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$ ,致病性微生物不得检出

【答案】： C

15、根据我国卫生标准回答以下问题:接触皮肤的医疗用品【单选题】——

- A. 必须无菌
- B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{cfu/g}$  或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$ ,致病性微生物不得检出
- C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$  或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$ ,致病性微生物不得检出
- D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$ ,致病性微生物不得检出 细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$ ,致病性微生物不得检出

【答案】： C

16、避污纸的正确使用方法为【单选题】——

- A. 污染的手取避污纸可掀页撕取
- B.

从页面抓取

- C. 随便撕取
- D. 掀开页面抓取第一页 清洁手取避污纸需他人传递

【答案】：B

17、医院工作中洗手指征不正确的是【单选题】——

- A. 在进入和离开病房前洗手
- B. 处理干净的物品前,处理污染的物品后洗手
- C. 在高危病房中接触同一患者的不同部位前、后不必洗手
- D. 与任何患者长时间和密切接触后洗手 护理特殊易感患者前、后及在接触伤口前、后洗手

【答案】：C

18、普通病房【单选题】——

- A. 空气 $\leq 10\text{cfu}/\text{m}^3$ ,物体表面 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^3$ ,医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$
- B. 空气 $\leq 200\text{cfu}/\text{m}^3$ ,物体表面 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^3$ ,医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$
- C. 空气 $\leq 500\text{cfu}/\text{m}^3$ ,物体表面 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^3$ ,医护人员手 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$
- D. -,物体表面 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^3$ ,医护人员手 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$  空气 $\leq 1000\text{cfu}/\text{m}^3$ ,物体表面 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^3$ ,医护人员手 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^2$ ?下列各医疗区的细菌学指标是

【答案】：C

19、下列有关医院感染的管理人员培训要求描述错误的是【单选题】——

- A. 300 张床位以上的医院设医院感染管理科
- B. 1000 张床位以上的大型医院,医院感染管理专职人员的配备不得少于 10 人
- C. 300 张床位以下的医院,医院感染管理专职人员的配备不少于 1 人
- D. 300 张床位以下的医院应配备医院感染管理专职人员

300-500 张床位的医院,医院感染管理专职人员的配备不得少于 2 人

**【答案】**： B

20、压力蒸汽灭菌时器械包的重量【单选题】——

- A. 8kg
- B. 7kg
- C. 5kg
- D. 6kg 10kg

【答案】：B

21、血液-体液隔离应用的标志是【单选题】——

- A. 红色标志
- B. 棕色标志
- C. 黄色标志
- D. 绿色标志 灰色标志

【答案】：A

22、关于刷手的注意事项,其中正确的是【单选题】——

- A. 手刷 48 小时高压消毒 1 次
- B. 刷手的时间为 4 分钟
- C. 手刷放在洗手盆中
- D. 肥皂液每日更换 1 次 刷洗的范围限于被污染的部位

【答案】：D

23、医院感染的传播途径一般不包括【单选题】——

- A. 经土壤传播
- B. 经共同媒介物传播
- C. 经空气传播
- D. 经生物媒介传播 经接触传播

【答案】：A

24、血液净化室的医院感染管理下列哪项不正确【单选题】——

- A. 应对病人常规进行血液净化前肝功能、肝炎病原体等检查
- B. 工作人员定期体检,加强个人防护
- C. 透析器、管道应专人专用
- D. 传染病病人在隔离血液净化间内进行,专机透析

急诊病人不需固定透析机

【答案】：E

25、根据我国下列卫生标准回答:对医院发生的医院内感染流行、暴发流行进行调查分析,提出控制措施,并组织实施的是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：D

26、细菌耐药最常见的机制是【单选题】——

- A. 细菌改变代谢途径
- B. 产生抗生素灭活酶
- C. 抗菌药物作用靶位改变
- D. 细菌细胞膜渗透性改变使抗菌药物不易进入细菌细胞 细菌细胞将抗菌药物排除细菌

【答案】：B

27、《医务人员艾滋病病毒职业暴露防护工作指导原则(试行)》是卫生部于哪年制定的【单选题】——

- A. 2002 年
- B. 2003 年
- C. 2004 年
- D. 2005 年 2001 年

【答案】：C

28、三级综合医院的医院感染管理机构每月发布发生率最高的医院感染性疾病是【单选题】——

- A. 泌尿道感染
- B. 表皮传染病
- C.

呼吸道传染病

D. 外伤感染 肠道传染病

【答案】：C

29、为预防医院感染的发生新生儿病房每张床位占地面积不应少于【单选题】——

A. 5m<sup>2</sup>

B. 4m<sup>2</sup>

C. 3m<sup>2</sup>

D. 2m<sup>2</sup> 1m<sup>2</sup>

【答案】：C

30、免疫功能低下病人的医院感染预防,下列哪项错误【单选题】——

A. 保护皮肤粘膜的完整性

B. 广谱抗生素肠道预防感染

C. 保护性隔离

D. 治疗局部感染病灶 疫苗注射

【答案】：B

31、在我国医院内感染中,病人最常发生感染的部位是【单选题】——

A. 泌尿道

B. 外科切口

C. 血液

D. 呼吸道 胃肠道

【答案】：D

32、合胞体病毒感染宜采取【单选题】——

A. 消化道隔离

B. 呼吸道隔离

C. 两者均是

D. 两者均不是

【答案】：B

33、关于医院感染知识培训错误的是【单选题】——

- A. 培训内容包括管理知识和专业知识
- B. 非专职人员每年不少于2小时培训
- C. 培训对象包括管理、医务、工勤人员
- D. 实习医师必须培训 进修医师必须培训

【答案】：B

34、下述各项中错误的是【单选题】——

- A. 小儿呼吸道感染不需要隔离
- B. 医院污物应分类收集、分别处理,以防止污染扩散
- C. 大面积烧伤或多重耐药菌感染应进行接触隔离
- D. 洗手是预防医院感染的重要措施 传染病区应严格划分清洁区、半污染区、污染区

【答案】：A

35、灭菌速度快、灭菌效果好、对经济、环境污染小的是【单选题】——

- A. 环氧乙烷灭菌法
- B. 戊二醛浸泡灭菌法
- C. 辐射灭菌法
- D. 过氧乙酸浸泡灭菌法 压力蒸气灭菌法

【答案】：E

36、下列哪项是正确的【单选题】——

- A. 无菌器械保存液应该是无菌的,最多允许检出少量微球菌
- B. 使用中消毒剂细菌总数应 $\leq 200$ cfu/mL,不得检出致病性微生物
- C. 无菌器械保存液细菌总数应 $\leq 5$ cfu/mL,不得检出致病性微生物
- D. 使用中消毒剂细菌总数应 $\leq 10$ cfu/mL,允许检出金黄色葡萄球菌 使用中消毒剂细菌总数应 $\leq 100$ cfu/mL,不得检出致病性微生物

【答案】：E

37、传染病房每间病室的病人不应超过【单选题】——

- A.

6 人

B. 5 人

C. 4 人

D. 3 人 2 人

【答案】：C

38、SARS 传播最重要的途径是【单选题】——

A. 接触传播

B. 飞沫传播

C. 气溶胶传播

D. 血液-体液传播 空气传播

【答案】：B

39、以 15%过氧乙酸原液配制 0.3%过氧乙酸 100mL,下列方法中正确的是【单选题】——

A. 原液稀释 200 倍

B. 原液 30mL 加水 70mL

C. 原液 20mL 加水 80mL

D. 原液 15mL 加水 85mL 原液 2mL 加水 98mL

【答案】：E

40、有关医院感染预防与控制的概念,错误的是:【单选题】——

A. 外源性感染是可以预防的

B. 洗手是预防医院感染的重要措施

C. 做好消毒隔离就可杜绝医院感染的发生

D. 内源性医院感染是难以预防的 滥用抗菌药物可致二重感染

【答案】：C

41、根据我国下列卫生标准回答:进行医院内感染管理的策略研究,为国家提供咨询意见的是【单选题】——

A. 国家医院感染管理咨询专家委员会

B. 省医院感染管理专家咨询委员会

C.

各级医院的医院感染管理委员会

D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：A

42、根据我国卫生标准回答以下问题：接触黏膜的医疗用品【单选题】

——

A. 必须无菌

B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{cfu/g}$ 或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$ ，致病性微生物不得检出

C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$ 或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$ ，致病性微生物不得检出

D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$ ，致病性微生物不得检出 细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$ ，致病性微生物不得检出

【答案】：B

43、护理人员为术前清洁洗肠准备所需肛管，采取煮沸消毒法，以下那项不正确【单选题】——

A. 肛管腔内注水，用纱布包好

B. 在沸水中持续煮沸 10min 以上

C. 冷水时即放入计时

D. 水沸后开始计时 先将肛管洗刷干净

【答案】：C

44、儿科病房【单选题】——

A.  $\leq 10 \leq 5 \leq 5$

B.  $\leq 200 \leq 5 \leq 5$

C.  $\leq 500 \leq 10 \leq 10$

D.  $=- \leq 15 \leq 15$

【答案】：C

45、属于高度危险性物品的是【单选题】——

A. 手术器械和用品

B. 体温表

C.

呼吸机管道

D. 胃肠道内窥镜和气管镜 麻醉机管道

【答案】：A

46、妊娠妇女不宜用的抗菌药物是【单选题】——

A. 青霉素

B. 磷霉素

C. 林可霉素

D. 四环素 头孢菌素

【答案】：D

47、HICPAC 隔离预防指南第一部分最重要,主要是指对所有患者均实施

【单选题】——

A. 基础预防

B. 标准预防

C. 接触隔离

D. 空气隔离 飞沫隔离

【答案】：B

48、须现配现用的消毒剂是【单选题】——

A. 过氧乙酸

B. 乙醇

C. 苯扎溴铵

D. 纯乳酸 甲醛

【答案】：A

49、属于低效消毒剂的是【单选题】——

A. 醋酸氯己定

B. 新洁尔灭

C. 两者均是

D. 两者均否

【答案】：C

50、新紫外线灯管输出功率不低于【单选题】——

- A. 60uw/cm<sup>2</sup>
- B. 100uw/cm<sup>2</sup>
- C. 80uw/cm<sup>2</sup>
- D. 90uw/cm<sup>2</sup> 110uw/cm<sup>2</sup>

【答案】：D

51、下列各项中错误的是【单选题】——

- A. 医护人员在采血、输血前后要洗手
- B. 每批一次性注射器均应注明出厂日期、灭菌日期和有效期
- C. 使用过的一次性注射器、输血器材应消毒毁灭或焚烧
- D. 实验工作人员不能用口吸管,处理污物时要戴手套 艾滋病的潜伏期内无传染性

【答案】：E

52、ICU 的医院感染管理措施错误的是【单选题】——

- A. 探视者进入 ICU 应更衣、换鞋
- B. 工作人员进入 ICU 要穿专用工作服、换鞋、戴帽子、口罩、洗手
- C. ICU 应布局合理,分治疗室(区)和监护区
- D. 病人的安置应感染病人与非感染病人分开,特殊感染病人单独安置 监护区每床使用面积不少于 9.5m<sup>2</sup>

【答案】：A

53、医院内感染常规监测中下列哪项是错误的【单选题】——

- A. 医院内感染高危科室高危人群监测
- B. 漏报率监测
- C. 医院内感染高危因素监测
- D. 医院内感染暴发流行监测 传染病报告卡监测

【答案】：E

54、普通病房物体表面细菌菌落总数卫生标准应【单选题】——

- A.  $\leq 500$ cfu/cm<sup>2</sup>
- B.

$\leq 200\text{cfu}/\text{cm}^2$

C.  $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$

D.  $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$   $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$

【答案】：D

55、婴儿室【单选题】——

A.  $\leq 10 \leq 5 \leq 5$

B.  $\leq 200 \leq 5 \leq 5$

C.  $\leq 500 \leq 10 \leq 10$

D.  $=- \leq 15 \leq 15$

【答案】：B

56、医源性感染【单选题】——

A. 病原体来源于病人本身的感染

B. 在诊疗过程中,由于器械消毒不严或制剂不纯引起的感染

C. 病人与医生及其他病人通过直接或间接传播引起的感染

D. 病人入院时已处于另一种传染病的潜伏期,入院后发病,并传给其他病人  
病人在家中已发生的感染

【答案】：B

57、根据我国卫生标准回答:进入组织、器官或接触破损皮肤、黏膜的医疗用品【单选题】——

A. 必须无菌

B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{cfu}/\text{g}$ 或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$ ,致病性微生物不得检出

C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu}/\text{g}$ 或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$ ,致病性微生物不得检出

D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu}/\text{mL}$ ,致病性微生物不得检出  
细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu}/\text{mL}$ ,致病性微生物不得检出

【答案】：A

58、外科刷手时间每次【单选题】——

A. 3 分钟以上

B.

1 分钟以上

C. 2 分钟以上

D. 5 分钟以上 4 分钟以上

【答案】：A

59、关于洗手指征错误的是【单选题】——

A. 脱手套后不需洗手

B. 接触血液、体液和被污染的物品前后

C. 接触患者前后

D. 戴口罩和穿脱隔离衣前后 进行无菌技术操作前后

【答案】：A

60、不属于高度危险物品的是【单选题】——

A. 腹腔镜

B. 导尿管

C. 体温表

D. 穿刺针 手术器材

【答案】：C

61、传染病门诊【单选题】——

A.  $\leq 10 \leq 5 \leq 5$

B.  $\leq 200 \leq 5 \leq 5$

C.  $\leq 500 \leq 10 \leq 10$

D.  $=- \leq 15 \leq 15$

【答案】：D

62、关于输血科预防医院内感染的措施，下列哪项是错误的【单选题】

——

A. 保持环境清洁，每天清洁桌面

B. 被血液污染的台面可用苯扎溴铵消毒处理

C. 工作人员上岗前应注射乙型肝炎疫苗，并定期检查抗体水平

D. 血浆置换术应在 II 类环境中进行并注意消毒隔离 每月对储

血冰箱的内壁进行生物学监测,不得检出致病性微生物和真菌

**【答案】** : B

63、医院感染控制措施中血管内装置感染,已证实有效的措施错误的是

【单选题】——

- A. 所有导管均应为密闭系统并限制插管的持续时间
- B. 局部皮肤准备,插管时的无菌技术,疑有感染应立即拔除导管
- C. 中心血管导管插管时外科灭菌
- D. 限制敷料更换的频率,短期使用抗生素包裹的导管,限制插管时间  
抗微生物药膏用于皮肤准备

【答案】: E

64、某霍乱患者在行严密隔离时,其具体措施不包括【单选题】——

- A. 只能在休息日探视
- B. 病人住单人病室,门窗关闭,病人不外出
- C. 接触病人需戴口罩、帽子,穿隔离衣、裤、鞋
- D. 病室每天消毒1次 病人的一切用物应严格消毒处理

【答案】: A

65、输血科的医院感染管理描述正确的是【单选题】——

- A. 血液检验和处置室设在清洁区
- B. 采集患者自体血应在 I 类环境中进行
- C. 储存、发放血液应分室在 I 类环境中进行
- D. 血浆置换术应在 II 类环境中进行 布局合理,分为有清洁区、污染区

【答案】: D

66、根据我国卫生标准回答以下问题:监督、指导医师和医技人员严格执行无菌技术操作规程,合理应用抗感染药,实施对一次性医疗用品的管理等有关医院内感染管理的制度的应是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】: E

67、传染科病房属于【单选题】——

- A. I类地区
- B. II类地区
- C. III类地区
- D. IV类地区 非分类地区

【答案】：D

68、取无菌溶液时,下列哪项是错误的【单选题】——

- A. 倒溶液时可不顾及瓶签的朝向
- B. 用前核对瓶签
- C. 保持瓶盖内侧面无菌
- D. 用后立即盖上 检查药液是否有沉淀

【答案】：A

69、传染病区中划分为清洁区的是【单选题】——

- A. 走廊
- B. 洗漱室
- C. 配餐室
- D. 化验室 浴室

【答案】：C

70、根据我国卫生标准回答:进行医院内感染管理的策略研究,为国家提供咨询意见的应是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：A

71、下列属于医院感染的是【单选题】——

- A. 皮肤粘膜开放性伤口只有细菌定植而无炎症表现
- B. 无明显潜伏期的感染为入院48h后发生者属医院感染
- C.

由于物理化学因素刺激而产生的炎症反应

- D. 患者原有的慢性感染在医院内急性发作 感染病灶自然扩散

【答案】： B

72、下列不属于内源性感染情况的是【单选题】——

- A. 寄居部位的改变  
B. 宿主的局部或全身免疫功能下降  
C. 菌群失调和二重感染  
D. 通过空气或水源的感染 潜在感染活化:如疱疹病毒、结核等

【答案】： D

73、浸泡无菌持物钳的容器应是【单选题】——

- A. 大口容器,盛用消毒液  
B. 大口容器,底部垫纱布  
C. 大口容器,盛用消毒液,底部垫无菌纱布  
D. 盛用消毒液,底部垫无菌纱布 大口容器,盛用消毒液,底部垫纱布

【答案】： A

74、消毒药械管理中下列哪项错误【单选题】——

- A. 根据消毒的目的选用消毒药械  
B. 同一消毒剂消毒不同物品应有同一浓度  
C. 加强消毒效能监测  
D. 防止使用中的消毒剂再污染 注意影响消毒效果的因素

【答案】： B

75、在医院感染暴发流行或流行得到证实后,医院应在多长时间内报告上级卫生行政部门【单选题】——

- A. 48h  
B. 36h  
C.

24h

D. 12h 6h

【答案】：C

76、属于高效消毒剂的是【单选题】——

A. 醋酸氯己定

B. 新洁尔灭

C. 两者均是

D. 两者均否

【答案】：D

77、下列概念中不正确的是【单选题】——

A. 医院感染发病率是指一定时间内住院病人中发生医院感染新发病例的频率

B. 医院感染暴发是指在某医院、某科室的住院病人中,短时间内、突然发生3例以上同源感染病例的现象

C. 医院感染流行是指某医院、某科室医院感染发病率显著超过历年散发发病率水平

D. 医院感染散发是指医院感染在某医院、或某地区住院病人中历年的一般发病率水平 医院感染的流行趋势是指医院、某科室的医院感染持续流行,长时间不能控制

【答案】：E

78、同一病房内住有伤寒与痢疾患者,3周后伤寒患者的大便培养出痢疾杆菌,其属【单选题】——

A. 病人在家中已发生的感染

B. 病人入院时已处于另一种传染病的潜伏期,入院后发病

C. 病原体来源于病人本身的感染

D. 病人之间引起的交叉感染 同时患伤寒和痢疾

【答案】：D

79、预防免疫功能低下患者发生医院感染,不正确的是【单选题】——

A. 保护皮肤黏膜的完整性

B.

保护性隔离

- C. 全身使用广谱抗生素
- D. 治疗局部感染病灶 注射相关疫苗

【答案】：C

80、使用戊二醛达到灭菌的时间是【单选题】——

- A. 6 小时
- B. 2 小时
- C. 10 小时以上
- D. 8 小时以上 4 小时

【答案】：C

81、需要采取血液-体液隔离的疾病是【单选题】——

- A. 肺结核
- B. 艾滋病
- C. 器官移植者
- D. 肺鼠疫 霍乱

【答案】：B

82、无菌治疗巾打开后,未用完其继续使用的有效时间是【单选题】——

- A. 4h
- B. 12h
- C. 6h
- D. 2h 24h

【答案】：E

83、高效消毒剂是【单选题】——

- A. 醋酸氯己定
- B. 新洁尔灭
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】：D

84、医院感染控制措施中泌尿道感染已证实有效的措施是【单选题】

- 
- A. 全身预防性抗生素的使用
  - B. 膀胱冲洗或灭菌生理盐水或抗生素冲洗
  - C. 限制插管时间,插入时的无菌技术,保持密闭引流
  - D. 引流袋内加入抗菌剂,抗微生物药物包裹的导尿管 每天灭菌剂清洁会阴

【答案】：C

85、组织实施国家有关政策法规【单选题】

- 
- A. 卫生部医政司医院感染管理委员会
  - B. 省市卫生行政部门医院感染管理委员会
  - C. 医院的医院感染管理委员会
  - D. 医院感染管理科 临床科室以下各项工作是哪个部门的职责

【答案】：B

86、医院感染最常发生的疾病是【单选题】

- 
- A. 肠道传染病
  - B. 泌尿道感染
  - C. 外伤感染
  - D. 表皮传染病 呼吸道传染病

【答案】：E

87、巴氏消毒常用消毒指标是【单选题】

- 
- A. 消毒温度为 65~75℃,作用时间 10~15min
  - B. 消毒温度为 70~80℃,作用时间 5~8min
  - C. 消毒温度为 45~55℃,作用时间 20~25min
  - D. 消毒温度为 85~95℃,作用时间 10~15min 消毒温度为 62℃,作用时间 30min

【答案】：E

88、医院感染的含义是【单选题】——

- A. 所有发生在医院内的细菌感染
- B. 因医疗器械消毒不严造成的感染
- C. 病人在住院期间发生的感染
- D. 病人在住院期间或医院职工在护理或治疗患者过程中发生的感染  
医院内病人直接或间接传播引起的感染

【答案】：D

89、属于低水平消毒剂的是【单选题】——

- A. 戊二醛
- B. 过氧乙酸
- C. 碘伏
- D. 氯己定 异丙醇

【答案】：D

90、下列关于禽流感的描述不对的是【单选题】——

- A. 是禽流行性感冒的简称
- B. 由A型禽流感病毒引起的一种禽类传染病
- C. 由H5N1血清型引起的禽流感称高致病性禽流感
- D. 属甲类传染病之一 人感染高致病性禽流感可以在人与人之间传播

【答案】：D

91、和破损皮肤、黏膜相接触,而不进入无菌的组织内的器材适用于下列哪种方式消毒【单选题】——

- A. 灭菌剂或物理、化学灭菌方法
- B. 杀灭细菌繁殖体的消毒剂
- C. 应用灭菌剂或高效消毒剂
- D. 杀灭结核杆菌的消毒剂或中、低效消毒剂 应用物理灭菌方法

【答案】：C

92、SARS 最主要的传染源是【单选题】——

- A. SARS 患者
- B. SARS 病毒携带者
- C. SARS 感染的动物
- D. 携带 SARS 的动物 污染的环境

【答案】：A

93、医疗区域属于半污染区的是【单选题】——

- A. 患者洗涤间
- B. 病区化验室
- C. 病室及厕所
- D. 治疗室 病区营养配餐室

【答案】：B

94、传染病房两病床之间的距离应【单选题】——

- A.  $\geq 2.0\text{m}$
- B.  $\geq 1.5\text{m}$
- C.  $\geq 1.2\text{m}$
- D.  $\geq 1.1\text{m}$   $\geq 1.0\text{m}$

【答案】：D

95、对门诊胃镜室使用过的纤维胃镜进行消毒,应该选择的消毒溶液是

【单选题】——

- A. 1%氯胺溶液
- B. 5%碘伏
- C. 0.1%苯扎溴铵溶液
- D. 2%碱性戊二醛溶液 0.2%过氧乙酸溶液

【答案】：D

96、煮沸消毒灭菌时,错误的操作是【单选题】——

- A. 大小相同的盆应重叠
- B. 玻璃类用纱布包好
- C.

物品完全浸没在水中

D. 煮沸过程中再加物品,应在第二次水沸后重新计时 有轴节的器械宜打开

【答案】: A

97、高效消毒剂【单选题】——

A. 0.5%碘伏

B. 2%戊二醛

C. 两者均是

D. 两者均否

【答案】: B

98、输血科预防医院感染的措施错误的是【单选题】——

A. 保持环境清洁,每日清洁桌面

B. 被血液污染的台面可用苯扎溴铵消毒处理

C. 血浆置换术应在II类环境中进行并注意消毒隔离

D. 工作人员上岗前应注射乙型肝炎疫苗,并定期检查抗体水平  
每月对储血冰箱的内壁进行生物学监测,不得检出致病性微生物和真菌

【答案】: B

99、以下概念正确的是【单选题】——

A. 地面应湿式清扫,保持清洁,局部有血迹等污染时局部用消毒剂处理

B. 地面应经常用含氯消毒剂拖洗,既能消毒,又能增白

C. 检验科的地面每天均需用消毒剂拖洗

D. 拖洗工具使用后先洗净,再消毒,然后晾干 因为2%戊二醛是高水平消毒剂,有条件时最好用戊二醛拖地,消毒效果好

【答案】: A

100、对患者或怀疑患者传染病的产妇用过的一次性用品及胎盘必须【单选题】——

A. 放入黄色塑料袋内,密闭运送,无害化处理

B. 放入红色塑料袋内,密封后丢弃

C.

放入黑色塑料袋内,按垃圾处理

- D. 放入黑色塑料袋内,密闭运送,无害化处理 放入白色塑料袋内,标记处理

【答案】：A

101、根据我国卫生标准回答:对医院发生的医院内感染流行、暴发流行进行调查分析,提出控制措施,并组织实施的应是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会  
B. 省医院感染管理专家咨询委员会  
C. 各级医院的医院感染管理委员会  
D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：D

102、怀疑医院感染病例取标本进行病原体检查时不正确的是【单选题】——

- A. 采集标本后及时送检  
B. 收到标本后及时检查  
C. 尽可能做到涂片检查与病原体培养相结合  
D. 为节约经费,在抗感染治疗效果不佳时取标本做病原体检查  
在使用抗菌药物前送标本

【答案】：D

103、小儿流感嗜血杆菌感染首选的药物是【单选题】——

- A. 青霉素  
B. 氨苄西林  
C. 磺胺嘧啶  
D. 头孢唑啉 林可霉素

【答案】：B

104、下列情况属于医院感染【单选题】——

- A. 住院中由于治疗措施而激活的感染  
B. 在皮肤、粘膜开放性伤口只有细菌定植而无临床症状或体征者  
C.

婴儿经胎盘获得的感染,如 CMV,弓形虫发生在出生后 48 小时以内者

D. 由于输注苏打外渗引起的局部炎症 由损伤而产生的炎症  
或由非生物因子刺激产生的炎症

【答案】： A

105、自身感染【单选题】——

- A. 病人入院时已处于另一种传染病的潜伏期,入院后发病,并传给其他病人
- B. 病原体来源于病人本身的感染
- C. 在诊疗过程中,由于器械消毒不严或制剂不纯引起的感染
- D. 病人与医生及其他病人通过直接或间接传播引起的感染 病人在家中已发生的感染

【答案】： B

106、关于医院感染的概念错误的是:【单选题】——

- A. 入院时处于潜伏期的感染不是医院感染
- B. 医院感染是指在医院内获得的感染
- C. 慢性感染急性发作是医院感染
- D. 与上次住院有关的感染是医院感染 婴幼儿经胎盘获得的感染不是医院感染

【答案】： C

107、治疗室的管理中,下列哪项是错误的【单选题】——

- A. 注射治疗时要铺无菌盘,抽出的药液存放不能超过 2 小时
- B. 治疗室中开启的各种溶酶超过 24 个小时不能使用,最好采用小包装
- C. 治疗室中开启的无菌溶液需在 2 小时内使用
- D. 碘酊、乙醇瓶应保持密闭,每周更换并对容器灭菌 1~2 次 经灭菌后的棉球、纱布包一经打开,使用时间不能超过 48 小时

【答案】： E

108、根据我国下列卫生标准回答:监督、指导医务人员严格执行无菌技术操作规程,合理应用抗感染药,实施对一次性医疗用品的管理等有关医院内感染管理的制度的是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】: E

109、关于中东呼吸综合征流行病学描述正确的是【单选题】——

- A. 完全具备持续的人传人的能力
- B. 狨猴为自然储存宿主
- C. 以接触传播为主,其次是呼吸道传播
- D. 单峰骆驼可能是人类感染来源 非密切接触即可引起人际间传播

【答案】: D

110、低效消毒剂是【单选题】——

- A. 醋酸氯己定
- B. 新洁尔灭
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】: C

111、需要采取肠道隔离的疾病是【单选题】——

- A. 肺结核
- B. 艾滋病
- C. 器官移植者
- D. 肺鼠疫 霍乱

【答案】: E

112、为阳离子表面活性剂,对阴离子表面活性剂有拮抗作用的是【单选题】——

- A. 乙醇
- B. 甲醛
- C.

苯扎溴铵

D. 过氧乙酸 纯乳酸

【答案】：C

113、医务人员发生艾滋病职业暴露后预防性用药最迟不得超过【单选题】——

A. 72h

B. 48h

C. 24h

D. 12h 4h

【答案】：D

114、临床科室医院感染管理小组的职责下列哪项错误【单选题】——

A. 制定本科室医院感染管理规章制度

B. 监督检查本科室有关医院感染管理的各项工作,对医院感染可疑病例,可能存在感染的环节进行监测,并采取有效防治措施

C. 对医院感染散发病例按要求登记报告,并立即向当地卫生行政机构报告

D. 按要求对疑似或确诊病例留取临床标本,进行细菌学检查和药敏试验 监督检查本科室抗生素使用情况

【答案】：C

115、传染病区所采取的隔离措施,下列不正确【单选题】——

A. 同住一室的不同的呼吸道传染病患者只要做好床边隔离

B. 给同一种病种患者测血压时可不换血压计

C. 斑疹伤寒患者须更衣后才可入病房

D. 护理消化道隔离病人时,须按病种分别穿隔离衣 严密隔离患者禁止走出病房

【答案】：A

116、关于压力蒸汽灭菌效果监测要求正确的是【单选题】——

A. 工艺监测每天进行

B. 化学监测每包进行

C.

生物监测每周进行

D. B-D 试验每天灭菌后进行 B-D 试验每锅进行

【答案】： B

117、灭菌速度快、灭菌效果好、经济、环境污染小的是【单选题】——

- A. 过氧乙酸浸泡灭菌法
- B. 辐射灭菌法
- C. 戊二醛浸泡灭菌法
- D. 环氧乙烷灭菌法 压力蒸汽灭菌法

【答案】： E

118、关于使用中的灭菌剂的监测正确的是【单选题】——

- A. 生物监测每周一次
- B. 生物监测每天一次
- C. 生物监测不得检出致病微生物
- D. 化学监测每月一次 灭菌后的物品不得检出任何微生物

【答案】： E

119、普通手术室医护人员手表面细菌菌落总数卫生标准应【单选题】——

- A.  $\leq 5\text{cfu/cm}^2$
- B.  $\leq 10\text{cfu/cm}^2$
- C.  $\leq 15\text{cfu/cm}^2$
- D.  $\leq 200\text{cfu/cm}^2$   $\leq 500\text{cfu/cm}^2$

【答案】： A

120、关于洗手指征,下述哪项是错误的【单选题】——

- A. 接触病人前后
- B. 进行无菌技术操作前后
- C. 戴口罩和穿、脱隔离衣前后
- D. 接触血液、体液和被污染的物品前后 脱手套后无须洗手

【答案】： E

121、免疫功能低下病人的医院内感染预防,下列哪项错误【单选题】

- 
- A. 保护皮肤黏膜的完整性
  - B. 广谱抗生素肠道预防感染
  - C. 保护性隔离
  - D. 治疗局部感染病灶 疫苗注射

【答案】： B

122、一级医院【单选题】 ——

- A. 医院感染发生率 $\leq 8\%$
- B. 切口感染率 $\leq 0.5\%$
- C. 两者均是
- D. 两者均不是

【答案】： D

123、关于医院内感染的概念,错误的是【单选题】 ——

- A. 医院内感染是指在医院内获得的感染
- B. 与上次住院有关的感染是医院内感染
- C. 出院之后发生的感染可能不是医院内感染
- D. 入院时处于潜伏期的感染一定不是医院内感染 婴幼儿经胎盘获得的感染是医院内感染

【答案】： E

124、传染病区使用的拖把【单选题】 ——

- A. 每次使用后清水冲洗,悬挂晾干备用
- B. 先用 1000mg/L 有效氯消毒剂适量倒在污染地面 30min 后,用拖把拖干净
- C. 应先消毒,用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min,再用水洗干净,然后用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min,悬挂晾干备用
- D. 拖把应有明显的标记,严格分区使用 拖把用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min 后,再洗干净,晾干备用

【答案】： C

125、对医院新建设施提出卫生学标准的审定意见【单选题】——

- A. 卫生部医政司医院感染管理委员会
- B. 省市卫生行政部门医院感染管理委员会
- C. 医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室以下各项工作是哪个部门的职责

【答案】：C

126、消毒的含义是【单选题】——

- A. 杀灭物品上的所有微生物
- B. 杀灭物品上的芽孢
- C. 消灭包括细菌芽孢在内的各种病原微生物
- D. 消除物品上的一切污秽 消灭除细菌芽孢外的各种病原微生物

【答案】：E

127、穿脱隔离衣时要避免污染【单选题】——

- A. 袖子后面
- B. 胸前、背后
- C. 腰带以下部分
- D. 衣领 腰带以上部分

【答案】：D

128、关于医院感染的概念错误的是【单选题】——

- A. 医院感染是指在医院内获得的感染
- B. 与上次住院有关的感染是医院感染
- C. 入院时处于潜伏期的感染一定不是医院感染
- D. 出院之后发生的感染可能不是医院感染 婴幼儿经胎盘获得的感染是医院感染

【答案】：E

129、紫外线消毒的有效距离是【单选题】——

- A.

10m

B. 2m

C. 1m

D. 5m 15m

【答案】： B

130、医院必须对消毒、灭菌效果定期进行监测,灭菌合格率必须达到

【单选题】——

A. 0.8

B. 1

C. 0.85

D. 0.95 0.9

【答案】： B

131、关于使用中的消毒剂、灭菌剂的监测,下列哪项是错误的【单选题】——

【单选题】——

A. 应进行生物和化学监测

B. 生物监测:消毒剂每季度1次,其细菌含量必须 $<100\text{cfu/mL}$ ,不得检出致病性微生物

C. 灭菌剂每月生物监测1次,不得检出任何微生物

D. 含氯消毒剂、过氧乙酸等的浓度应每天监测 对戊二醛浓度的监测应每月不少于1次

【答案】： E

132、下列内镜需灭菌但除外【单选题】——

A. 脑室镜

B. 胸腔镜

C. 腹腔镜

D. 关节镜 支气管纤维镜

【答案】： E

133、输液反应中属于医院感染的是【单选题】——

A. 由液体或输液通路中的毒素引起的发热

B.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/906221141232010130>