

第一章单元测试

1、[选择题]: 糜烂与溃疡的主要区别是()

选项:

- A:形状不同
- B:大小不同
- C:基底颜色不同
- D:深浅不同

参考正确答案:【**深浅不同**】

2、[选择题]: _ _ 为干燥或油腻的角质细胞的层状堆积, 由表皮细胞形成过快或正常角化过程受干扰所致。

选项:

- A:溃疡
- B:痂
- C:鳞屑
- D:抓痕

参考正确答案:【**鳞屑**】

3、[选择题]: 下列皮损属于原发性损害者有

选项:

- A:痂
- B:糜烂
- C:丘疹
- D:结节

参考正确答案:【**丘疹;**
结节】

4、[选择题]: 斑疹根据发病机制不同, 可分为以下几种

选项:

- A:红斑
- B:出血斑
- C:色素沉着斑
- D:色素减退(脱失)斑

参考正确答案:【**红斑;**
出血斑;
色素沉着斑;
色素减退(脱失)斑】

5、[选择题]: 苔癣样变主要见于急性湿疹。

选项:

- A:对
- B:错

参考正确答案:【**错**】

6、[选择题]: 斑贴试验(patchtest)用于测定哪类变态反应。()

选项:

- A:I型
- B:IV型
- C:II型
- D:III型

参考正确答案:【**IV型**】

7、[选择题]: 玻片压诊法按压寻常狼疮皮损可出现的颜色。 ()

选项:

- A:沙拉酱
- B:苹果酱
- C:草莓酱
- D:番茄酱

参考正确答案:【**苹果酱**】

8、[选择题]: 皮肤病的诊断主要包括 ()

选项:

- A:体格检查
- B:心理咨询
- C:辅助检查
- D:病史

参考正确答案:【**体格检查;**
辅助检查;
病史】

9、[选择题]: 尼氏征可有哪些阳性表现 ()

选项:

- A:牵扯已破损的水疱壁时, 可见水疱以外的外观正常皮肤一同剥离。
- B:稍用力在外观正常皮肤上推擦, 表皮即剥离;
- C:手指轻压疱顶, 疱液可向四周移动;
- D:手指推压水疱一侧, 可使水疱沿推压方向移动;

参考正确答案:【**牵扯已破损的水疱壁时, 可见水疱以外的外观正常皮肤一同剥离。;**
稍用力在外观正常皮肤上推擦, 表皮即剥离。;
手指轻压疱顶, 疱液可向四周移动。;
手指推压水疱一侧, 可使水疱沿推压方向移动。;】

10、[选择题]: 真菌镜检阳性可明确真菌是否存在, 结合临床表现可确诊皮肤真菌病, 但一般不能确定致病菌种类, 而且阴性不能完全排除真菌病诊断。

选项:

- A:对
- B:错

参考正确答案:【**对**】

第二章单元测试

1、[选择题]: 治疗单纯疱疹首选药物:

选项:

- A:氯雷他定
- B:伊曲康唑
- C:阿昔洛韦
- D:青霉素

参考正确答案:【**阿昔洛韦**】

2、[选择题]: 诊断单纯疱疹感染的金标准: ()

选项:

- A:病毒培养鉴定
- B:血清抗体检测
- C:HSV-DNA检测
- D:刮片细胞学检查

参考正确答案:【**病毒培养鉴定**】

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/908104016007006045>