

肿瘤二病区八月肿瘤专科护士试题

基本信息：[矩阵文本题] *

姓名：	_____
-----	-------

1. 鼻咽癌确诊依据（） [单选题] *

- A、鼻咽后鼻镜检查 and 纤维内镜检查
- B、血清免疫学检查(EB 病毒血清学检测)
- C、活组织病理检查(正确答案)
- D、影像学检查(CT、MRI)

2. 放疗所致 II 级皮肤反应是指（） [单选题] *

- A、皮肤无变化
- B、滤泡样暗色红斑或脱发，干性脱皮，出汗减少
- C、触痛性或鲜色红斑，片状湿性脱皮或中度水肿(正确答案)
- D、皮肤皱褶以外部位的融合的湿性脱皮，凹陷性水肿

3. 鼻咽癌大多为（） [单选题] *

- A、低分化鳞癌(正确答案)

- B、腺癌
- C、泡状核细胞癌
- D、黏液表皮样癌

4. 鼻咽癌的首发症状是 () [单选题] *

- A、痰式涕血(正确答案)
- B、耳鸣、听力减退
- C、复视
- D、鼻塞

5. 患者接受放疗三周后放射野皮肤出现充血泡形成。发生糜烂有渗出液,此为几度急性皮肤反应 () [单选题] *

- A、I度
- B、II度(正确答案)
- C、III度
- D、IV度

6. 鼻咽癌患者放疗后()年内禁止拔牙 () [单选题] *

- A、半年
- B、1年
- C、2年

D、3年(正确答案)

7. 鼻咽癌好发于哪个壁或部位 () [单选题] *

A、顶壁

B、后壁

C、隐窝(正确答案)

D、前壁

E、舌根

8. 鼻咽癌放疗的健康教育哪项不正确 () [单选题] *

A、保持鼻腔的湿润清洁

B、如有鼻痂及时剥除(正确答案)

C、经常做张口运动

D、多饮水

9. 鼻咽癌患者在行放射治疗2小时后出现了面颊部肿胀。疼痛,张口受限,请问他发生了何种放疗后反应 () [单选题] *

A、口腔急性反应

B、放射野皮肤反应

C、鼻腔粘膜反应

D、腮腺急性反应(正确答案)

10. 鼻咽癌的患者预防张口困难可进行哪项功能锻炼 () [单选题] *

- A、颈部运动
- B、转头运动
- C、张口训练(正确答案)
- D、点头运动

11. 鼻咽癌患者根治性放疗后拔牙，可能出现： () [单选题] *

- A、面部蜂窝织炎
- B、颌骨骨髓炎(正确答案)
- C、面部软组织纤维化
- D、颅神经损伤

12. 放疗后出血超过多少为大出血 () [单选题] *

- A、300 ml
- B、500 ml(正确答案)
- C、800 ml
- D、1000ml
- E、1500ml

13. 患者放疗期间，要鼓励其多饮水，每日大于 () [单选题] *

- A、2500ml

B、2000ml

C、1000ml

D、3000ml(正确答案)

14. 患者接受放疗三周后放射野皮肤出现充血泡形成。发生糜烂,有渗出液,此为几度急性皮肤反应 () [单选题] *

A、I度

B、II度(正确答案)

C、III度

D、IV度

15. 对放射治疗正确的说法是: () [单选题] *

A、优于手术治疗

B、仅仅是治疗恶性肿瘤

C、单独放射治疗适应症很广泛

D、可治疗部分恶性肿瘤和良性肿瘤(正确答案)

16. 放疗病人饮食注意事项错误的是 () [单选题] *

A、多饮水多食蔬菜水果

B、高蛋白高维生素(正确答案)

C、可食辛辣刺激食物以促进食欲

D、饮食清淡

17. 下列肿瘤不是首选手术而是首选放疗的是 () [单选题] *

A.鼻咽癌(正确答案)

B.乳腺癌

C.直肠癌

D.宫颈癌

18. 对口腔粘膜反应描述错误的是 () [单选题] *

A、症状有充血、白斑、浅表溃疡、伪膜形成等。

B、发生时间：放疗2~3周时最重。4~5周后可自行缓解。

C、原因为真皮细胞的修复和再增殖。(正确答案)

D、处理：对症处理，必要时暂停放疗

19. 处理放射治疗鼻出血时，下列哪项是错误的 () [单选题] *

A、病人取坐位或卧位，为稳定情绪可用镇静药

B、出血不多可用麻黄碱滴鼻或填入棉花块，出血较多者可做鼻腔、后鼻孔填塞

C、难以控制的鼻出血可做颈外动脉结扎

D、因放射治疗引起的鼻出血不必做合血准备，输液即可(正确答案)

20. 在处理化疗后()h内病人的排泄物时，护理人员必须戴口罩、手套，穿防护衣，以免药物沾染皮肤及衣物。 () [单选题] *

A、24h

B、48h(正确答案)

C、36h

D、72h

21. 患者因化疗而出现的恶心、呕吐、食欲不振及毛发脱落、血管损伤等痛苦,致其丧失与疾病斗争的信心而拒绝用药,对治疗极为不利此表现属于 () [单选题] *

A、恐惧心理

B、焦虑情绪

C、抗药心理(正确答案)

D、悲观绝望心理

E、绝望期过后的强烈求生欲望

22. 患者化疗期间为预防泌尿系统毒性,嘱病人多饮水,每日保持多少毫升尿量:
() [单选题] *

A:500 ~ 1000

B:1000 ~ 2000

C:2000 ~ 3000(正确答案)

D:3000 ~ 4000

E:1000 ~ 1500

23. 下列有关于肿瘤化疗的护理叙述不正确的是 () [单选题] *

- A、药物必须新鲜配制
- B、药物不可溢出静脉外
- C、若出现药物外渗，应立即热敷(正确答案)
- D、每周检查白细胞和血小板计数

24. 化疗药物进入人体的途径？（） [单选题] *

- A. 药物污染操作人员双手或食物
- B. 接触、锐器损伤
- C. 药物的气雾和小液滴
- D. 经皮肤吸收、呼吸道吸入、消化道摄入(正确答案)

25. 对于紫杉醇使用描述不当（） [单选题] *

- A、用药前预过敏处理
- B、与顺铂连用，先用紫杉醇，后用顺铂
- C、密切观察生命体征
- D、使用聚氯乙烯材料的输液装置(正确答案)

26. 化疗后恶心、呕吐反应主要由于（）引起 [单选题] *

- A、化疗药物刺激肠胃
- B、化疗后患者的味觉和嗅觉发生异常
- C、化疗后病人食欲减低

D、以上都是(正确答案)

27. 白细胞最低值在化疗后第几天 () [单选题] *

A、7-10(正确答案)

B、2-3

C、5-8

D、4-9

28. 选择静脉穿刺部位, 应避免在几小时内被穿刺过静脉穿刺点的下方重新穿刺。 () [单选题] *

A、12h

B、24h(正确答案)

C、36h

D、48h

29. 外周静脉留置针保留时间为 () [单选题] *

A、72-96小时(正确答案)

B、72-120小时

C、36-72小时

D、96-120小时

30. 化疗药物职业危害途径不包括 () [单选题] *

A、呼吸道

B、血液体液(正确答案)

C、消化道

D、皮肤粘膜

31. PICC 置管后,导管部分脱出,下列处理正确的是 () [单选题] *

A、给予拔管(正确答案)

B、立即把脱出导管送进血管

C、消毒脱出导管后把脱出导管送入

D、看情况而定,如果治时间很长,则裁出导管,如治疗时间短,则先用一段时间后拔出

E、征询病人意见,告知再次送入可能会引发感染,如果病人愿意,经过彻底消毒后把导管送入血管

32. PICC 导管血栓形成与患者相关的因素不包括 () [单选题] *

A、病种

B、年龄

C、药物

D、医务人员(正确答案)

33. 肿瘤病人放疗后出现口腔粘膜充血、糜烂有片状白膜, 可判断 () [单选题] *

A.胃肠道黏膜反应

B.皮肤粘膜反应

C.中度口腔粘膜反应

D.重度口腔粘膜反应(正确答案)

E.食管黏膜反应

34. PICC 冲管的正确步骤为：（） [单选题] *

A、生理盐水先正压冲管，后脉冲冲管

B、生理盐水脉冲冲管+正压冲管交替

C、生理盐水匀速冲洗导管

D、先生理盐水脉冲式冲管，后留 0.5 ~ 1ml 正压封管(正确答案)

35. 使用化疗药物最好在：（） [单选题] *

A、餐前

B、餐后

C、两餐之间(正确答案)

D、以上都可以

36. 重组粒细胞刺激因子最好在化疗后什么时候使用（） [单选题] *

A、12 小时

B、24 小时(正确答案)

C、36 小时

D、48 小时

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/916241141240010043>