

眼科专科题库+参考答案

一、单选题（共 60 题，每题 1 分，共 60 分）

1、化脓性眼内炎的治疗应当首选（ ）

- A、充分散瞳
- B、大剂量抗生素
- C、大剂量皮质类固醇
- D、玻璃体注射
- E、玻璃体切割

正确答案：B

2、儿童最常见的原发性眼恶性肿瘤是（ ）

- A、视网膜母细胞瘤
- B、眼睑鳞状细胞癌
- C、眼睑基底细胞癌
- D、脉络膜恶性黑色素瘤
- E、眼睑恶性黑色素瘤

正确答案：A

3、原发性视网膜脱离患者的手术前护理措施中，错误的是（ ）

- A、戴小孔眼镜
- B、按外眼术前常规准备
- C、充分散瞳
- D、卧床休息
- E、双眼覆盖纱布

正确答案：B

4、以下有关慢性泪囊炎的说法不正确的是（ ）

- A、主要症状是泪溢、流脓
- B、挤压泪囊区有黏液或黏脓性分泌物溢出
- C、与鼻泪管狭窄或阻塞有关
- D、泪囊部皮肤慢性湿疹表现
- E、细菌感染引起

正确答案：A

5、对单疱病毒性睑皮炎治疗错误的有（ ）

- A、结膜囊内用抗病毒眼药水或眼膏
- B、局部和全身应用糖皮质激素
- C、初期可涂龙胆紫溶液或氧化锌糊剂

D、晚期结痂后一般无需其他治疗

E、局部保持清洁，防止继发感染

正确答案：B

6、易于引起急性无菌性化脓性炎症的眼内异物是()

A、碎石异物

B、铝异物

C、铜异物

D、玻璃异物

E、铁异物

正确答案：C

7、视网膜糖代谢的主要方式为()

A、多元醇途径

B、以上都不正确

C、有氧氧化

D、无氧酵解

E、磷酸戊糖途径

正确答案：D

8、滴眼药水技术中，护理人员应嘱患者()

A、向任意方向注视

B、向内眦注视

C、向颞侧注视

D、向上方注视

E、向下方注视

正确答案：D

9、皮质性白内障膨胀期和初发期的临床表现不同之处是()

A、水裂

B、浑浊形态不同

C、板层分离

D、视力急剧下降

E、空泡

正确答案：D

10、下面哪项不是晶状体异位、脱位的并发症？()

A、视网膜脱离

B、屈光不正

- C、继发性青光眼
- D、葡萄膜炎
- E、巩膜炎

正确答案：E

11、眼内容物是指()

- A、角膜、房水、晶状体
- B、虹膜、睫状体、脉络膜
- C、泪液、虹膜、晶状体
- D、虹膜、晶状体、玻璃体
- E、房水、晶状体、玻璃体

正确答案：E

12、以下各项检查中哪一项与原发开角型青光眼的诊断关系不大()

- A、视野检查
- B、超声活体显微镜检查
- C、光相干断层扫描
- D、前房角检查
- E、眼压测量

正确答案：D

13、目前我国致盲的首位原因是()

- A、青光眼
- B、外伤
- C、白内障
- D、沙眼
- E、糖尿病性视网膜病变

正确答案：C

14、结膜下出血常见于()

- A、白喉杆菌性结膜炎
- B、流行性结膜炎
- C、春季结膜炎
- D、细菌性结膜炎
- E、衣原体性结膜炎

正确答案：B

15、流泪主要是由于()

- A、鼻腔粘膜的肿胀

- B、泪小管的阻塞
- C、泪液的分泌增多
- D、鼻泪管的阻塞
- E、泪小点的阻塞

正确答案：C

16、下列视网膜脱离病人的护理措施错误的是()

- A、术后双眼包盖
- B、术前戴有色防护镜卧床休息
- C、术后体位按医嘱执行
- D、半流质饮食
- E、术前卧床体位应取裂孔最高位

正确答案：E

17、测远视力时，错误的是()

- A、视力表挂在光线充足的地方
- B、自上而下依次辨认视标
- C、先测右眼再测左眼
- D、用对数视力表应采用5分记录法
- E、视力表中4.0行与眼平行

正确答案：E

18、眼外肌包括()条。

- A、6
- B、8
- C、7
- D、5
- E、9

正确答案：A

19、成人时期双侧眼球突出常见原因：()

- A、海绵状血管瘤
- B、蝶骨嵴脑膜瘤
- C、甲状腺相关眼病
- D、淋巴瘤
- E、颈动脉海绵窦瘘

正确答案：C

20、糖尿病易引起的白内障为()

- A、老年性白内障
- B、并发性白内障
- C、放射性白内障
- D、代谢性白内障
- E、先天性白内障

正确答案：D

21、减少房水分泌的药物是()

- A、缩瞳剂
- B、镇静剂 E 高渗剂
- C、扩瞳剂
- D、碳酸酐酶抑制剂

正确答案：D

22、对急性闭角性青光眼患者的下列护嘱中，错误的是()

- A、避免不良刺激
- B、安静卧床休息
- C、多饮水，保持大便通畅
- D、少看电视
- E、避免长时间低头

正确答案：C

23、我国青光眼常见类型是()

- A、新生儿血管性青光眼
- B、原发性开角型青光眼
- C、原发性闭角型青光眼
- D、恶性青光眼
- E、先天性青光眼

正确答案：C

24、关于真菌性角膜炎的叙述，错误的是()

- A、多有植物性角膜外伤史
- B、有长期使用激素和抗生素史
- C、前房积脓呈灰白色，粘稠或呈糊状
- D、有时在角膜感染病灶旁可见“伪足”或“卫星样”浸润病灶
- E、起病急骤

正确答案：E

25、老年性白内障进展过程中哪一期易诱发急性闭角型青光眼()

- A、初发期
- B、过熟期
- C、成熟期
- D、膨胀期
- E、以上均不是

正确答案：D

26、对远视眼的健康指导，错误的是()

- A、生理性远视无需戴镜
- B、视力下降均应配镜矫正
- C、定期检查视力
- D、散瞳验光
- E、发生内斜应配镜矫正

正确答案：E

27、不能用于治疗远视的是()

- A、ICR
- B、有晶体眼人工晶体植入术
- C、巩膜扩张术
- D、PRK
- E、准分子激光角膜原位磨镶术

正确答案：A

28、原发性闭角型青光眼禁用()

- A、扩瞳剂
- B、镇静剂 E 高渗剂
- C、缩瞳剂
- D、碳酸酐酶抑制剂

正确答案：A

29、泪腺位于眼眶()的泪腺窝内

- A、外下方
- B、内下方
- C、外上方
- D、内上方
- E、正上方

正确答案：C

30、关于视网膜色素上皮，不正确的说法是()

- A、具有支持光感受器活动的色素屏障作用
- B、以上均不对
- C、它与神经连接紧密
- D、可传递来自脉络膜毛细血管的营养
- E、能够吞噬和消化锥体和杆体的外节膜盘

正确答案：C

31、下列有关急性泪囊炎的叙述中，正确的是（ ）

- A、尽早应用抗生素治疗
- B、炎症仅仅局限于泪囊部
- C、即使严重时也不会产生全身症状
- D、应及时行鼻腔泪囊吻合术
- E、急性泪囊炎治疗不及时可引起慢性泪囊炎

正确答案：A

32、女，24岁双眼屈光不正（近视），近半年来更换了3次眼镜。查体：角膜前弹力层自发破裂，浅层混浊，眩光，后弹力层破裂，基质层水肿，并且其祖父也有同样的情况。请问：是什么病 其主要的体症应是什么（ ）

- A、角膜基质炎 畏光 流泪
- B、梅毒性角膜炎 角膜新生血管
- C、圆锥角膜 角膜出现向前突起的圆锥
- D、细菌性角膜炎 角膜混浊
- E、病毒性角膜炎 疼痛、畏光

正确答案：C

33、沙眼的病原体属于（ ）

- A、螺旋体
- B、病毒
- C、真菌
- D、细菌
- E、衣原体

正确答案：E

34、除外下列哪一种疾病均可导致视物变形（ ）

- A、视网膜色素变性
- B、黄斑病变
- C、视网膜寄生虫

- D、视网膜病变
- E、视网膜血管瘤

正确答案：A

35、视网膜毛细血管前小动脉阻塞可形成()

- A、水肿
- B、棉绒斑
- C、出血点
- D、樱桃红斑
- E、硬性渗出

正确答案：B

36、下列对于虹膜后粘连的描述，不正确的有()

- A、散瞳后瞳孔呈圆形
- B、对光反应迟钝或消失
- C、瞳孔缩小
- D、瞳孔边界不整齐，形状不规则
- E、可继发青光眼

正确答案：A

37、房水闪辉不见于()

- A、急性闭角型青光眼
- B、角膜溃疡
- C、眼顿挫伤
- D、急性虹膜睫状体炎
- E、急性结膜炎

正确答案：E

38、一个人双眼中较好眼的日常生活视力为小于 0.05，则这个人为()

- A、单眼盲者
- B、重度视力损伤者
- C、盲人
- D、视力正常者
- E、中度视力损伤者

正确答案：C

39、视力低于 0.02，改查指数时，应从多少距离开始逐渐移近()

- A、任意
- B、0.5m

- C、5m
- D、1m
- E、0.3m

正确答案：D

40、中心视野是指()

- A、距注视点 30。以内范围
- B、距注视点 20。以内范围
- C、距注视点 15。以内范围
- D、距注视点 40。以内范围

正确答案：A

41、眼眶壁较厚的是()

- A、下壁
- B、外侧壁
- C、内侧壁
- D、上壁
- E、中壁

正确答案：B

42、下列组织中，不属于葡萄膜的是()

- A、虹膜
- B、睫状突
- C、睫状体
- D、视网膜
- E、脉络膜

正确答案：D

43、眼部球结膜下注射时的进针角度()

- A、10~15。
- B、0~5。
- C、15~30。
- D、5~10。
- E、15~20。

正确答案：A

44、玻璃体积血是由于()

- A、睫状体、视网膜或脉络膜的血管损伤引起
- B、房角后退

- C、前房角挫伤
- D、玻璃体本身血管破裂
- E、玻璃体变性

正确答案：A

45、压抑疗法适用于()

- A、轻度弱视
- B、重度弱视
- C、所有弱视
- D、中度弱视
- E、不适用弱视

正确答案：D

46、结膜囊冲洗时洗眼壶距眼球的距离为()

- A、1~2cm
- B、4~5cm
- C、4~6Ccm
- D、2~3cm
- E、3~4cm

正确答案：E

47、人工晶体植入术的优点不包括()

- A、周边视野正常
- B、物像放大倍率小
- C、可迅速恢复视力
- D、物像放大倍率大
- E、具有良好的组织相容性

正确答案：D

48、抗青光眼药物中，能增加房水经葡萄膜巩膜外流通道排出的药是()

- A、乙酰唑胺
- B、噻吗洛尔
- C、拉坦前列素
- D、毛果芸香碱
- E、阿托品

正确答案：C

49、青光眼三联征是指()

- A、角膜后色素沉着、虹膜节段性萎缩及色素脱落、青光眼斑

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/917023125053006043>