

临床执业医师考试考试真题及答案

一、A1 题型

1. 男性，52 岁，因反复出现头晕、鼻出血 5 年就诊。有疟疾病史。查体：巩膜无黄染，肝未触及，脾左肋下 8cm，无腹水征。肝功能正常，骨髓检查增生骨髓象。食道吞钡透视检查无食道静脉曲张。最有效的治疗方法是

- A. 应用补血药
- B. 用止血药
- C. 内科化疗
- D. 脾切除术
- E. 观察

【正确答案】 D

【答案解析】 对于疟疾引起的巨脾者，可手术切除，防止巨脾、脾亢引起的出血。

2. 最易受外界不良因素影响而发生夭折，先天畸形或遗传性疾病的胎龄为

- A. 15 周内
- B. 30 周内
- C. 16 周内
- D. 12 周内
- E. 28 周内

【正确答案】 D

【答案解析】 最初 12 周（胚胎期，妊娠早期）是器官原基分化的关键时期，易受外界不利因素的影响而出现夭折或先天畸形、遗传性疾病。

3. 关于医学心理学的实验研究方法，其主要特点是

- A. 只能以人为被研究对象
- B. 只能在实验室中完成
- C. 只记录生物学指标
- D. 只在有目的的一定控制条件下进行
- E. 只使用各种现代仪器设备

正确答案：D

答案解析：实验法是在控制的条件下观察、测量和记录个人行为的一种研究方法，也是科学中应用最广、成效最大的一种方法。它最常被用于实验室中，但也可用于临床研究中。该方法的主要特点实验者在控制的条件下，系统地操纵或改变一个或几个变量，观察、测量和记录对其他变量的影响。

4. 在下列各项中，对患者不会造成伤害的是

- A. 医务人员对患者呼叫或提问置之不理
- B. 医务人员为治疗疾病适当地限制或约束患者的自由
- C. 医务人员的行为疏忽和粗枝大叶
- D. 医务人员的知识和技能低下
- E. 医务人员强迫患者接受检查和治疗

【正确答案】B

【答案解析】临床上可能对患者造成伤害的情况有：医务人员的知识和技能低下；对患者的呼叫或提问置之不理；歧视、侮辱、谩骂患者或家属；强迫患者接受某项检查或治疗措施；施行不必要的检查或治疗；医务人员的行为疏忽，粗枝大叶；不适当地、不以治疗为目的的限制约束患者自由；威胁或打骂患者；拒绝对某些患者提供医疗照护活动；拖拉或拒绝对急诊患者的抢救等。

5. 男，40岁。左下肢疼痛发凉半年。既往有左下肢血栓性浅静脉炎病史，无高血压、糖尿病病史。吸烟20年，20支/天。查体：右下肢正常，左足苍白，皮温明显降低，左足背动脉搏动消失，左股动脉可触及搏动。Buerger试验阳性。最有可能的诊断是左下肢

- A. 急性动脉栓塞
- B. 血栓闭塞性脉管炎
- C. 原发性下肢静脉曲张
- D. 动脉硬化性闭塞症
- E. 深静脉血栓形成

【正确答案】B

【答案解析】本病考虑血栓闭塞性脉管炎，本病有以下特点：①大多数患者为青壮年男性，多数有吸烟嗜好；②患肢有不同程度的缺血性症状；③有游走性浅静脉炎病史；④患肢足背动脉或胫后动脉搏动减弱或消失；⑤肢体抬高试验（Buerger试验）阳性者，提示患肢有严重供血不足。

6. 偏盲型视野缺损最常见于
- A. 糖尿病性视神经乳头水肿
 - B. 垂体腺瘤鞍上发展
 - C. Graves病浸润性突眼
 - D. 希恩综合征垂体梗塞
 - E. 嗜铬细胞瘤阵发高血压眼底出血

【正确答案】B

【答案解析】垂体瘤若向前上方发展，可压迫视神经交叉出现视力减退，视野缺损，主要为颞侧偏盲或双颞侧上方偏盲。糖尿病可合并视网膜病变，常表现为视力下降，

散光感。糖尿病引起视乳头水肿者少见，视乳头水肿常见于高血压。Graves 病浸润性突眼常表现为畏光流泪、复视、斜视、眼睑肿胀等。希恩综合征常表现为消瘦、乏力、畏寒、闭经、乳房萎缩等。高血压眼底出血主要表现为视力下降。

7. 男，44 岁。肝区疼痛 2 个月。呈持续性钝痛，放射至右肩背部，消瘦、乏力。查体：巩膜无黄染，肝肋下 3cm，质地稍硬，有结节感。AFP800 $\mu\text{g/L}$ ，B 超示肝右叶 8cm \times 6cm 占位病变，向外生长，周边血流量增强，门静脉正常，最理想的治疗方法是

- A. 肿瘤切除加放疗
- B. 姑息性肝切除术
- C. 根治性肝切除术
- D. 肝动脉化疗栓塞
- E. 局部射频治疗

【正确答案】 C

【答案解析】 患者临床表现考虑肝癌，且 AFP800 $\mu\text{g/L}$ ，支持肝癌的诊断。首选根治性肝切除术。

8. 老年急性阑尾炎的临床特征是

- A. 显著腹肌紧张
- B. 常有寒战、高热
- C. 腹痛、恶心明显
- D. 右下腹压痛明显
- E. 阑尾容易缺血、坏死

【正确答案】 E

【答案解析】老年人阑尾炎特点：主诉不确切、体征不典型，临床表现轻而病理改变重，体温及白细胞升高均不明显，容易延误诊治；阑尾缺血坏死、穿孔和其他并发症的发生率较高；常因伴发心血管病、糖尿病、肾功能不全等，使病情更加复杂、严重。

9. 男性，48岁。上腹不规律隐痛2个月，1小时前呕血1000ml。冠心病史10年。近期有心绞痛发作。不宜应用的药物是

- A. 血管加压素
- B. 生长抑素
- C. 埃索美拉唑
- D. 奥美拉唑
- E. 法莫替丁

【正确答案】 A

【答案解析】血管加压素收缩内脏血管，诱发冠心病，故而冠心病者忌用。

10. 下列哪项是2级高血压的诊断标准

- A. 140~149/90~95mmHg
- B. 160~179/100~109mmHg
- C. 160~169/100~109mmHg
- D. 160~179/100~119mmHg
- E. 170~179/100~110mmHg

【正确答案】 B

【答案解析】2级高血压是收缩压160~179mmHg和（或）舒张压100~109mmHg。

11. 关于结核病下列说法正确的是

- A. 结核病常有低热、乏力等全身症状和咳嗽、咯血等呼吸系统表现

- B. 结核病大部分为急性发病
- C. 结核病常是经血行感染
- D. 结核病不具备炎症特征
- E. 结核病好发于老年人

【正确答案】A

【答案解析】结核病是由结核杆菌感染引起的慢性传染病。结核病是青年人容易发生的一种慢性和缓发的传染病。潜伏期4~8周。其中80%发生在肺部，其他部位（颈淋巴、脑膜、腹膜、肠、皮肤、骨骼）也可继发感染。人与人之间呼吸道传播是本病传染的主要方式。传染源是接触排菌的肺结核患者。除少数发病急促外，临床上多呈慢性过程。常有低热、乏力等全身症状和咳嗽、咯血等呼吸系统表现。可分为原发性结核病和继发性结核病。

12. 肺癌常见的症状是

- A. 脓性痰
- B. 白色泡沫痰
- C. 刺激性咳嗽和血痰
- D. 胸闷、气短
- E. 肺部干啰音

【正确答案】C

【答案解析】肺癌常见的症状是刺激性咳嗽和血痰。刺激性咳嗽是癌肿在带较大支气管内生长所致，血痰为痰中带血点血丝或断续少量咯血。中年以上久咳不愈或出现血痰，就应提高警惕。

13. 女，35岁，热爱运动，运动时大量的出汗，主要是骨骼肌产热，其安静时主要产热器官为

- A. 骨骼肌
- B. 肝脏
- C. 胰腺
- D. 脾脏
- E. 心脏

【正确答案】 B

【答案解析】 人体的主要产热器官是肝（安静时）和骨骼肌（运动时）。人在寒冷环境中主要依靠寒战产热（骨骼肌不随意肌紧张）和非寒战产热（代谢产热）两种形式来增加产热量以维持体温。

14. 女，70 岁。间断咳嗽、咳痰 10 年，活动后气短半年，查体：双肺呼吸音减弱，心率 80 次/分，律齐。胸部 X 线未见明显异常。为明确诊断首选的检查是

- A. 肺功能
- B. 胸部 X 线
- C. 胸部 MRI
- D. 胸部 CT
- E. 心电图

【正确答案】 A

【答案解析】 患者慢性病程 10 年，活动后气短，双肺呼吸音减弱，考虑慢性阻塞性肺疾病，已做胸部 X 线。肺功能可进行通气功能检测，了解气道梗阻程度，对慢阻肺有确诊价值。

15. 男孩，4 岁，2 小时前摔倒后肩部疼痛。查体：头向右侧偏斜，右肩下沉，右侧上肢活动障碍，Dugas 征阴性。最可能的诊断是

- A. 正中神经损伤
- B. 锁骨骨折
- C. 桡骨头半脱位
- D. 肩关节脱位
- E. 肘关节脱位

【正确答案】 B

【答案解析】 患者右肩部摔伤，头向右侧偏斜，右肩下沉，Dugas 征阴性，首先考虑锁骨骨折。正中神经损伤常表现为拇指对掌功能障碍、手的桡侧半感觉障碍。桡骨头半脱位主要发生于上肢突然受牵拉的小儿。肩关节脱位时 Dugas 征阳性。肘关节脱位常表现为肘部畸形，肘后三角关系改变。

16. 男性，16 岁，3 天来左膝关节肿胀，自幼于外伤后易出血不止。查体：皮肤黏膜未见出血及紫癜，出血时间为 2min，凝血时间 30min，凝血酶原时间正常，疾病分类应为

- A. 纤维蛋白生成障碍
- B. 凝血酶生成障碍
- C. 血小板异常
- D. 凝血活酶生成障碍
- E. 血管壁功能异常

【正确答案】 D

【答案解析】 患者出血时间（BT）正常，凝血时间（CT）延长，表明为凝血因子异常所致的凝血功能障碍，不可能是血小板异常所致，因为血小板异常主要表现为 BT 延长、CT 正常。患者幼年发病，关节出血而无皮肤及黏膜出血，提示患者可能为血友病甲。此病因 FVIII 缺乏或活性降低，可影响内源性凝血途径，导致凝血活酶生成障碍。

17. 男，3 个月。生长发育良好，体重为 5kg，因母亲患慢性疾病，需停用母乳而改牛奶喂养。1) 每日所需水量是

A. 900ml

B. 750ml

C. 700ml

D. 650ml

E. 500ml

【正确答案】 B

【答案解析】 按照乳儿每日需水量为 150ml/kg，该小儿体重 5kg，所需水量每日为 150ml/kg×5kg=750ml。

18. 患者，男性，49 岁。因劳累后胸痛 3 年收住入院。入院后根据其发作时的心电图诊为“心绞痛”。其发作时最可能的心电图表现是

A. ST 段呈短暂的抬高，形成单向曲线

B. ST 段下移，T 波低平、双向、倒置

C. T 波高大

D. 左室肥厚劳损

E. 窦性心动过速

【正确答案】 D

【答案解析】 心绞痛是指冠状动脉供血不足，心肌急剧的、暂时的缺血与缺氧所引起的临床综合征，发作时可见心内膜下心肌缺血的心电图表现，即 ST 段下移，T 波倒置直立、双向等。所以本题选 D。

19. 流行性乙型脑炎的炎症性质是

- A. 化脓性炎
- B. 肉芽肿性炎
- C. 出血性炎
- D. 纤维素性炎
- E. 变质性炎

【正确答案】 E

【答案解析】 流行性乙型脑炎的病变广泛累及脑脊髓，引起神经细胞变性坏死，所以是变质性炎。

20. 下述关于 DNA 复制过程中错误的一项是

- A. 不需要 RNA 参与
- B. 新生 DNA 链沿 5' → 3' 方向合成
- C. DNA 链的合成不是连续的
- D. 复制是定点双向进行的
- E. 有 DNA 聚合酶参与

【正确答案】 A

【答案解析】 DNA 复制时先合成 RNA 引物，然后新生链从 5' → 3' 方向延伸，需要 DNA 聚合酶和 RNA 参与。

21. 女，20 岁，敏感体质，引起的真菌性超敏反应不包括

- A. 感染性超敏反应
- B. 接触性超敏反应
- C. 皮肤超敏反应

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/917053125152006042>