

(新) 急救相关知识考试题库

第一部分 单选题(200 题)

1、现场心肺复苏操作首要步骤是 0

- A、心前区叩击
- B、心脏按压
- C、口对口人工呼吸
- D、按额托项，保持呼吸道通畅
- E、心内注射

【答案】： D

2、中年女性，45 岁。炎热夏天，天气闷热，在外面连续工作 5 小时，由于大量出汗导致失水、失钠等引起的周围循环灌注不足属于 0

- A、热衰竭
- B、热射病
- C、热痉挛
- D、日射病

【答案】： A

3、II 型呼吸衰竭是指动脉血气显示 0

- A、仅有缺氧
- B、仅有二氧化碳潴留
- C、仅有二氧化碳降低
- D、既有缺氧，又有二氧化碳降低
- E、既有缺氧，又有二氧化碳潴留

【答案】： E

4、应该首先急救的损伤是 0

- A、包膜下脾破裂
- B、开放性气胸
- C、脑震荡
- D、下肢开放性骨折
- E、单根双处肋骨骨折

【答案】： B

5、抢救脊柱骨折的伤员时，应 0。

- A、采取保暖措施
- B、用软板担架运送
- C、用三角巾固定
- D、扶持伤者移动
- E、以上方法均正确

【答案】： C

6、现场急救中，口对口人工呼吸的吹气频率较适宜的是()

- A、12~14 次/分
- B、14~16 次/分
- C、16~18 次/分
- D、18~20 次/分
- E、20~22 次/分

【答案】： B

7、气管插管时看到的第一个标记物是 0

- A、声门
- B、会厌
- C、切牙
- D、悬雍垂

【答案】： D

8、急性有机磷农药中毒机制是 0

- A、抑制酶活性
- B、缺氧
- C、局部腐蚀刺激作用
- D、竞争受体
- E、麻醉作用

【答案】： A

9、四肢大动脉出血或采用加压包扎后不能有效控制的大出血应采用 0

- A、加压包扎止血法
- B、按压止血法
- C、指压止血法
- D、止血带止血法
- E、用止血钳直接夹闭血管的断端

【答案】： D

10、患者男性，45岁。护士为其测得的血压值为 145\95mmHg,该患者的血压属于

0

- A、理想血压
- B、正常血压
- C、临界高血压
- D、高血压
- E、单纯收缩期高血压

【答案】： D

11、四肢小动脉、中小静脉或毛细血管出血应采用加压包扎止血法 0

- A、加压包扎止血法
- B、按压止血法
- C、指压止血法
- D、止血带止血法

E、用止血钳直接夹闭血管的断端

【答案】： A

12、改善成人急性呼吸窘迫综合征病人缺氧的最佳措施是 0

- A、持续高流量吸氧
- B、按时使用有效抗生素
- C、呼气终末正压通气
- D、避免输液过量过快
- E、鼓励深呼吸和排痰

【答案】： C

13、用氧安全的重点是做好“四防”，其内容不包括 0

- A、防震
- B、防火
- C、防热
- D、防油
- E、防移动

【答案】： E

14、头颈部创伤的伤者开通气道的方法为 0

- A、仰头举颞法
- B、抬颌法
- C、仰头抬颈法
- D、压额抬颌法

【答案】： B

15、休克代偿期血压的变化)

- A、收缩压下降，脉压正常
- B、血压无变化
- C、收缩压正常，脉压小
- D、收缩压正常，脉压大
- E、收缩压升高，脉压大

【答案】： C

16、属于骨折早期并发症的是 0

- A、血管神经损伤
- B、关节僵硬
- C、创伤性关节炎
- D、缺血性肌挛缩
- E、延迟愈合

【答案】： A

17、患者，男性，49岁。既往有高血压、脑出血史，现脑出血术后16天出院，突发高热，由家人送至急诊科。患者神志不清，在对患者进行气道及呼吸评估时，患者

突然面色青紫。如果你是分诊护士，首先要做的是 0

- A、立即将患者送入抢救室
- B、给予人工呼吸
- C、呼叫医生
- D、尽快结束初级评估
- E、测量血氧饱和度

【答案】： A

18、患者，男性，3岁，因呕血黑便来院就诊，神志清楚，面色苍白，血压80/50mmHg。

考虑病人血容量不足，应输入的溶液是 0

- A、10%葡萄糖
- B、脂肪乳
- C、20%甘露醇
- D、中分子右旋糖酐
- E、浓缩白蛋白

【答案】： D

19、患者男性，46岁。诊断为“上消化道出血”收住院，为明确出血原因，首选的检查方法是)

- A、大便隐血试验
- B、X线钡剂造影
- C、内镜检查
- D、血常规检查
- E、B超检查

【答案】： C

20、插胃管时，患者出现呛咳、紫绀应 0

- A、嘱患者深呼吸
- B、嘱患者作吞咽动作
- C、立即拔出胃管重插
- D、托起患者头部再插管
- E、稍停片刻继续插

【答案】： C

21、休克早期血压的变化 0

- A、收缩压下降，脉压差小
- B、收缩压升高，脉压差大
- C、收缩压正常，脉压差小
- D、收缩压下降，脉压差大
- E、血压无变化

【答案】： C

22、EC手法E的作用是 0

- A、触摸颈动脉
- B、按压颈部
- C、固定面罩
- D、开放气道

【答案】： D

23、无脉性心脏停跳息者两次心跳检查之间应 0

A、先给予约 5 组(或者约 2 分钟)心肺复苏

B、行 12 导心电图检查

C、建立深静脉通道

D、准备电除颤

E、持续胸外心脏按压

【答案】： A

24、院前急救的原则错误的是 0

- A、先施救后排险
- B、先重伤，后轻伤
- C、急救与呼救并重
- D、转运与救护相结合

【答案】： A

25、下列属于气管插管的禁忌症的是 0

- A、主动脉瘤压迫气管者
- B、呼吸道分泌物过多不能咳出者
- C、窒息者
- D、呼吸道疾病的诊断和治疗

【答案】： A

26、在基础生命支持评估呼吸情况时，评估时间不应超过 0

- A、5 秒钟
- B、10 秒钟
- C、15 秒钟
- D、20 秒钟

【答案】： B

27、糖尿病酮症酸中毒的表现错误的是 0

- A、酮体生成过多
- B、水肿
- C、治疗前，血钾偏高或正常
- D、携氧功能障碍

【答案】： B

28、抢救触电病人应立即采取的措施是)

- A、切断电源
- B、处理电灼伤
- C、吸氧
- D、心肺复苏

【答案】： A

29、严重创伤性休克后，首先应预防的是 0

- A、感染
- B、输血并发症
- C、急性心力衰竭
- D、肠麻痹
- E、急性呼吸窘迫综合征

【答案】： A

30、高钾时心电图的变化正确的是 0

- A、S-T 段下降
- B、T 波高尖，PR 间期延长
- C、出现 U 波
- D、QRS 间 缩 短 ， QT 时间延长
- E、T 波宽而低平，重者 T 波倒置

【答案】： B

31、成人心肺复苏时打开气道的最常用方式为 0

- A、仰头举颏法
- B、双手推举下颌法
- C、托颊法
- D、环状软骨压迫法
- E、托颈法

【答案】： A

32、下列哪项不是高危药品 0

- A、10%氯化钾

B、10%葡萄糖酸钙

C、胰岛素

D、肾上腺素

【答案】： B

33、男性，30岁。车祸伤现场发现左股部伤口有大量鲜血涌出，此时最先应检查的是 0

- A、触诊足背和胫后动脉
- B、检查肢体感觉
- C、检查膝腱或跟腱反射
- D、足部主动活动有无缺失
- E、左下肢主动活动有无缺失

【答案】： A

34、属于闭合性创伤的是 0

- A、擦伤
- B、震荡伤
- C、切削伤
- D、撕脱伤
- E、火器伤

【答案】： B

35、气道异物梗阻腹部冲击法用力的方向为 0

- A、向内向上
- B、向内向下
- C、向外向上
- D、向外向下

【答案】： A

36、空气栓塞时应采取的卧位是 0

- A、半卧位
- B、端坐位
- C、右侧卧位，头低足高位
- D、左侧卧位，头低足高位
- E、左侧卧位，头高足低位

【答案】： D

37、关于心肺复苏，错误的是？0

- A、频率 100-120 次/分
- B、深度 5-6cm
- C、部位为胸骨下部
- D、按压通气比为 30:2

【答案】： C

38、胸外伤后，出现胸壁软化(连枷胸)的原因是 0

- A、2 根以上肋骨骨折
- B、多根多段肋骨骨折
- C、胸骨骨折
- D、反常呼吸
- E、纵隔摆

【答案】： B

39、急性 CO 中度中毒时，血液 HbCo 浓度为)

- A、10-30%
- B、30-50%
- C、>50%
- D、50-70%
- E、70%以上

【答案】： B

40、有关脑震荡表现不正确的是 0

- A、逆行性健忘
- B、颅内压增高
- C、血压下降
- D、意识障碍不超过 30 分钟
- E、生理反射迟钝

【答案】： B

41、抢救病人中护士进行的工作下列哪项不正确 0

- A、口头医嘱复诵后再执行
- B、用完的空安瓿应及时处理
- C、抢救后应及时请医生补写医嘱
- D、抢救记录字迹清晰及时准确
- E、医生未到时可先建立静脉通道

【答案】： B

42、转运时护士及医生始终位于病人的 0

- A、头部两侧
- B、左右两侧
- C、头尾位置
- D、左侧

【答案】： A

43、有机磷农药中毒最早出现的临床表现是 0

- A、平滑肌痉挛和腺体分泌增加
- B、全身肌肉发生强直性痉挛
- C、头痛、头晕、乏力
- D、共济失调
- E、谵妄、意识障碍

【答案】： A

44、患者女性，前臂行细带包扎 1 小时，自觉手指剧痛，护士观察见手指发凉发绀，

不能自主活动。首先考虑是 0

- A、室内温度过低
- B、石膏绷带包扎过紧
- C、神经损伤
- D、体位不当

【答案】： B

45、家庭环境中的创伤和擦伤，哪种清洗伤口的效果更好 0

- A、用自来水冲洗效果好
- B、用生理盐水冲洗效果好
- C、肥皂水冲洗效果好
- D、用苏打水冲洗效果好
- E、A 和 B 效果一样好

【答案】： E

46、对清除肠内毒物有积极意义的洗胃时限是 0

- A、食物中毒 3 小时内
- B、食物中毒 4 小时内
- C、食物中毒 6 小时内
- D、食物中毒 8 小时内
- E、食物中毒 10 小时内

【答案】： C

47、一氧化碳中毒，最先受累的脏器是 0

- A、心脏
- B、骨骼肌
- C、胃肠道
- D、肾脏
- E、脑组织

【答案】： E

48、呼吸性酸中毒应先处理的问题是 0

- A、控制感染
- B、促进咳痰
- C、单纯高浓度吸氧
- D、给予碱性液体
- E、解除呼吸道梗阻，改善换气

【答案】： E

49、大脑组织缺氧后发生不可逆时间一般为)

A 、1 分钟

B 、2 分钟

C

- 、3 分钟
- D、4 分钟
- E、8 分钟

【答案】： D

50、患者，男，70 岁。胸痛心悸伴晕厥 1 次。体检示： BP140/80mmHg
HR72 次/分，

早搏 2—3 次/分。收入 ICU 后，心电监护见室颤。拟使用电除颤，下
列那一项是首

次双向波除颤最常用的能量 0

- A、100J
- B、200J
- C、300J
- D、150J
- E、360J

【答案】： B

51、抢救时胸外心脏按压有效的标志是 0

- A、颈动脉搏动
- B、股动脉搏动
- C、肱动脉搏动
- D、颈、股动脉搏动
- E、颈、肱动脉搏动

【答案】： D

52、气道异物梗阻患者胸部冲击法用力的部位在患者的 0

- A、胸骨上部
- B、胸骨中部
- C、胸骨下部
- D、剑突部

【答案】： B

53、患者，女性，40岁，车祸时头部受伤，出现头痛、呕吐而急诊入院。为预防脑水肿，降低颅内压，应采取的体位是 0

- A、端坐卧位
- B、头高足低位
- C、半坐卧位
- D、头低足高位
- E、中凹卧位

【答案】： B

54、对成人进行胸外心脏按压时，双手应该 0

- A、双手掌根重叠
- B、双手指重叠
- C、掌心紧贴胸壁
- D、手指紧贴胸壁
- E、掌根压胸壁

【答案】： A

55、以上哪种情况应禁忌洗胃 0

- A、急性有机磷农药中毒
- B、急性安定中毒
- C、飘药中毒
- D、强酸、强碱中毒
- E、食物中毒

【答案】： D

56、下列哪一项是多发伤的临床特点)

- A、创伤后全身反应较轻，死亡率不高
- B、较少发生休克
- C、低氧血症发生率高
- D、多发伤等同于多处伤

E、不易发生漏诊和误诊

【答案】： C

57、灭火器至少多长时间进行一次全面检查和保养 0

- A、一个月
- B、一个季度
- C、半年
- D、一年

【答案】： A

58、患者，男性，52岁。因车祸致胸腹联合伤，左侧多发性肋骨骨折(连枷)伴大量血气胸；脾破裂伴腹腔内出血。神志清，BP75/46mmHg R38次/分，心率126次/分，

律齐，医护人员到达现场后首先要对患者进行哪一项伤情评估 0

- A、意识状态
- B、气道和呼吸情况
- C、进行化验检查
- D、循环情况
- E、仔细的胸部检查

【答案】： B

59、一次性出血量超过()时可引起全身症状。()

- A、250ml
- B、800ml
- C、400-500ml
- D、600ml
- E、1000ml

【答案】： C

60、2015 心肺复苏指南中胸外按压的频率为 0

- A、至少 80-100 次/分
- B、至少 100 次/分
- C、至少 120 次/分
- D、至少 60-80 次/分
- E、至少 110 次/分

【答案】： B

61、高血压分为几级 0

- A、1 级
- B、2 级
- C、3 级
- D、4 级

【答案】： C

62、患者男性，45 岁。炎热夏天在外高空作业 3 小时出现大汗、口渴、头晕、胸闷。该病人可能出现了 0

- A、先兆中暑
- B、轻度中暑
- C、热痉挛
- D、日射病
- E、热射病

【答案】： A

63、张力性气胸紧急处理是 0

- A、行胸膜腔闭式引流术
- B、开胸缝合气管裂伤
- C、用大号针头在锁骨中线第 2~第 3 肋间胸穿放气
- D、给氧 E. 做人工呼吸

【答案】： C

64、胸部冲击伤最严重的并发症是 0

- A、血胸
- B、气胸
- C、ARDS
- D、肺不张
- E、肺破裂

【答案】： C

65、成人心肺复苏时胸外按压的深度为 0

- A、至少胸廓前后径的一半
- B、至少 3cm
- C、至少 5cm
- D、至少 6cm
- E、45cm

【答案】： C

66、以下说法中哪一条可能不正确()

A、肺脏在正常时含有足够的氧，在呼吸停止后能防止严重的血氧不饱和达 30 秒

左右；

B、单纯施行胸外心脏按压的患者存活率明显高于未接受 CPR 者；

C、在 SCA 导致心搏骤停早期，即使不通气，单纯胸外心脏按压可能也足以维持机

体基本的通气要求；

D、双人实行 CPR 时，应按照 15:2 的按压通气比进行。

E、双人实行 CPR 时，应按照 30:2 的按压通气比进行。

【答案】： D

67、胸部多根多处肋骨骨折的治疗要点 0

- A、保持呼吸道通畅
- B、鼓励患者咳嗽排痰
- C、卧床休息

D、给精神安慰

E、制止胸壁的浮动，纠正呼吸障碍预防外伤性湿肺发生

【答案】： E

68、气管插管留置的时间一般最多为()h

- A、48
- B、12
- C、72
- D、24

【答案】： C

69、以下患者可以立即转送的是 0

- A、腹腔内出血未控制
- B、休克患者
- C、大腿骨折未固定
- D、急性左心素竭
- E、肠膨出已行腹部包扎

【答案】： E

70、有机磷农药吸收后浓度最高的脏器是 0

- A、心
- B、脑
- C、肾
- D、肝
- E、肺

【答案】： D

71、判断甲状腺功能亢进程度的主要依据是 0

- A、体温、呼吸
- B、血压、脉搏
- C、体重、食欲
- D、突眼程度
- E、睡眠时间

【答案】： B

72、糖尿病昏迷患者使用胰岛素时应注意补充 O

- A、Na⁺
- B、Cl⁻
- C、Ca²⁺
- D、K⁺
- E、Mg²⁺

【答案】： D

73、急救时医师下达口头医嘱，以下错误的选项是 O。

- A、护士要进行口头复述，经医生确认后方可执行。
- B、待抢救结束后 30 分钟内补下医嘱。
- C、补下医嘱的时间为录入医嘱的时间。
- D、由参加抢救的经治或值班医师补下医嘱。
- E、以上均正确

【答案】： C

74、急性巴比妥类药中毒时最主要的并发症和致死原因是 ()

- A、呼吸和循环衰竭
- B、中毒性休克
- C、大出血
- D、急性肾衰竭
- E、急性肝衰竭

【答案】： A

75、病人心肺复苏后，脑复苏的主要措施是 O

- A、维持有效的循环
- B、确保呼吸道通畅
- C、降温和脱水疗法
- D、加强基础护理
- E、治疗原发疾病

【答案】： C

76、某日护士小张正在急诊室工作，突然闯进一位怒气冲冲的患者家属，叫嚷着

要找医院领导。这时小张应该 0

- A、制止患者家属愤怒的发泄
- B、直接交给上级领导处理
- C、主动倾听，了解分析患者家属愤怒的原因
- D、对其不理不睬，直接回避
- E、对其愤怒行为给予批评

【答案】： C

77、下列判断心肺复苏有效的指标中，应除外 0

- A、瞳孔由大变小
- B、每次按压可触及颈动脉搏动
- C、出现周身毛孔收缩
- D、出现睫毛反射
- E、面色由发绀转为红润

【答案】： C

78、口服补液盐液体的张力为 0

- A、1/5 张
- B、1/4 张
- C、1/3 张
- D、1/2 张
- E、2/3 张

【答案】： E

79、患者男性，自感心慌、头晕。查体；心率 84 次\分，脉搏 52 次\分，心律不规则，

心率快慢不一，心音强弱不等，该息者可能出现了 0

- A、二联律
- B、三联律
- C、脉搏短绌

D、心动过缓

E、脉搏异常

【答案】： C

80、膀胱刺激征是指 0

- A、尿失禁、尿多
- B、排尿困难、尿滴沥
- C、尿痛、尿急
- D、夜尿增多、尿频
- E、尿频、尿急、尿痛

【答案】： E

81、救治中毒的原则错误的是 0

- A、促进毒物的排泄
- B、尽早使用特效解毒剂
- C、立即终止机体与毒物的接触
- D、毒物不明确的先诊断再抢救

【答案】： D

82、如果一次注入洗胃液过多会引起 0

- A、胃内压升高引起反射性心跳加快
- B、胃内压降低引起反射性心跳廉停
- G、胃内压升高毒物吸收增加
- D、胃内压降低毒物吸收增加

【答案】： C

83、王女士，30岁，颅脑损伤住院治疗行冬眠降温疗法错误的护理是 0

- A、用药前量体温、脉搏、呼吸、血压
- B、物理降温后用冬眠药物
- C、病人在注射冬眠药物后半小时内不宜翻身或搬运
- D、维持直肠内温度在 32-34℃
- E、维持、电解质及酸碱平衡

【答案】： D

84、对火灾抢救出来的伤员，应首先 0

- A、给予充足的饮食再送医院
- B、询问火灾原因
- C、采取各种适当的方法进行现场救护再送医院
- D、得到亲友的陪伴在进行抢救治疗

【答案】： C

85、中心负压故障时，立即停用中心吸引装置，启用备用电动吸痰器进行吸引，必

要时采用 0 与吸痰管连接吸痰

- A、吸痰管
- B、50ml 注射器
- C、甘油注射器
- D、听诊器

【答案】： B

86、慢性特发性血小板减少性紫素最常见于 0

- A、婴幼儿
- B、青少年
- C、青年女性
- D、青年男性
- E、中年人

【答案】： C

87、休克时正确的补液原则是 0

- A、补液“宁多勿少”
- B、需多少补多少
- C、补充丧失的部分液体和当天继续丧失的液体
- D、失多少补多少
- E、如血压正常不必补液

【答案】： B

88、以下哪项不是中暑的常见诱因 0

- A、年老、疲劳
- B、体弱
- C、营养不良
- D、糖尿病
- E、骨质疏松

【答案】： E

89、息者，男性，35岁，车祸外伤后输入大量库存血后，出现心率缓慢、手足抽搐，

血压下降，伤口渗血，出现以上症状的有关因素是 0

- A、高血钾
- B、低血钾
- C、高血钙
- D、低血钙
- E、低血钠

【答案】： D

90、男，12岁，因溺水出现心脏骤停，心电监护示一直线，有双人参与抢救，除如

下哪种抢救措施外，其余措施均可采取 0

- A、胸外按压
- B、人工呼吸
- C、电除颤
- D、心脏起搏

【答案】： D

91、患者，男性，50岁。因车祸致胸腹部剧痛2小时入院，查体：

BP80/48mmHg P120次/分，脉搏细速，R30次/分，氧饱和度78%。神志清，左侧呼吸音消失。全腹肌紧张，压痛、反跳痛明显，移动性浊音(+)，骨盆分离征(+)。拟为“多发伤 1 多发

肋骨骨折，左侧血气胸；2 腹部闭合伤，肝破裂；3 骨盆骨折，后腹膜血肿”入院。患

者突然发生意识丧失，心率 150 次/分，血压 66/45mmHg，应立即 0

- A、加快输液
- B、留置深静脉，输血，准备手术
- C、立即转送急诊监护室
- D、床边手术
- E、留置尿管，记录进出量

【答案】： B

92、诊断心跳骤停的简捷依据是 0

- A、血压测不到
- B、神志突然消失
- C、呼吸突然停止
- D、大动脉搏动消失

【答案】： D

93、男，50 岁，高血压病多年，近日活动后出现呼吸困难伴左胸痛，咳嗽频繁，咳

出为粉红色泡沫样血痰，可能疾病为 0

- A、大叶性肺炎
- B、急性左心衰
- C、右心衰竭
- D、支气管扩张
- E、自发性气胸

【答案】： B

94、地震被埋时如果一时不能脱险，应如何自救?0

- A、设法将手脚挣脱出来，推开压在身上的物体，使呼吸通畅
- B、不管是否受伤，都要用力向外抽拉身体
- C、使用明火求救

D、搬开身边杂物，扩大活动空间

【答案】： A

95、医护人员到达现场，可用哪几种颜色对伤员进行分类 0

A、白、黄、绿、黑

B、红、黄、绿、黑

C、红、黄、蓝、黑

D、红、白、绿、黑

【答案】： B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/925202024034011232>