

2022 年内蒙古初级康复医学技师考试真题卷

本卷共分为 2 大题 50 小题，作答时间为 180 分钟，总分 100 分，60 分及格。

一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1. 某男，小腿患急性化脓性炎症，局部有坏死组织，中央区的紫外线照射用

- A. 亚红斑量
- B. 弱红斑量
- C. 中红斑量
- D. 强红斑量
- E. 超强红斑量

2. 可增强训练者兴奋性的作业训练方法是

- A. 书法
- B. 绘画
- C. 插花
- D. 钓鱼

E. 游戏

3. 有关失神经肌肉电刺激疗法中的错误描述为

- A. 采用能输出三角波、方波的低频脉冲电疗仪
- B. 电流频率 0.5~100Hz, 波宽 1~1000ms
- C. 电流输出强度 0~100mA
- D. 失神经肌肉用方波刺激只引起病患肌肉收缩
- E. 失神经肌肉用三角波刺激可以避免刺激正常肌肉和感觉神经

4. 主动—辅助关节活动训练的目的在于

- A. 牵张挛缩或粘连的肌腱和韧带
- B. 维持或恢复关节活动范围
- C. 逐步增强肌力, 建立协调动作模式
- D. 增强瘫痪肢体本体感觉
- E. 刺激屈伸反射、放松痉挛肌肉

5. 四肢关节牵引治疗的适应证为

- A. 骨性关节强直
- B. 关节内感染
- C. 当挛缩的软组织有增大关节功能能力作用时
- D. 关节活动范围减少, 特别是存在挛缩及粘连的关节

E. 关节内血肿

6. 腕部腱鞘囊肿患者的最常见症状与体征是

A. 腕或手的无痛性块状物

B. 抓握无力

C. 腕背侧疼痛

D. 指甲变形

E. 红肿热痛

7. 患者，男，20岁，左手腕部刀伤，损伤正中神经，经手术治疗创口愈合后，不宜进行的治疗是

A. 神经肌肉电刺激

B. 音频电疗法

C. 冷冻疗法

D. 针灸疗法

E. 戴手指矫形器

8. 关节松动术的禁忌证为

A. 关节疼痛

B. 关节肿胀

C. 进行性关节活动受限

- D. 肌肉紧张痉挛
- E. 功能性关节制动

9. 烧伤后全手烧伤, 将腕关节微背屈, 各指蹼间用无菌纱布隔开, 掌指关节屈曲至

- A. $10^{\circ} \sim 20^{\circ}$
- B. $20^{\circ} \sim 30^{\circ}$
- C. $30^{\circ} \sim 40^{\circ}$
- D. $40^{\circ} \sim 50^{\circ}$
- E. $50^{\circ} \sim 60^{\circ}$

10. Mills 征阳性提示

- A. 腕骨综合征
- B. 狭窄性腱鞘炎
- C. 肱骨外上髁炎
- D. 腕部腱鞘囊肿
- E. 肱二头肌腱断裂

11. 肩关节周围炎最常见的病因是

- A. 结核
- B. 风湿

- C. 损伤
- D. 细菌感染
- E. 类风湿

12. 踝扭伤评定时不适用放射线摄影的情况是

- A. 1 级损伤
- B. 2 级损伤
- C. 3 级损伤
- D. 外踝压痛
- E. 保守措施无效

13. 患者，女，30 岁，外伤致左跟腱损伤，行跟腱缝合术并逐渐进行被动牵伸的时间应是

- A. 术后即刻
- B. 术后 1 个月
- C. 术后 3 个月
- D. 术后 6 周
- E. 术后 1 年

14. 帕金森病的康复治疗所针对的运动功能障碍不包括

- A. 震颤

- B. 肌强直
- C. 运动徐缓
- D. 姿势步态异常
- E. 弛缓性瘫痪

15. 直流电疗法的适应证包括

- A. 急性湿疹
- B. 血栓性静脉炎
- C. 心力衰竭
- D. 出血倾向
- E. 骨折以金属内固定术后

16. PNF 中下肢 D2 曲模式类似于日常生活动作中的

- A. 腿伸直穿裤子
- B. 游泳中“蛙泳”
- C. 踢足球
- D. 睡觉时把右腿放在左腿上
- E. 跳芭蕾舞

17. 以下哪项与维持身体平衡和姿势无关

- A. 皮肤触觉、压觉、本体感觉

- B. 运动系统的作用
- C. 嗅觉系统
- D. 前庭系统中壶腹嵴
- E. 迷路内的椭圆囊斑和球囊斑两个感受器

18. 下列关于帕金森病患者步态训练，内容不正确的是

- A. 加快起步速度
- B. 降低步行速度
- C. 提高躯干和上肢之间运动的协调
- D. 加大步幅、步宽
- E. 确保中心的顺利转移

19. 下列不属于低频脉冲电疗法的是

- A. 功能性电刺激疗法
- B. 感应电疗法
- C. 干扰电疗法
- D. 神经肌肉电刺激疗法
- E. 间动电疗法

20. 脊髓灰质炎的康复治疗可以分为

- A. 急性期、瘫痪期、恢复期

- B. 前驱期、急性期、恢复期
- C. 前驱期、恢复期、后遗症期
- D. 急性期、恢复期、残疾期
- E. 急性期、恢复期、后遗症期

21. 不能准确地判断物品的位置，伸手取物时或未达谊物而抓空，或伸手过远将物品碰倒。患者可能有

- A. 图形背景分辨困难
- B. 视空间失认
- C. 空间定位障碍
- D. 结构性失用
- E. 形状定向障碍

22. 有关等长收缩，下列哪项表述是错误的

- A. 是肌力与阻力相等时的一种收缩形式
- B. 收缩时肌肉长度基本不变
- C. 不产生关节活动
- D. 也称为静力收缩
- E. 上楼梯时股四头肌的收缩形式即为此类收缩

23. 有关慢性损伤的物理治疗，下列哪项是错误的

- A. 红外线
- B. 蜡疗：水浴法或蜡饼法
- C. 高频电疗：无热量
- D. 超声波：水下法或直接接触法，小剂量或中剂量
- E. 恢复功能：增加关节活动范围，牵伸运动，肌力训练

24. 哪种方法不能提高对疔的免疫功能

- A. 紫外线疗法
- B. 日光浴
- C. 温水浴
- D. 红外线疗法
- E. 有氧运动

25. 摆动相占步行周期的

- A. 30%
- B. 40%
- C. 50%
- D. 60%
- E. 70%

二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，有多个

符合题意)

1. 下列细菌中动力阴性的有

- A. 痢疾志贺菌
- B. 伤寒沙门菌
- C. 奇异变形杆菌
- D. 肺炎克雷伯菌
- E. 枸橼酸杆菌

2.

每个案例至少有 5 个提问，每个提问有 6~12 个备选答案，其中正确答案有 1。

女，63 岁，脑卒中后右侧偏瘫就诊康复科，体格检查：神志清楚，言语清晰，左侧肢体活动自如。右侧上下肢肌张力增高，被动活动右上肢，在关节活动范围后 50%范围内出现突然卡住，然后在关节活动范围的后 50%均呈现最小的阻力；被动活动左、右下肢，在关节活动范围之末时出现突然卡住。运动功能 Brunnstrom 分期：右上肢 2 期，右手 1 期，右下肢 3 期。能主动完成翻身，坐位平衡 1 级。两人扶持下可站立。此时患者可进行的训练有

- A. 患肢被动、助力活动

- B. 卧-坐转移训练
- C. 坐-站转移训练
- D. 起立床站立训练
- E. 手指精细活动训练 上下台阶训练

3. 患儿 5 个月，提前半个月因宫内缺氧剖宫产，出生时体重 2.6kg。现在竖头不稳，不能独坐，翻身，双手无取物意识，四肢肌张力低下，母亲怀孕期间有感冒疾病史。正常 5 个月龄婴儿应该具备的能力有

- A. 头控稳定
- B. 爬行
- C. 侧坐
- D. 追视物体
- E. 手抓物体 四点跪

4.

每个案例至少有 5 个提问，每个提问有 6~12 个备选答案，其中正确答案有 1。

女，63 岁，脑卒中后右侧偏瘫就诊康复科，体格检查：神志清楚，言语清晰，左侧肢体活动自如。右侧上下肢肌张力增高，被动活动右上肢，在关节活动范围后 50%范围内出现突然卡住，

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/925214312241011342>