

## 护理技能竞赛理论卷试题及答案

1、病人刘某，在河中游泳时不慎溺水，查体：神志不清，口含泥沙、河水，呼吸微弱，脉搏 60 次/分。在启动 EMSS 时，以下措施正确的是（）

立即呼叫 120 等待救援

立即头偏一侧，清楚口腔异物(正确答案)

立即胸外心脏按压

叫人抬送医院

先联系家人

2、一日一辆公交车行驶至某大桥时突然发生爆炸事件，其中 29 名伤员被送至急诊科，值班护士第一步该做什么（）

立即准备外伤固定的器材

为休克病人开放静脉通道

将病人安置至抢救室

分诊分区就诊

报告护士长或总值班，启动灾难批量伤（病）员的应急预案(正确答案)

3、病人女性，28 岁，因右下腹疼痛 1 小时，伴头昏到急诊科就诊。该病人到急诊科就诊的流程首先是（）

分诊护士简单询问病史进行分诊(正确答案)

妇产科就诊

急诊内科就诊

急诊外科就诊

急诊神经科就诊

4、病人女性，28 岁，因右下腹疼痛 1 小时，伴头昏到急诊科就诊。经监测生命体征，病人 HR130 次/分，BP70/40mmHg，应立即（）

输血

送手术室

应用急救绿色通道，启动常见急症的应急预案(正确答案)

请多科会诊

行特检明确诊断

5、以下不是护士在灾难反应期的作用是 ( )

救援队内的联系通讯

建立伤员接收点

检伤分类

伤病员安置

制订应急反应计划(正确答案)

6、关于灾难现场检伤分分类标志的描述，错误的是 ( )

常用红、黄、绿、黑四色标志

红色代表危重伤，应在 1 小时内转送

黄色代表中重伤，应在 6~12 小时没转送(正确答案)

绿色代表轻伤，不需要转送

黑色代表致命伤，不需要转送

7、对 Triage Sieve 分类法的陈述，错误的是 ( )

分为优先级 1、2、3 和无优先级

分类依据是行走、气道开放、呼吸频率和毛细血管充盈

呼吸频率的判断标准是<15 次/分或>45 次/分(正确答案)

毛细血管充盈的判断标准是 2 秒

此法生理参数临界值与 START 不同

8、病人，女性，24 岁，高热一天，最高体温 39.2℃，到急诊科就诊。查体：神志清，胸前、耳后出现散在水痘，无鼻塞、咳嗽症状。分诊护士正确的处理是

( )

按高热病人分诊

按急热病人分诊

安排到隔离室就诊(正确答案)

按正常轻诊病人分诊

安排到皮肤科就诊

9、以下伤病员可以立即转送的是（）

腹腔内出血未控制

休克病人

大腿骨折未固定

急性左心衰竭

肠膨出行腹部包扎(正确答案)

10、关于空运伤病员的护理，错误的是（）

大型运输机中伤病员可横放

休克伤病员应头朝向机头(正确答案)

气管切开者应予湿化

气管插管者用生理盐水充气囊

有气胸者在上机前反复抽气

11、37岁男性，因呼吸困难，胸闷，咳嗽为白色脓痰一周收入ICU，经血常规、血生化、凝血常规（PT16.5秒，APTT54.2秒，INR1.36）及影像学检查，诊断为肺部感染，脓毒血症，在给予床边CBP治疗过程中，应特别注意的并发症是（）

血管通路不畅

空气栓塞

管道连接不良

出血(正确答案)

水、电解质平衡紊乱

12、下列关于分诊程序的陈述，正确的是（）

分诊程序包括：测量生命体征、挂号、分诊分流、分诊护理和分诊记录

SAMPLE问诊模式用于评估各种不适症状

病情复杂难以确定科别者，可先不予以处理

危重病人应先办理就诊手续，之后再由分诊护士送入抢救室进行抢救

需要紧急处理的危重病人，分诊护士应及时配合抢救护士予以急救处理(正确答案)

13、一工厂突发火灾，数十名伤员转运到急诊科，此时分诊护士的首要任务是  
( )

迅速检伤，病情危重程度分类(正确答案)

做好常规来诊病人的解释工作

发现危重病人立即投入抢救中

配合治疗区护士共同参与抢救

准备与来诊家属沟通

14、下列哪项是完整和最适宜的初级评估内容 ( )

气道及颈椎、呼吸功能、循环功能、有无家属陪同

气道及颈椎、呼吸功能、循环功能、体温、脉搏

循环功能、气道及颈椎、血氧饱和度、全身体检

气道及颈椎、呼吸功能、循环功能、神志状况、暴露病人(正确答案)

气道及颈椎、呼吸、循环、神志状况、暴露病人、有无家属陪同

15、下列对病人循环功能评估的陈述，不恰当的是 ( )

检查有无脉搏、脉搏是否正常

评估外出血情况

查看皮肤颜色

触摸皮肤湿度与温度

听诊呼吸音与心音的关系(正确答案)

16、休克指数=收缩压/脉搏，休克指数为何值时可能意味着休克 ( )

<0.7

<0.8

<0.9(正确答案)

<1.0

<1.1

17、病人，男性，49岁，既往有高血压、脑出血史，现脑出血术后16天出院，突发高热，由家人送至急诊科。病人神志不清，在对病人进行气道及颈椎评估时，病人突然面色青紫。如果你是分诊护士，首先要做的是 ( )

立即将病人送入抢救室(正确答案)

给予人工呼吸

呼叫医生

尽快结束初级评估

测量血氧饱和度

18、下列那种心律失常是冠心病猝死的最常见原因 ( )

室颤(正确答案)

无脉性室性心动过速

无脉性电活动

室速

停搏

19、心搏骤停的最常见原因是 ( )

气管异物

颅脑外伤

冠心病(正确答案)

药物中毒

电击伤

20、疑似心搏骤停病人，判断其有无大动脉搏动的时间是 ( )

不应该超过 5 秒

不应该超过 10 秒(正确答案)

不应该超过 15 秒

不应该超过 20 秒

不应该超过 30 秒

21、下列哪项是基础生命支持的主要目标 ( )

迅速准确判断心，肺功能衰竭或停止，立即实施现场心肺复苏术(正确答案)

加强对脑细胞损伤的防治和促进脑功能的恢复

应用辅助设备及特殊技术，建立和维持更为有效的通气和血液循环

识别及治疗心率失常

改善并维持心肺功能

22、关于成人胸外按压的陈述，正确的是（）

按压频率每分钟至少 100 次(正确答案)

胸骨下陷不超过

停止胸外按压看心电监护

胸骨下压时间长于放松时间

按压与通气之比为 15:2

23、终止室颤最迅速，最有效的方法是（）

胸外心脏按压

除颤(正确答案)

气管插管

球囊面罩通气法

建立静脉通路给予抢救药物

24、心肺复苏时静脉首选药物是（）

肾上腺素(正确答案)

阿托品

利多卡因

异丙肾上腺素

胺碘酮

25、一旦心搏骤停病人恢复自主循环，应以最低的 FiO<sub>2</sub> 维持血氧饱和度（）

80%~100%

85%~100%

90%~100%

94%~100%(正确答案)

100%以上

26、脑复苏的主要措施是（）

A. 维持血压和体温

B. 降低体温和血压

- C. 防治脑缺氧、提高颅内压
- D. 防治脑水肿、利尿、维持体温
- E. 维持血压、防治脑缺氧、低温(正确答案)

27、引起心搏骤停的“H's”病因不包括（）

低血钠症(正确答案)

低血容量

低氧血症

酸中毒

低体温

28、病人，男性，55岁，开会中突然晕倒，意识不清。8分钟后急救人员赶到现场触摸其颈动脉搏动消失。此时应立即采取的最恰当的急救措施是（）

气管插管，人工呼吸

按压人中，人工呼吸

立即气管插管，然后除颤

胸外按压2分钟，然后准备除颤(正确答案)

开放静脉通道，给肾上腺素1mg静脉注射

29、病人，男性，45岁，诊断：急性广泛前壁心肌梗死。在急诊抢救室等待冠状动脉造影时突然发生抽搐，意识不清，血压测不到，心电监护导联呈形态，振幅各异的不规则波动，频率为310次/分，QRS波群消失。请问此时心电图示波属于哪种心率失常（）

室颤(正确答案)

无脉性室速

无脉性电活动

停搏

室上速

30、创伤后，机体的病理生理反应错误的是（）

局部发生创伤性炎症反应

不伴有组织结构破坏，仅有邻近细胞坏死(正确答案)

局部表现为红、肿、热、痛

过强而广泛的炎症反应会导致严重的损害

局部反应在伤后 3~5 日后趋于消退

31、评估创伤气道时可除外下列那种方法 ( )

问

视

听

叩(正确答案)

触

32、多发伤伤员出现下列情况，应首先抢救 ( )

开放性气胸

休克

四肢开放性骨折

大出血的颌面部严重创伤(正确答案)

昏迷

33、某多发伤病人，胸部伤张力性气胸、脾破裂伴有骨盆粉碎性骨折，通过 AIS 评分分别记为 4 分、5 分及 5 分，则此病人的 ISS 评分是 ( )

14 分

28 分

33 分

66 分(正确答案)

78 分

34、女性，45 岁，因头部外伤 30 分钟，拟诊为“脑挫裂伤”急诊入院。接诊时发现，病人神志不清，口鼻腔出血且分泌物多，口唇发绀，呼吸困难。护士采取了如下措施，其中不正确的是 ( )

尽快手法清除口鼻分泌物

头后仰，托下颌

置病人于半卧位(正确答案)

吸引器吸痰

给氧

35、支气管哮喘急性发作时，控制症状首选()

.  $\beta$  2 受体激动剂(正确答案)

糖皮质激素

抗胆碱能药物

茶碱类

肥大细胞膜稳定剂

36、使用  $\beta$  2 受体激动剂时，观察药物不良反应应注意 ()

是否出现急性肺水肿的症状

病人有无溃疡加重

病人有无头痛、头晕、心悸、手指颤抖等副作用(正确答案)

注意感染的扩散

病人有无出血征象

37、重症哮喘的处理不包括 ()

注射西地兰(正确答案)

补液

给予糖皮质激素

吸氧

静脉滴注氨茶碱

38、患儿，男，4岁，不慎将果冻误吸入气管，出现三凹征，其呼吸困难为  
( )

吸气性呼吸困难(正确答案)

呼吸性呼吸困难

混合性呼吸困难

换气性呼吸困难

. 呼吸性呼吸困难

39、病人，男，25岁，15小时前由于车祸外伤送入急诊留观。病人突然呼吸困难，咳嗽，咳少量血水样痰，查体呼吸32次/分，意识清楚，只能说简单的短句，立即给予鼻导管吸氧，但病人缺氧症状未见改善，初步判断该病人呼吸困难的严重程度为（）

轻度呼吸困难

中度呼吸困难(正确答案)

重度呼吸困难

I级呼吸困难

II级呼吸困难

40、下列属于心肌损伤最敏感和特异的指标是（）

cTnT(正确答案)

CK-MB

D二聚体

CK

LDH

41、急性心肌梗死三大并发症是（）

心律失常、多源性室早、R-on-T现象

心源性休克、阿斯综合征、急性肺水肿

心力衰竭、R-on-T现象、急性肺水肿

心律失常、心源性休克、心力衰竭(正确答案)

心力衰竭、心源性休克、阿斯综合征

42、下面哪项一般不适合急性冠状动脉综合征病人的处理（）

扩张血管，减轻心脏负担

应用 $\beta$ 受体阻滞剂，降低心肌耗氧

口服阿司匹林，抑制血小板功能

抗凝，低分子肝素皮下注射

应用洋地黄，加强心肌收缩力(正确答案)

43、急性心肌梗死与心绞痛心电图鉴别最有意义的是（）

ST 段抬高

病理性 Q 波(正确答案)

ST 段压低

T 波高尖

T 波倒置

44、下列哪项不属于急性左心衰竭的表现 ( )

呼吸困难(正确答案)

恶心、呕吐

烦躁、大汗

咳嗽、咳痰

咳粉红色泡沫痰

45、可以终止无脉搏性尖端扭转型室速的药物是 ( )

利多卡因

硫酸镁(正确答案)

胺碘酮

肾上腺素

异搏定

46、血流动力学稳定的快速性心律失常病人，心电图为规则的窄 QRS 波 (< 0.12 秒) 的心动过速常考虑为 ( )

室性心动过速

心房颤动

尖端扭转型室速

心室颤动

室上性心动过速(正确答案)

47、病人，男性，70 岁，突然胸骨后压榨性疼痛 4 小时，并向左肩放射，伴多汗，恐惧，下列哪项检查对确立初步诊断最有价值 ( )

胸部 X 线检查

胸部 CT

心电图(正确答案)

超声心动图

放射性核素检查

48、病人，男性，56岁，突然心悸，气促，咳粉红色泡沫痰，血压135/90 mmHg，心率136次/分，应选择下列哪组药物（）

西地兰，硝酸甘油，异丙肾上腺素

速尿，硝普钠，西地兰(正确答案)

西地兰，硝普钠，心得安

. 胍乙啶，酚妥拉明，西地兰

硝酸甘油，西地兰，多巴胺

49、下列哪一项不是急性腹痛的共同特点（）

突然发生

病情变化大

疼痛往往剧烈

均伴有急性腹膜炎(正确答案)

病情重

50、病人，男性，28岁，突发上腹部刀割样持续性剧痛伴大汗淋漓2小时送到急诊科，急诊护士首先应考虑为（）

肠梗阻分诊到急诊外科

消化性溃疡急性穿孔分诊到急诊外科(正确答案)

急性胃炎分诊到急诊内科

肠梗阻分诊到急诊内科

消化性溃疡急性穿孔分诊到急诊内科

51、引起下消化道出血最常见的病因是（）

大肠癌(正确答案)

Meckel憩室

肠管息肉

痔疮

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/926132154213010045>