

# (新) 急救相关知识考试题库

## 第一部分 单选题(200 题)

1、对心室颤动病人进行心肺复苏的首选药物是 0

- A、碳酸氢钠
- B、山黄若碱
- C、利多卡因
- D、去甲肾上腺素
- E、葡萄糖酸钙

【答案】： C

2、息者，男性，35 岁，车祸外伤后输入大量库存血后，出现心率缓慢、手足抽搐，

血压下降，伤口渗血，出现以上症状的有关因素是 0

- A、高血钾
- B、低血钾
- C、高血钙
- D、低血钙
- E、低血钠

【答案】： D

3、急性颅内压增高病人典型的生命体征表现是 0

- A、脉快，呼吸急促
- B、脉快，血压降低
- C、脉快，血压高
- D、脉慢，呼吸慢
- E、脉慢，血压低

【答案】： D

- 4、溺水者控水，不正确的方法是 0
- A、在溺水者腹部放一小锅，然后按压背部排水
  - B、利用地面的自然斜坡排水
  - C、将溺水者放在牛背上，让牛奔跑将水排出
  - D、倒立法

【答案】： C

- 5、抢救触电病人应立即采取的措施是)
- A、切断电源
  - B、处理电灼伤
  - C、吸氧
  - D、心肺复苏

【答案】： A

- 6、胸部冲击伤最严重的并发症是 0
- A、血胸
  - B、气胸
  - C、ARDS
  - D、肺不张
  - E、肺破裂

【答案】： C

- 7、现场急救中，口对口人工呼吸的吹气频率较适宜的是()
- A、12~14 次/分
  - B、14~16 次/分
  - C、16~18 次/分
  - D、18~20 次/分
  - E、20~22 次/分

【答案】： B

- 8、急性敌百虫中毒禁用 0 溶液洗胃。 0
- A、清水、生理盐水
  - B、1:5000

高锰酸钾溶液

C、2%重曹溶液

D、牛奶、蛋清水

E、活性炭

【答案】： C

9、患者，男性，49岁。既往有高血压、脑出血史，现脑出血术后16天出院，突发高热，由家人送至急诊科。患者神志不清，在对患者进行气道及呼吸评估时，患者

突然面色青紫。如果你是分诊护士，首先要做的是

A、立即将患者送入抢救室

B、给予人工呼吸

C、呼叫医生

D、尽快结束初级评估

E、测量血氧饱和度

【答案】： A

10、下面禁止转运的指征不正确的是)

A、心跳、呼吸停止；

B、有气管插管指征，但未插管的；

C、血流动力学不稳定；

D、血压偏高

【答案】： D

11、糖尿病昏迷患者使用胰岛素时应注意补充

A、Na<sup>+</sup>

B、Cl<sup>-</sup>

C、Ca<sup>2+</sup>

D、K<sup>+</sup>

E、Mg<sup>2+</sup>

【答案】： D

12、双下肢骨折的伤病员，应首选 0

- A、杠轿式搬运
- B、担架搬运
- C、拖行搬运
- D、扶持搬运
- E、横抱搬运

【答案】： B

13、胸外伤后，出现胸壁软化(连枷胸)的原因是 0

- A、2根以上肋骨骨折
- B、多根多段肋骨骨折
- C、胸骨骨折
- D、反常呼吸
- E、纵隔摆

【答案】： B

14、下列哪一项是多发伤的临床特点)

- A、创伤后全身反应较轻，死亡率不高
- B、较少发生休克
- C、低氧血症发生率高
- D、多发伤等同于多处伤
- E、不易发生漏诊和误诊

【答案】： C

15、急救药品和各种抢救设备做到“五定”不包括 0

- A、定点安置
- B、定人保管
- C、定期消毒灭菌
- D、定期检查维修
- E、定期使用

【答案】： E

16、患者，女，28岁，看电视时突觉右侧上下肢不能活动，不能言语，无呕吐，无抽搐，有风湿性心脏病十年。最可能的诊断是 0

- A、脑出血
- B、TIA
- C、脑血栓形成
- D、脑栓塞
- E、蛛网膜下腔出血

【答案】： D

17、电动吸引器吸痰每次插入导管吸引不超过 0

- A、5s
- B、10s
- C、15s
- D、20s
- E、25s

【答案】： C

18、下列哪项不是高危药品 0

- A、10%氯化钾
- B、10%葡萄糖酸钙
- C、胰岛素
- D、肾上腺素

【答案】： B

19、中暑时最容易发生肌肉痉挛的是 0

- A、腹直肌
- B、腓肠肌
- C、胸大肌
- D、咀嚼肌
- E、面肌

【答案】： B

20、室颤患者，单相波电除颤时选择的能量为 0

A、340J

B、350J

C、200J

D、36J

【答案】： D

21、急性苯巴比妥中毒患者可，用哪种溶液洗胃 0

A、5000 高锰酸钾溶液

B、2%重碳酸溶液

C、牛奶、蛋清水

D、液体石蜡

E、活性

【答案】： A

22、女性，49 岁，多年胃溃疡，近 1 个月胃区疼痛，发病前饱食并饮酒，饭后 12 分钟

突然腹痛，剧如刀割，腹呈板状，来源急诊下一步简单有效的检查方法是 0

A、腹部 X 线检查

B、纤维胃镜

C、腹腔冲洗

D、磁共振

E、B 超

【答案】： A

23、用于动脉出血的止血方法为 0

A、加加压包扎止血法

B、指压止血法

C、屈肢加垫止血法

D、填塞止血法

【答案】： B

24、一次性出血量超过()时可引起全身症状。()

- A、250ml
- B、800ml
- C、400-500ml
- D、600ml
- E、1000ml

【答案】： C

25、2015 心肺复苏指南中胸外按压的频率为 0

- A、至少 80-100 次/分
- B、至少 100 次/分
- C、至少 120 次/分
- D、至少 60-80 次/分
- E、至少 110 次/分

【答案】： B

26、成人心肺复苏时胸外按压的深度为 0

- A、至少胸廓前后径的一半
- B、至少 3cm
- C、至少 5cm
- D、至少 6cm
- E、45cm

【答案】： C

27、男，12 岁，因溺水出现心脏骤停，心电监护示一直线，有双人参与抢救，除如

下哪种抢救措施外，其余措施均可采取 0

- A、胸外按压
- B、人工呼吸
- C、电除颤
- D、心脏起搏

【答案】： D

28、患者，男性，52岁。因车祸致胸腹联合伤，左侧多发性肋骨骨折(连枷)伴大量血气胸；脾破裂伴腹腔内出血。神志清，BP75/46mHg

R38 次/分，心率 126 次/分，律齐，医护人员到达现场后首先要对患者进行哪一项伤情评估 0

- A、意识状态
- B、气道和呼吸情况
- C、进行化验检查
- D、循环情况
- E、仔细的胸部检查

【答案】： B

29、气道异物梗阻患者胸部冲击法用力的部位在患者的 0

- A、胸骨上部
- B、胸骨中部
- C、胸骨下部
- D、剑突部

【答案】： B

30、短时间内出血量超过()时可出现周围循环衰竭。 0

- A 、 500ml
- B 、 800ml
- C、 1200ml
- D、 1000ml
- E、 2000ml

【答案】： D

31、休克的临床表现有 0

- A、脉搏细弱
- B、大汗淋漓
- C、口唇发绀
- D、血压下降
- E、以上都是

【答案】： E

32、成人心肺复苏时打开气道的最常用方式为 0

- A、仰头举颏法
- B、双手推举下颌法
- C、托颊法
- D、环状软骨压迫法
- E、托颈法

【答案】： A

33、患者有规律呼吸几次后，突然停止呼吸，间隔一个短时间后又开始呼吸，周而

复始。此种呼吸和呼吸暂停交替出现的现象称为 0

- A、潮式呼吸(陈施呼吸)
- B、深度呼吸(库斯莫呼吸)
- C、叹息呼吸
- D、间断呼吸(毕奥呼吸)
- E、蝉鸣式呼吸

【答案】： D

34、有机磷农药中毒最早出现的临床表现是 0

- A、平滑肌痉挛和腺体分泌增加
- B、全身肌肉发生强直性痉挛
- C、头痛、头晕、乏力
- D、共济失调
- E、谵妄、意识障碍

【答案】： A

35、补充液体

- B、治疗原发病
- C、改善通气
- D、使用激素
- E、提高吸氧浓度

【答案】： C

36、判断甲状腺功能亢进程度的主要依据是 0

- A、体温、呼吸
- B、血压、脉搏
- C、体重、食欲
- D、突眼程度
- E、睡眠时间

【答案】： B

37、气管插管的适应症为 0

- A、颈椎骨折脱位
- B、主动脉瘤压迫气管
- C、喉头水肿
- D、呼吸道分泌物过多

【答案】： D

38、抢救溺水病人的第一步是 0

- A、倒出呼吸道内及胃内的积水
- B、立即进行口对口人工呼吸
- C、胸外心脏
- D、迅速清除口鼻内泥沙污泥
- E、应用抗生素预防感染

【答案】： D

39、救治中毒的原则错误的是 0

- A、促速毒物的排泄
- B、尽早使用特效解毒剂
- C、立即终止机体与毒物的接触
- D、毒物不明确的先诊断再抢救

【答案】： D

40、患者，男性，30岁。 一小时前5米高处坠落，由同事送至医院，根据创伤机制

能量来源分类，海创伤能量成分为 0

- A、热力学能量
- B、电力学能量
- C、机械能量(

√)

- D、化学能量
- E、放射学能量

【答案】： C

41、患者，女性，40岁，车祸时头部受伤，出现头痛、呕吐而急诊入院。为预防脑水肿，降低颅内压，应采取的体位是0

- A、端坐卧位
- B、头高足低位
- C、半坐卧位
- D、头低足高位
- E、中凹卧位

【答案】： B

42、对蛛网膜下腔出血病因的诊断，最具有意义的辅助检查是0

- A、脑脊液检查
- B、脑血管造影
- C、脑部 Ct 检查
- D、脑部 MRI 检查
- E、血常规

【答案】： B

43、见尿补钾要求成人每小时尿量不少于()

- A、10ml
- B、30ml
- C、50ml
- D、70ml
- E、90ml

【答案】： B

44、中毒时最首要的处理是 0

A、对症治疗

B、

使用抗生素

- C、立即终止接触毒药
- D、使用特效解毒药
- E、清除进入人体的毒药

【答案】： C

45、初期复苏所讲 ABC 中，通常 A 是指 O

- A、开放气道
- B、口对口(鼻)人工呼吸
- C、胸外心脏按压
- D、药物治疗
- E、病情观察

【答案】： A

46、急性巴比妥类药中毒时最主要的并发症和致死原因是()

- A、呼吸和循环衰竭
- B、中毒性休克
- C、大出血
- D、急性肾衰竭
- E、急性肝衰竭

【答案】： A

47、患者，男性，3岁，因呕血黑便来院就诊，神志清楚，面色苍白，血压 80/50mf。

考虑病人血容量不足，应输入的溶液是 O

- A、10%葡萄糖
- B、脂肪乳
- C、20%甘露醇
- D、中分子右旋糖酐
- E、浓缩白蛋白

【答案】： D

48、呼吸性酸中毒应先处理的问题是 0

- A、控制感染
- B、促进咳痰
- C、单纯高浓度吸氧
- D、给予碱性液体
- E、解除呼吸道梗阻，改善换气

【答案】： E

49、关于心肺复苏，错误的是?0

- A、频率 100-120 次/分
- B、深度 5-6cm
- C、部位为胸骨下部
- D、按压通气比为 30:2

【答案】： C

50、纠正重症酸中毒时，根据二氧化碳结合力和 FH 值应给予 0

- A、甘露醇
- B、碳酸氢钠
- C、葡萄糖
- D、氯化钠
- E、转化糖

【答案】： B

51、脑出血患者降低颅内压，控制脑水肿时应使用 0

- A、复方氯化钠
- B、碳酸氢钠
- C、甘露醇
- D、葡萄糖
- E、氯化钠

【答案】： C

52、慢性特发性血小板减少性紫癜最常见于 0

- A、婴幼儿
- B、青少年
- C、青年女性
- D、青年男性
- E、中年人

【答案】： C

53、高血压分为几级 0

- A、1 级
- B、2 级
- C、3 级
- D、4 级

【答案】： C

54、冠心病猝死的原因多为 0

- A、窒息
- B、脑梗死
- C、肺梗死
- D、心脏破裂
- E、严重的心律失常

【答案】： E

55、对火灾抢救出来的伤员，应首先 0

- A、给予充足的饮食再送医院
- B、询问火灾原因
- C、采取各种适当的方法进行现场救护再送医院
- D、得到亲友的陪伴在进行抢救治疗

【答案】： C

56、男性，22岁，右胸刺伤2小时，创口与胸腔相通，患者极度呼吸困难，首要的急救措施是)

- A、迅速封闭胸壁伤口
- B、立即手术
- C、输血，输液
- D、胸腔闭式引流
- E、给氧，气管插管

【答案】： A

57、左心衰最严重的表现是 0

- A、心悸、气短
- B、咳嗽咳痰增多
- C、肺水肿
- D、夜间阵发性呼吸困难
- E、心律失常

【答案】： C

58、属于骨折早期并发症的是 0

- A、血管神经损伤
- B、关节僵硬
- C、创伤性关节炎
- D、缺血性肌挛缩
- E、延迟愈合

【答案】： A

59、在车祸伤现场，作为奔向伤员的现场急救人员，应如何正确向伤员喊话?0

- A、大声呼喊伤员的名字，确定其是否能活动和反应
- B、大声喊出自己是来营救的急救人员，让伤员放心
- C、大声普告伤员不可随意活动，等待急救的处理
- D、大声报出自己名字，让伤员放心

E、不向伤员戚话，该处理什么就做什么措施

**【答案】：** C

60、患者，男性，23岁，踝关节扭伤6小时，局部肿胀、疼痛明显，需进行冷敷，其目的是()

- A、促进末梢循环
- B、促进炎症的消散
- C、促进炎症的局限
- D、减轻局部出血、疼痛
- E、使血管扩张，减轻深部组织充血

【答案】： D

61、急性腹痛患者，既往有节律性上腹痛病史，此次发病前暴饮暴食后，突然出现腹上区剧烈疼痛，腹膜刺激征明显，x线显示膈下游离气体，此患者可能为()

- A、急性胃肠炎
- B、上消化道穿孔
- C、肠梗阻
- D、肠系膜动脉血栓
- E、消化道溃疡

【答案】： B

62、EC手法E的作用是()

- A、触摸颈动脉
- B、按压颈部
- C、固定面罩
- D、开放气道

【答案】： D

63、休克时正确的补液原则是()

- A、补液“宁多勿少”
- B、需多少补多少
- C、补充丧失的部分液体和当天继续丧失的液体

D、失多少补多少

E、如血压正常不必补液

**【答案】：** B

64、腹部检查下列哪项错误 0

- A、振水音见于幽门梗阻
- B、肋下扪及肝脏提示肝大
- C、脾脏正常时不能扪及
- D、肠鸣音消失可见于肠麻痹
- E、腹主动脉搏动正常人可触到

【答案】： B

65、以上哪种情况应禁忌洗胃 0

- A、急性有机磷农药中毒
- B、急性安定中毒
- C、 飘药中毒
- D、强酸、强碱中毒
- E、食物中毒

【答案】： D

66、下列哪项对高钾血症患者兼用 0

- A、等渗盐水
- B、10%葡萄糖液
- C、右旋糖酐
- D、林格氏液
- E、碳酸氢钠

【答案】： D

67、抢救病人中护士进行的工作下列哪项不正确 0

- A、口头医嘱复诵后再执行
- B、用完的空安瓿应及时处理
- C、抢救后应及时请医生补写医嘱
- D、抢救记录字迹清晰及时准确
- E、医生未到时可先建立静脉通道

【答案】： B

68、细带包扎顺序原则上应为 0

- A、从上向下，从左向右，从远心端向近心端
- B、从下向上，从右向左，从远心端向近心端
- C、从下向上，从左向右，从远心端向近心端
- D、从下向上，从左向右，从近心端向远心端

【答案】： C

69、火灾急救处理“三防”是指 0

- A、防休克、防中毒、防窒息
- B、防窒息、防跳楼、防奔跑
- C、防休克、防感染、防中毒
- D、防休克、防窒息、防感染

【答案】： D

70、患者男性，45 岁。护士为其测得的血压值为 145\95mmHg,该患者的血压属于

0

- A、理想血压
- B、正常血压
- C、临界高血压
- D、高血压
- E、单纯收缩期高血压

【答案】： D

71、以下说法中哪一条可能不正确()

A、肺脏在正常时含有足够的氧，在呼吸停止后能防止严重的血氧不饱和达 30 秒

左右；

B、单纯施行胸外心脏按压的患者存活率明显高于未接受 CPR 者；

C、在 SCA 导致心搏骤停早期，即使不通气，单纯胸外心脏按压可能也足以维持机

体基本的通气要求；

D、双人实行 CPR 时，应按照 15:2 的按压通气比进行。

E、双人实行 CPR 时，应按照 30:2 的按压通气比进行。

**【答案】：** D

72、常用的晶体溶液，不包括下列哪项 0

- A、0.9%NaCl
- B、50%葡萄糖溶液
- C、4%NaHCO<sub>3</sub>
- D、林格氏液

【答案】： B

73、抢救时胸外心脏按压有效的标志是 0

- A、颈动脉搏动
- B、股动脉搏动
- C、肱动脉搏动
- D、颈、股动脉搏动
- E、颈、肱动脉搏动

【答案】： D

74、热痉挛时最易发生痉挛的肌肉是 0

- A、腹直肌
- B、胸大肌
- C、肱二头肌
- D、腓肠肌

【答案】： D

75、高钾时心电图的变化正确的是 0

- A、S-T 段下降
- B、T 波高尖，PR 间期延长
- C、出现 U 波
- D、QRS 间 缩 短 ， QT 时间延长
- E、T 波宽而低平，重者 T 波倒置

【答案】： B

76、左侧心力衰竭患者的脉象改变 0

- A、奇脉
- B、洪脉
- C、交替脉
- D、水冲脉
- E、细脉

【答案】： C

77、下列各组药物中，可经气管内给予的是 0

- A、肾上腺素、阿托品、胺碘酮
- B、阿托品、心律平、肾上腺素
- C、利多卡因、异搏定、5%碳酸氢钠
- D、纳洛酮、西地兰、阿托品
- E、肾上腺素、阿托品、利多卡因

【答案】： E

78、男性，30岁。车祸伤现场发现左股部伤口有大量鲜血涌出，此时最先应检查的是 0

- A、触诊足背和胫后动脉
- B、检查肢体感觉
- C、检查膝腱或跟腱反射
- D、足部主动活动有无缺失
- E、左下肢主动活动有无缺失

【答案】： A

79、患者男性，45岁。炎热夏天在外高空作业3小时出现大汗、口渴、头晕、胸闷。该病人可能出现了 0

- A、先兆中暑
- B、轻度中暑
- C、热痉挛

D、日射病

E、热射病

**【答案】：** A

80、发生火灾逃生时，错误的选项是 0

- A、走安全通道
- B、用湿毛巾捂住口鼻
- C、最低姿势匍匐前进
- D、乘坐电梯

【答案】： D

81、下列止血方法中，最后在万不得已的情况下选用的是 0

- A、指压止血
- B、加垫屈肢止血
- C、填塞止血
- D、止血带止血
- E、穴道止血

【答案】： D

82、属于闭合性创伤的是 0

- A、擦伤
- B、震荡伤
- C、切削伤
- D、撕脱伤
- E、火器伤

【答案】： B

83、对清除肠内毒物有积极意义的洗胃时限是 0

- A、食物中毒 3 小时内
- B、食物中毒 4 小时内
- C、食物中毒 6 小时内
- D、食物中毒 8 小时内
- E、食物中毒 10 小时内

【答案】： C

84、急性 CO

中度中毒时，血液 HbCo 浓度为)

- A、10-30%
- B、30-50%
- C、>50%
- D、50-70%
- E、70%以上

【答案】： B

85、某日护士小张正在急诊室工作，突然闯进一位怒气冲冲的患者家属，叫嚷着

要找医院领导。这时小张应该 0

- A、制止患者家属愤怒的发泄
- B、直接交给上级领导处理
- C、主动倾听，了解分析患者家属愤怒的原因
- D、对其不理不睬，直接回避
- E、对其愤怒行为给予批评

【答案】： C

86、患者男性，46 岁。诊断为“上消化道出血”收住院，为明确出血原因，首选的  
检查方法是)

- A、大便隐血试验
- B、X 线钡剂造影
- C、内镜检查
- D、血常规检查
- E、B 超检查

【答案】： C

87、患者，男，70 岁。胸痛心悸伴晕厥 1 次。体检示： BP140/80mmHg  
HR72 次/分，  
早搏 2—3 次/分。收入

ICU后，心电监护见室颤。拟使用电除颤，下列那一项是首次双向波除颤最常用的能量0

- A、100J
- B、200J
- C、300J
- D、150J
- E、360J

【答案】： B

88、下面措施中，最能有效改善早期肺气肿症状的是0

- A、促进痰液排出
- B、保证睡眠质量
- C、去除外界刺激因素
- D、呼吸功能锻炼
- E、处理并发症

【答案】： D

89、抢救地震幸存者时，要先使其0

- A、全身都暴露出来，以便检查受伤情况
- B、手脚暴露出来，以便协助抢救
- C、头部暴露出来，并迅速清除口鼻内的灰土，防止窒息
- D、胸部暴露出来

【答案】： C

90、以下影像学检查结果需报告危急值，除外的是0

- A、自发性气胸
- B、外伤性膈疝
- C、纵隔摆动
- D、宫外孕破裂大出血
- E、大量心包积液合并心包填塞

【答案】： A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/927034054114006135>