

2022年-2023年执业药师之西药学综合知识与技能 模考模拟试题(全优)

单选题（共50题）

1、多数抗过敏药物慎用于（）

- A. 胃溃疡患者
- B. 高脂血症患者
- C. 慢性鼻炎患者
- D. 前列腺增生老年患者
- E. 甲状腺功能减退者

【答案】 D

2、病例系列研究试验结果属于循证医学证据级别的

- A. 1级证据
- B. 2级证据
- C. 3级证据
- D. 4级证据
- E. 5级证据

【答案】 D

3、有关尿酮体和尿肌酐的叙述正确的是

- A. 尿酮体包括乙酰乙酸、 β -丁酸、丙酮，是体内糖氧化的中间产物
- B. 酮体在肾脏产生，在血液中循环
- C. 如酮体产生的速度小于组织的利用速度，则血液中的酮体增加出现酮血症
- D. 尿肌酐是体内肌酸代谢的最终产物，是脱水缩合物

E. 人体每日的肌酐排出量变化比较大

【答案】 D

4、为氧化剂，不能用于乐果中毒的洗胃液是

A. 1：5000 高锰酸钾

B. 活性炭混悬液

C. 淀粉溶液

D. 3%鞣酸溶液

E. 生理盐水

【答案】 A

5、患者男,9岁入院诊断为急性淋巴细胞白血病,临床计划鞘内注射药物预防中枢白血病,宜选用的药物是()

A. 亚叶酸钙

B. 维生素 B6

C. 甲氨蝶呤

D. 长春新碱

E. 地塞米松

【答案】 C

6、可能影响儿童骨骼发育的药物是()

A. 复方磺胺甲噁唑

B. 头孢克洛

C. 诺氟沙星

D. 阿莫西林

E. 华法林

【答案】 C

7、以下药物中，可引起白细胞计数降低的药物为

A. 埃索美拉唑

B. 法莫替丁

C. 铝碳酸镁

D. 枸橼酸铋钾

E. 莫沙必利

【答案】 C

8、发挥局部作用的栓剂是

A. 阿司匹林栓

B. 盐酸克伦特罗栓

C. 吡哌美辛栓

D. 甘油栓

E. 双氯芬酸钠栓

【答案】 D

9、如果 ACEI 引起干咳可

A. 联用他汀类

B. 给予硫酸亚铁

C. 慎用甲基多巴

- D. 停用 ACEI 或减量
- E. 麻黄碱、萘甲唑啉滴鼻勿过量

【答案】 B

10、关于 II 期临床试验的正确说法是

- A. 试验样本数多发病不少于 300 例，其中主要病种不少于 100 例
- B. 试验样本数多发病不少于 300 例，其中主要病种不少于 50 例
- C. 试验样本数多发病不少于 300 例，其中主要病种不少于 200 例
- D. 试验样本数多发病不少于 500 例，其中主要病种不少于 100 例
- E. 试验样本数多发病不少于 500 例，其中主要病种不少于 200 例

【答案】 A

11、李女士，40 多岁，来药店咨询皮肤瘙痒用药。经询问和查看后得知：李女士手心皮肤干燥、脱皮，没有破裂，没有水疱和渗出（无感染征象），瘙痒严重，尤其是夜间。自述症状在逐渐加重，之前有过类似症状，但都很轻微。进一步询问得知，她最近开始在餐厅厨房工作，每天需要清洗大量碗筷。

- A. 地西洋
- B. 氯苯那敏
- C. 唑吡坦
- D. 文拉法辛
- E. 布洛芬

【答案】 B

12、应将该药倒入 50ml 温水中充分稀释，摇匀服用，可用于 IBS 患者止泻的药物是

- A. 蒙脱石散
- B. 匹维溴铵
- C. 环孢素 A
- D. 地芬诺酯
- E. 巴柳氮

【答案】 A

13、老年女性,心功能衰竭,服用呋塞米及螺内酯片,正确的使用方法是()

- A. 清晨服用
- B. 用温水调服
- C. 应同时碱化尿液
- D. 舌下含服
- E. 睡前服用

【答案】 A

14、硫酸镁用于救治中毒导泻,适宜

- A. 口服给药
- B. 吸入给药
- C. 肌肉注射
- D. 直肠给药
- E. 皮下注射

【答案】 A

15、少数患者在口服时可出现前庭神经紊乱(如头晕、眩晕)的痤疮治疗药是

- A. 维 A 酸
- B. 过氧化苯甲酰
- C. 米诺环素
- D. 口服短效避孕药
- E. 泼尼松

【答案】 C

16、患者，男，32岁，因细菌性扁桃体炎口服阿莫西林胶囊，出现全身瘙痒。立即停药，无特殊治疗，患者症状逐渐好转，未再给阿莫西林胶囊治疗，该ADR的因果关系评价结果是（ ）。

- A. 肯定
- B. 很可能
- C. 可能
- D. 可能无关
- E. 无法评价

【答案】 B

17、（2021年真题）影响药物治疗有效性的因素不包括（ ）

- A. 给药途径
- B. 药品价格
- C. 药物相互作用
- D. 患者的病生理状态
- E. 给药时间

【答案】 B

18、用药咨询是药师应用所掌握的药学知识和药品信息，承接公众对药物治疗和合理用药的咨询服务，对临床合理用药有关键性作用。根据药物咨询对象的不同，可以将其分为患者、医师、护士和公众的用药咨询。

- A. 利巴韦林可致畸与肿瘤
- B. 阿昔洛韦可致急性肾衰竭
- C. 替加色罗存在心绞痛风险
- D. 地高辛用于肾功不全患者
- E. 含钆造影剂用于肾功不全者

【答案】 D

19、减少因人员不足引致忙乱无序而带来的调配差错，是针对药品调配环节防范措施中的

- A. 及时沟通
- B. 保证足够的人力配备
- C. 环境整齐、安静
- D. 规范操作、坚持核对
- E. 掌握选择正确药物的知识与信息

【答案】 B

20、患者，女，55岁，因“反复发作胸骨后疼痛2年，伴反酸、胃灼热、间断积食”来诊，食管测压提示食管下段括约肌压力小于6mmHg，结合胃镜检查结果，临床诊断为胃食管反流病。医师处方：奥美拉唑20mg bid 强化抑酸治疗。

- A. 戒烟酒
- B. 餐中多饮水
- C. 控制体重
- D. 避免高脂饮食

E. 抬高床头

【答案】 B

21、易经乳汁分泌的药物特性是

A. 蛋白结合率高

B. 弱酸性

C. 脂溶性高

D. 分子量大

E. 极性高

【答案】 C

22、某患者，女性，28岁，近半年出现面色苍白、头晕、乏力，近日头晕加重，并出现心慌、气短，到医院就诊，血常规检查示Hb<90g/L。

A. 睡前

B. 餐前

C. 餐后

D. 清晨

E. 两餐间

【答案】 C

23、患者女，56岁，既往有高血压、高脂血症病史，长期服用依那普利片、阿托伐他汀钙片。现因上腹痛2周，伴黑便数日就诊。患者自诉3周前因膝关节痛，服用布洛芬，疼痛未缓解，自行加用萘普生。胃镜检查显示：胃窦小弯侧有一约7mm溃疡，幽门螺杆菌（Hp）阳性。肾功能未见异常

A. 埃索美拉唑（艾司奥美拉唑）+阿莫西林+克拉霉素

- B. 埃索美拉唑（艾司奥美拉唑）+枸橼酸铋钾+阿莫西林+甲硝唑
- C. 埃索美拉唑（艾司奥美拉唑）+枸橼酸铋钾+阿莫西林+克拉霉素
- D. 埃索美拉唑（艾司奥美拉唑）+枸橼酸铋钾+克拉霉素+左氧氟沙星 A
- E. 埃索美拉唑（艾司奥美拉唑）+枸橼酸铋钾+克拉霉素+甲硝唑

【答案】 B

24、医师咨询“他汀类药物合用伊曲康唑或环丙沙星等”，属于

- A. 禁忌证
- B. 新药信息
- C. 给药途径
- D. 药物相互作用
- E. 药品不良反应

【答案】 D

25、容易引湿的药物是

- A. 胃蛋白酶
- B. 牛痘菌苗
- C. 阿扑吗啡
- D. 青霉素类
- E. 硫酸钠

【答案】 A

26、主要侵犯生殖器、肛门等部位及新生儿的是（单纯疱疹病毒的分型）

- A. HSV- I 型

- B. HSV-II 型
- C. HSV-III型
- D. HSV-IV 型
- E. HSV-V 型

【答案】 B

27、新生儿体内水溶性药物排出较慢、容易中毒，其主要机制是患儿总体液量占体重的

- A. 80%~85%
- B. 75%~80%
- C. 70%~75%
- D. 65%~70%
- E. 60%~65%

【答案】 B

28、患儿，男，3岁半，身高95cm，体重16kg一天前开始发热，20h左右出现腹泻，约3h一次大便，量少，黄色黏液便，呕吐1次。检查结果：体温38.8℃，脉搏118次/分，呼吸28次/分，出现轻微脱水症状，白细胞计数 $18.5 \times 10^9/L$ （参考值 $4.0 \times 10^9/L$ ~ $10.0 \times 10^9/L$ ），粪便镜检可见红、白细胞。

- A. 药用炭可以吸附细菌和毒素，可与微生态制剂同时服用
- B. 腹泻可致电解质丢失，故需特别注意补充电解质
- C. 益生菌应避免与小檗碱、鞣酸蛋白同时服用
- D. 首选口服补液，必要时静脉补液
- E. 适时使用微生态制剂

【答案】 A

29、属于 5 α 还原酶抑制剂的是

- A. 氟他胺
- B. 雌三醇
- C. 普适泰
- D. 依立雄胺
- E. 特拉唑嗪

【答案】 D

30、热应激时液体丢失所致的以有效循环血容量不足为特征的临床综合征是

- A. 热射病
- B. 热痉挛
- C. 热衰竭
- D. 休克
- E. 骨髓抑制

【答案】 C

31、血管紧张素 II 受体阻断剂

- A. 缬沙坦
- B. 氢氯噻嗪
- C. 依那普利
- D. 氨氯地平
- E. 美托洛尔

【答案】 A

32、最常见的急性肾盂肾炎致病菌是

- A. 葡萄球菌
- B. 粪肠球菌
- C. 大肠埃希菌
- D. 变形杆菌
- E. 白色念珠菌

【答案】 C

33、患者男性，45岁，反复发作夜间呼吸困难1个月，加重1天就诊。体格检查：血压180/110mmHg，呼吸急促，双肺散在哮鸣音，双肺底细湿啰音，心率130次/分。

- A. 吗啡
- B. 氨茶碱
- C. 泼尼松
- D. 痰液稀释剂
- E. 止咳糖浆

【答案】 B

34、选择药物的首要标准是药物治疗的

- A. 安全性
- B. 有效性
- C. 经济性
- D. 适宜性
- E. 规范性

【答案】 B

35、属于抗酸药的是

- A. 哌仑西平
- B. 替普瑞酮
- C. 三硅酸镁
- D. 奥美拉唑
- E. 溴丙胺太林

【答案】 C

36、良性前列腺增生症老年患者应用 α_1 肾上腺素能受体阻断治疗时可能导致的不良反应是()

- A. 体位性低血压
- B. 尿潴留
- C. 干咳
- D. 乳腺增生
- E. 前列腺特异性抗原(PSA)水平升高

【答案】 A

37、用药期间禁止饮酒，否则可能引起眩晕、倦怠、嗜睡、视物不清等“双硫仑样反应”的药物是

- A. 头孢哌酮
- B. 卡马西平
- C. 左氧氟沙星
- D. 特拉唑嗪

E. 普米克都保

【答案】 A

38、血栓性疾病患者实施抗凝治疗，应该控制国际标准化比值为

A. 2.0

B. >1.5

C. <0.8

D. 0.8~1.5

E. 0.8~2.0

【答案】 D

39、（2018年真题）患者，男，16岁，因急性细菌性扁桃体炎使用青霉素钠治疗，用药前进行青霉素皮试。关于青霉素皮试液浓度和给药方法的说法正确的是（ ）

A. 浓度 5000U/ml，皮内注射 0.1ml

B. 浓度 5000U/ml，肌肉注射 0.1ml

C. 浓度 500U/ml，皮内注射 0.1ml

D. 浓度 500U/ml，肌肉注射 0.1ml

E. 浓度 500U/ml，皮内注射 1ml

【答案】 C

40、题]可影响幼儿软骨发育，导致承重关节损伤的药物是

A. 阿米卡星

B. 诺氟沙星

C. 头孢唑林

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/928003022024006035>