

眼科基础知识试题库（附答案）

一、单选题（共 70 题，每题 1 分，共 70 分）

1、眼球壁由外到内分为哪三层（ ）

- A、纤维膜，巩膜，视网膜
- B、纤维膜，虹膜，视网膜
- C、纤维膜、角膜，视网膜
- D、纤维膜、虹膜、葡萄膜
- E、纤维膜，葡萄膜，视网膜

正确答案：E

2、哪一种感染性角膜炎起病急骤，发展迅速。（ ）

- A、细菌性角膜炎
- B、真菌性角膜炎
- C、棘阿米巴角膜炎
- D、单纯疱疹病毒性角膜炎

正确答案：A

3、下列有关眼的解剖说法不正确的是（ ）

- A、眼内容物包括房水、晶体和玻璃体
- B、眼包括眼球、视路和附属器
- C、眼球壁外层包括角膜、巩膜和结膜
- D、眼球壁内层包括视网膜
- E、眼球壁中层包括虹膜、睫状体和脉络膜

正确答案：C

4、关于视网膜浅层出血描述错误的是（ ）

- A、多呈线状、条状及火焰状
- B、位于神经纤维层
- C、位于外丛状层和内核层之间
- D、视网膜浅层毛细血管出血
- E、高血压性视网膜病变多见

正确答案：C

5、眼的附属器一般不包括（ ）

- A、眼外肌
- B、眼眶
- C、泪器
- D、眼睑

E、眉毛

正确答案：E

6、虹膜主要由基质层和色素上皮层构成，其基质层是为()

A、疏松的结缔组织和虹膜色素细胞构成

B、基质内扁平细胞和虹膜色素细胞构成

C、致密的色素和瞳孔括约肌构成

D、基质内色素细胞和神经、血管构成

E、基质内扁平细胞和瞳孔开大肌构成

正确答案：A

7、易于引起急性无菌性化脓性炎症的眼内异物是()

A、玻璃异物

B、碎石异物

C、铝异物

D、铜异物

E、铁异物

正确答案：D

8、内睑腺炎切开排脓时，应从()

A、结膜面切开，切口与睑缘平行

B、皮肤面切开，切口与睑缘垂直或平行均可

C、皮肤面切开，切口与睑缘平行

D、皮肤面切开，切口与睑缘垂直

E、结膜面切开，切口与睑缘垂直

正确答案：E

9、患者，女性，50岁，因头痛、恶心、视力下降一天入院，诊断为急性闭角型青光眼，以下治疗不正确的是()

A、口服乙酰唑胺

B、阿托品滴眼液滴眼

C、甘露醇静滴

D、口服苏打片

E、缩瞳

正确答案：B

10、受外展神经支配的肌肉是()

A、上直肌

B、下直肌

- C、外直肌
- D、上斜肌
- E、内直肌

正确答案：C

11、一名 2 个月婴儿因左眼溢泪就诊，挤压泪囊区自泪小点有黏液溢出，下一步的治疗措施正确的是（ ）

- A、左眼热敷
- B、口服抗生素
- C、泪囊切开引流
- D、轻按摩左内眦角数次，并用抗生素眼膏
- E、探通和冲洗左侧泪道

正确答案：E

12、关于细菌性角膜炎的叙述，错误的是（ ）

- A、起病缓慢
- B、常有角膜外伤史
- C、病变早期可出现角膜上皮溃疡
- D、可伴有不同程度的前房积脓
- E、有明显的眼瞳、畏光、流泪、异物感、视力障碍等症状

正确答案：A

13、对单疱病毒性睑皮炎治疗错误的有（ ）

- A、局部保持清洁，防止继发感染
- B、初期可涂龙胆紫溶液或氧化锌糊剂
- C、局部和全身应用糖皮质激素
- D、结膜囊内用抗病毒眼药水或眼膏
- E、晚期结痂后一般无需其他治疗

正确答案：C

14、晶状体的营养主要来自（ ）

- A、房水和视网膜
- B、房水和玻璃体
- C、房水和睫状体
- D、房水和脉络膜
- E、房水和虹膜

正确答案：B

15、有关麻痹性斜视的说法错误的是（ ）

- A、出现复视
- B、眼球运动障碍
- C、两眼不能同时注视一个目标
- D、可有眩晕、步态不稳等全身症状
- E、第一斜视角大于第二斜视角

正确答案：E

16、做完细菌或真菌培养后，应在多长时间内将标本送至化验室（ ）

- A、120min
- B、90min
- C、60min
- D、30min
- E、180min

正确答案：A

17、下面有关玻璃体混浊的叙述正确的是（ ）

- A、是一种症状
- B、是一种体征
- C、以上全部
- D、是一种疾病
- E、以上全不是

正确答案：B

18、眼压是指（ ）

- A、眼眶对眼球的压力
- B、与以上各种压力无关
- C、眼内血管压力
- D、以上各种压力的综合
- E、眼球内容物对眼球壁的压力

正确答案：E

19、色觉敏感度最高的是（ ）

- A、黄斑
- B、赤道部视网膜
- C、鼻侧视网膜
- D、视盘
- E、周边部视网膜

正确答案：A

20、沙眼的病原体属于()

- A、病毒
- B、真菌
- C、细菌
- D、螺旋体
- E、衣原体

正确答案：E

21、泪道系统在没有器质性损伤的情况下，因泪液引流不畅或停滞而引起泪溢的一种表现属于()

- A、各种睑部病变
- B、泪道系统排泄功能不全
- C、泪道狭窄或阻塞
- D、泪小管炎
- E、泪道系统炎症

正确答案：B

22、对视力为光感的受检者，能辨认光感的最远距离应记录为()

- A、光感/30cm
- B、光感/10cm
- C、光感/40cm
- D、光感/20cm
- E、光感/5cm

正确答案：A

23、对急性闭角性青光眼患者的下列护嘱中，错误的是()

- A、多饮水，保持大便通畅
- B、安静卧床休息
- C、少看电视
- D、避免不良刺激
- E、避免长时间低头

正确答案：A

24、眼部氨水烧伤时，冲洗患眼最好用()

- A、0.3%硼酸溶液
- B、生理盐水
- C、林格液
- D、0.37%依地酸钠

E、0.3% 碳酸氢钠溶液

正确答案：A

25、原发性闭角型青光眼禁用()

A、镇静剂 E 高渗剂

B、扩瞳剂

C、碳酸酐酶抑制剂

D、缩瞳剂

正确答案：B

26、获得性展神经麻痹的手术治疗时机一般是选在伤后()

A、即时手术

B、一年以上

C、1 个月以内

D、1 周以内

E、半年以后

正确答案：E

27、弱视眼经验光配镜后最简单、有效和常用的治疗方法是()

A、理疗

B、红色滤光片疗法

C、压抑疗法

D、遮盖疗法

E、后像疗法

正确答案：D

28、关于预防结膜炎传播的主要措施中，哪项不对()

A、新生儿出生后常规应用抗生素眼水

B、医务人员负伤止感染，对于超急性细菌性结膜炎，检查时不用戴防护镜

C、勤洗手、洗脸

D、一眼患病应防另一眼感染

E、严格消毒医疗器械

正确答案：B

29、闭角型青光眼绝对期的治疗是()

A、治疗目的是解除症状

B、控制眼压

C、治疗目的仅在于解除症状，应尽量避免眼球摘除给患者带来的精神痛苦

D、挽救视功能和保护房角是治疗的主要目的

E、治疗目的是阻止病程进展

正确答案：C

30、玻璃体的基本病理改变是()

A、增生性玻璃体视网膜病变

B、玻璃体后脱离

C、玻璃体液化

D、玻璃体浑浊

E、玻璃体炎症反应

正确答案：C

31、一患者因头痛，视力下降入院，考虑青光眼，最基本的检查项目有()

A、眼压，房角，视野、视盘

B、屈光状态，房角，眼球大小，视盘

C、眼压，房水流畅系数，视野，视盘

D、眼球大小，房角，视野，视盘

E、视力，眼压，视野，视盘，房角

正确答案：E

32、下列哪项不是虹膜睫状体炎的体征()

A、角膜后沉着物

B、睫状充血

C、房水混浊

D、瞳孔散大

E、虹膜纹理不清

正确答案：D

33、治疗单眼弱视最主要和最有效的方法是()

A、遮盖

B、视刺激疗法

C、精细目力训练

D、手术矫正

E、压抑疗法

正确答案：A

34、急性闭角型青光眼，解剖变异是()

A、晶体小

- B、角膜大
- C、瞳孔小
- D、眼球大
- E、前房浅，房角窄

正确答案：E

35、外睑腺炎切开排脓时，应从()

- A、皮肤面切开，切口与睑缘平行
- B、结膜面切开，切口与睑缘垂直
- C、结膜面切开，切口与睑缘平行
- D、皮肤面切开，切口与睑缘垂直
- E、皮肤面切开，切口与睑缘垂直或平行均可

正确答案：A

36、正常视乳头为()

- A、乳头实际直径约 1.5mm
- B、位于黄斑裂侧
- C、以上均错
- D、约 1.5mm 直径的圆形淡红色区
- E、乳头呈椭圆形鲜红色

正确答案：D

37、玻璃体积血是由于()

- A、前房角挫伤
- B、玻璃体本身血管破裂
- C、房角后退
- D、睫状体、视网膜或脉络膜的血管损伤引起
- E、玻璃体变性

正确答案：D

38、会导致突然视力下降但不伴有眼痛的疾病不包括下列哪一种疾病()

- A、缺血性视神经病变
- B、视网膜动脉阻塞
- C、开角型青光眼
- D、视网膜脱离
- E、玻璃体出血

正确答案：C

39、下列组织中，不属于葡萄膜的是()

- A、视网膜
- B、睫状体
- C、虹膜
- D、睫状突
- E、脉络膜

正确答案：A

40、最坚固的眼眶壁是：（ ）

- A、所有眶壁相同坚固
- B、外壁
- C、内壁
- D、底
- E、顶

正确答案：B

41、房水从睫状突分泌后进入后房，经过何处进入前房（ ）

- A、虹膜
- B、晶状体
- C、巩膜
- D、结膜
- E、瞳孔

正确答案：E

42、压抑疗法适用于（ ）

- A、中度弱视
- B、重度弱视
- C、轻度弱视
- D、不适用弱视
- E、所有弱视

正确答案：A

43、由玻璃体后脱离引起的视网膜裂孔好发于视网膜的（ ）

- A、下方
- B、上方
- C、鼻侧
- D、后极部
- E、颞侧

正确答案：B

44、冲洗泪道时，水从上泪点流出，其阻塞部位可能在()

- A、以上均是
- B、下泪小管
- C、鼻泪管
- D、下泪小点
- E、以上均不是

正确答案：C

45、黄斑中心凹处的细胞组成是()

- A、只有视锥细胞
- B、多数视杆细胞和少数视锥细胞
- C、等量视锥细胞和视杆细胞
- D、只有视杆细胞
- E、多数视锥细胞和少数视杆细胞

正确答案：A

46、测远视力时，错误的是()

- A、视力表中 4.0 行与眼平行
- B、视力表挂在光线充足的地方
- C、用对数视力表应采用 5 分记录法
- D、先测右眼再测左眼
- E、自上而下依次辨认视标

正确答案：A

47、不能引起并发性白内障的是()

- A、低眼压
- B、高度近视
- C、巩膜炎
- D、视网膜脱离
- E、视网膜色素变性

正确答案：C

48、眼部碱性化学伤时最佳的中和冲洗液是()

- A、3%硼酸
- B、生理盐水
- C、稀醋酸
- D、抗菌素眼药水
- E、3%碳酸氢钠

正确答案：A

49、下面哪种视野不具备青光眼视野损害特征()

- A、弓型暗点
- B、旁中心暗点
- C、颞侧象限缺损
- D、管状视野
- E、环型暗点

正确答案：C

50、角膜溃疡病人，诉排便后右眼部有热水流出感，你认为可能是()

- A、眼球破裂、眼内容物流出
- B、病人因高度紧张，是一种错觉
- C、积于泪囊内的分泌物流出
- D、可能是创口破裂，小血管出血
- E、眼泪

正确答案：A

51、真菌性角膜炎的治疗措施除外下列哪项()

- A、1%阿托品眼药水或眼膏扩瞳
- B、用抗生素防继发细菌感染
- C、忌用皮质类固醇激素
- D、局部应用抗真菌类药物
- E、全身抗真菌药

正确答案：B

52、倒睫是指()

- A、睑缘位置正常，睫毛倒向眼球的一种睫毛位置异常
- B、以上均不正确
- C、睑缘向眼球方向内卷，部分或全部睫毛倒向眼球的一种睫毛位置异常
- D、睑缘位置正常，睫毛倒向眼球的一种眼睑位置异常
- E、睑缘向眼球方向内卷，部分或全部睫毛倒向眼球的一种眼睑位置异常

正确答案：A

53、正视眼摘除晶状体后，眼的屈光状态是()

- A、高度近视
- B、轻度近视
- C、轻度远视
- D、正视

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/935333224121011111>