

基层伤病处置理论考核

一、选择题

1.虽然引起休克的原因不同，但各类休克的共同点都是（ ）[单选题] *

- A.口唇发绀
- B.血压下降
- C.有效循环血量锐减✓
- D.尿量减少
- E.心率加快

2.伤员男，20岁。右小腿软组织挫裂伤3小时，急诊行清创术后，给予静脉滴注头孢噻吩，输液5分钟时，伤员出现胸闷气急、烦躁不安、头晕和面色苍白。检查伤员脉速而弱，最可能诊断（ ）[单选题] *

- A.失血性休克
- B.心源性休克
- C.过敏性休克✓
- D.神经性休克
- E.感染性休克

3.伤员男，30岁，左上腹被汽车撞伤后出现腹痛、恶心、呕吐2小时。查体：T36.2℃，P120次/分，R22次/分，BP70/50mmHg。意识尚清，面色苍白，四肢发凉。全腹有压痛、反跳痛、肌紧张，肠鸣音弱。B超检查：脾包膜连续性中断，局部回声模糊，脾周及腹腔内可见异常液性暗区。最可能的诊断是（ ）[单选题] *

- A.脾破裂合并心源性休克

B.脾破裂合并失血性休克✓

C.脾破裂合并神经性休克

D.脾破裂合并感染性休克

E.脾破裂合并肠破裂

4.伤员男，24岁。背部刀刺伤，2小时后被抬入院。查体:神志清楚，烦躁，诉口渴，皮肤苍白、稍冷，脉搏 110 次/分，收缩压 90~70mmHg，表浅静脉塌陷，伤口仍有少许渗血。最合理的处理是（ ）[单选题] *

A.只需将伤口缝合

B.立即输血浆

C.快速静滴平衡盐溶液同时做好手术准备✓

D.纱布包扎伤口继续观察

E.给予大量升压药物

5.严重烧伤患者休克期出现烦躁不安、血压下降，主要是由于（ ）[单选题] *

A.疼痛

B.中枢神经系统异常

C.血容量不足✓

D.脓毒血症

E.心理因素

6.休克病人的体位一般采用（ ）[单选题] *

A.头高脚低位

B.头低脚高位

C.平卧位

D.头和躯干抬高 $20^{\circ}\sim 30^{\circ}$ ，下肢抬高 $15^{\circ}\sim 20^{\circ}$ ✓

E.侧卧位

7.男性，23岁，因车祸导致四肢多发性骨折，右大腿挤压伤。查体时面色苍白，口渴，脉搏 120 次/分，血压 80/60mmHg，给予紧急扩容，首选液体是（ ）[单选题] *

A.全血

B.血浆

C.10%葡萄糖液

D.右旋糖酐液

E.5%葡萄糖等渗氯化钠溶液✓

8.男，24岁，因交通事故受伤后出现精神兴奋，烦躁不安，出冷汗，心率 100 次/分，脉压缩小，尿量减小。可能的情况（ ）[单选题] *

A.休克可疑

B.休克抑制期

C.已有休克✓

D.尚无休克

E.休克晚期

9.颅脑损伤伤员，经检伤考虑颅内压增高，给予 20%甘露醇溶液降低颅内压，以下输液方法正确的是（ ）[单选题] *

A.快速静推

B.缓慢静滴，防止高渗液产生静脉炎

C.1~2 小时内静滴完 250mL

D.15~30 分钟内静滴完 250mL✓

E.输液速度控制在 60~80 滴/分

10.颅脑外伤后颅内压增高症状明显，检伤后考虑颅内血肿，此时下列哪项诊疗措施最不宜采用() [单选题] *

A.冬眠低温和巴比妥疗法,降低颅脑组织代谢

B.闭式持续性控制性脑室外引流

C.腰穿放出血性脑脊液减压✓

D.气管内插管过度换气呼吸

E.脱水和激素治疗

11.有关颅底骨折，下列哪项错误() [单选题] *

A.颅底 X 线检查可无阳性发现

B.依靠临床体征可以诊断

C.诊断需有脑脊液外漏发生✓

D.单纯颅底骨折以保守治疗为主

E.脑脊液漏无需早期修补

12.某战士颅脑受到撞击后，诊断为脑震荡，可出现() [单选题] *

A.伤员不能描述受伤经过✓

B.昏迷时间常大于 30 分钟

C.神经系统检查一定有病理反射

D.脑脊液常规、生化有异常

E.CT 检查可有阳性表现

13.男，20 岁，高空坠落伤。查体:BP70/50mmHg，HR100 次/分，躁动，双侧瞳孔等大，对光反应阳性，腹腔穿刺抽出未凝血液，头部 CT 检查示左额硬脑膜下血肿，血肿量约 20mL，中线无明显移位。该

病例最佳处理方案 () [单选题] *

- A.立即开颅清除血肿
- B.抗休克治疗的同时行开颅血肿清除术
- C.抗休克治疗的同时先行开腹探查✓
- D.抗休克治疗至血压正常后再行手术
- E.开颅及开腹探查同时进行

14.男性,23岁,一阵剧烈咳嗽后突发胸闷、胸痛,来医院急诊。查体:气管右移,左肺呼吸音消失,叩诊呈鼓音。胸片示左肺被压缩80%,此时应采取主要的治疗措施是 () [单选题] *

- A.剖胸手术
- B.胸腔闭式引流✓
- C.吸氧
- D.穿刺抽气
- E.镇静、止咳

15.男性,26岁,胸部外伤后出现反常呼吸运动,急诊处理为 () [单选题] *

- A.剖胸探查
- B.胸腔闭式引流
- C.诊断性胸穿
- D.胸壁胶布固定
- E.胸壁加压包扎✓

16.男性,28岁,不慎跌倒后诉左侧胸痛,咳嗽时加剧。体格检查:无反常呼吸,左肺呼吸音减弱,无啰音,左侧胸廓前后挤压试验阳性。关于此伤员,下列说法哪项正确 () [单选题] *

- A.诊断以左侧肋骨骨折可能大,好发于第9~12肋

B.诊断以左侧肋骨骨折可能大，好发于第 4~7 肋✓

C.诊断以左侧肋骨骨折可能大，好发于第 1~3 肋

D.若为多根单处肋骨骨折，因肋间肌的牵拉，易发生上下移位

E.若为第 12 肋骨折，性质尤为严重

17.急性阑尾炎最典型的症状是（ ）[单选题] *

A.右下腹疼痛

B.发热

C.转移性右下腹疼痛✓

D.恶心呕吐

E.腹部隐痛

18.急性阑尾炎最常见的重要体征是（ ）[单选题] *

A.右下腹麦氏点压痛✓

B.腹部反跳痛

C.腹肌紧张

D.右下腹包块

E.腹膜刺激征阳性

19.开放性腹部损伤中最容易损伤的脏器是（ ）[单选题] *

A.胃

B.胰腺

C.肝脏✓

D.小肠

E.肾脏

20.闭合性腹部损伤中最容易损伤的脏器是（ ）[单选题] *

A.小肠

B.脾脏✓

C.肾脏

D.胰腺

E.肝脏

21.闭合性腹部损伤时，下列哪项不支持腹腔内脏损伤的诊断（ ）[单选题] *

A.早期出现休克

B.明显腹膜刺激征

C.出现便血

D.肠鸣音活跃✓

E.出现呕血

22.某战士患肾结石，发生肾绞痛时，首选治疗方法（ ）[单选题] *

A.抗感染治疗

B.解痉镇痛✓

C.局部热敷

D.口服中药

E.针灸

23.男，20岁，骨盆被重物挤压伤2小时入院，查体:P 120次/分 BP 80/50mm/Hg。面色苍白，全腹压痛、反跳痛，肌紧张明显，以下腹部为甚。移动性浊音（+）。骨盆X光片:髂骨线性骨折。经补液后，生命体征平稳，但仍无尿，留置尿管仅有50ml尿液流出，淡红色。根据伤员病史、体征，结合辅助检查，腹部内脏损伤可能性最大的是（ ）[单选题] *

- A.肾损伤
- B.膀胱损伤✓
- C.输尿管损伤
- D.直肠损伤
- E.尿道损伤

24.男,20岁,阵发性右侧腰腹部绞痛1天,伴恶心呕吐,无发热,腹痛发作时向右下腹放射伴尿频、尿急、尿痛等症状,查体:腹软,右下腹有压痛,无反跳痛,膀胱区不胀,血WBC正常,尿常规WBC 0~1个/HP,RBC 7~10个/HP,最可能的诊断是() [单选题] *

- A.阑尾炎
- B.肾肿瘤
- C.肾结石
- D.泌尿系感染
- E.右侧输尿管结石✓

25.小腿开放性骨折伤员,查体发现足背动脉搏动弱,下肢麻木后疼痛,初步采取哪种措施() [单选题] *

- A.清创术
- B.减压术✓
- C.包扎
- D.手术复位克氏针固定
- E.骨牵引后行髓内钉固定

26.伤员男性,28岁,摔倒后致左肩关节脱位,X线片未见合并骨折征象,首先应采取哪种处置措施()

[单选题] *

- A.局麻后手法复位✓
- B.局麻后切开复位
- C.全麻后手法复位
- D.切开复位后同时修复关节囊
- E.骨牵引后行外展架固定

27.伤员男性，22岁，投弹训练后致右上肢疼痛、肿胀、功能障碍，查体肱骨成角畸形、异常活动，右手血运及肌力正常，采用哪种初步处置措施（ ）[单选题] *

- A.冰袋冷敷
- B.止痛药止痛
- C.吸氧
- D.抗休克
- E.妥善固定✓

28.伤员男性，25岁，攀爬摔伤后致右手腕疼痛、肿胀、功能障碍，查体手腕部呈枪刺样畸形，右手血运及肌力正常，给予伤员手法复位后，石膏固定前注意（ ）[单选题] *

- A.注射局麻药
- B.消肿
- C.吸氧
- D.掌屈尺偏位✓
- E.屈曲固定

29.桡骨远端骨折伸直型的近端骨折移位方向（ ）[单选题] *

- A.手背侧移位
- B.掌侧移位✓

C.尺侧移位

D.桡侧移位

E.外侧移位

30.下列骨折中最不稳定的类型是（ ）[单选题] *

A.嵌插骨折

B.斜骨折✓

C.青枝骨折

D.横骨折

E.裂缝骨折

31.伤员男性，29岁，右胫腓骨中段闭合骨折后行手法复位石膏外固定24小时，出现患肢持续性剧烈疼痛，进行性加重，此时首先采取的措施应为（ ）[单选题] *

A.予以确切有效的止痛药物

B.立即解除石膏外固定✓

C.抬高患肢以减轻疼痛

D.更换石膏或改用其它的外固定方法

E.局部硫酸镁湿敷

32.伤员男性，23岁，攀爬训练肩部着地，肩部疼痛、肿胀，查体左锁骨无明显移位，X线显示左锁骨骨折，怎样处置（ ）[单选题] *

A.卷式夹板固定3周

B.石膏固定2个月

C.三角巾悬吊2-3周

D.手术切开复位

E.横 8 字固定✓

33.下列哪项不是接触性皮炎的特点 () [单选题] *

A.边界清楚

B.忽起忽消✓

C.无接触物形态一致

D.瘙痒

E.红斑水疱

34.对接触性皮炎首先应采取的措施为 () [单选题] *

A.扑尔敏口服

B.激素乳膏外用

C.脱离过敏环境

D.去除接触物✓

E.呼叫 120

35.下列哪项试验可辅助鉴别接触性皮炎 () [单选题] *

A.皮内试验

B.划痕试验

C.真菌直接镜检

D.斑贴试验✓

E.口服激发试验

36.下列哪项不符合荨麻疹 () [单选题] *

A.起病急

B.忽起忽消

C.恶心呕吐

D.对称分布✓

E.瘙痒性风团

37.关于日光性皮炎防治哪项不对() [单选题] *

A.涂抹防晒霜很重要

B.可选用口服抗过敏药治疗

C.只有暴晒才会发生✓

D.日晒伤可用凉水湿敷

E.可有红斑丘疹等损害

38.关于足癣哪项不符() [单选题] *

A.不会引起严重并发症✓

B.反复发作

C.瘙痒

D.可蔓延至身体各处

E.发病与局部多汗有关

39.足癣继发细菌感染应首先选用哪种药物() [单选题] *

A.达克宁

B.酮康唑

C.皮炎平

D.炉甘石

E.红霉素✓

40.下列哪项不是疥疮的特点() [单选题] *

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/936055042240010043>