

N2 级护理人员理论知识练习题库与答案

1、空气栓塞时听诊心前区有持续、响亮的()样杂音

- A、水泡声
- B、啰音
- C、湿罗音
- D、清音

答案：A

2、通常成人使用双向波电除颤的能量为()

- A、100J
- B、150J
- C、200J
- D、300J
- E、360J

答案：C

3、关节脱位或骨折临床表现为受伤关节或肢体疼痛、()、活动障碍

- A、发热
- B、青紫
- C、皮温低
- D、肿胀

答案：D

4、首次透析采用小面积低通量透析器，透析时间不超过()小时，血流量180ml/min，使尿素氮清除率在30%左右

- A、2
- B、5
- C、3
- D、6

答案：C

5、下列用于高血压病人心血管风险分层的心血管危险因素是()

- A、伴有外周血管疾病
- B、总胆固醇 $>5.5\text{mmol/L}$
- C、糖耐量受损
- D、男性 >65 岁
- E、女性 >55 岁

答案：C

6、齐某,男,82岁。因“重症肺炎”入院治疗。病人诉剧烈胸痛且烦躁不安,血气分析示 PaO₂ 52mmHg。此时,护士给予的护理措施中不妥的是()

- A、卧床休息
- B、饮食补充足够热量、蛋白质和维生素
- C、嘱病人饮水,入量不足者给予静脉补液
- D、给予吸氧
- E、给予吗啡镇痛、镇静

答案: E

7、吸痰管口径的选择要适当,使其既能够将痰液吸出,又不会阻塞气道。成人一般选用()号吸痰管

- A、10-12
- B、10-11
- C、11-13
- D、12-14

答案: D

8、气管切开术和气管插管术常用于解除喉源性呼吸困难、呼吸功能失常或下呼吸道分泌物潴留等所致的()

- A、呼吸困难
- B、呼吸衰竭
- C、呼吸急促
- D、呼吸暂停

答案: A

9、肠造口是指因治疗需要,把一段()拉出腹腔,并将开口缝合于腹壁以排泄粪便或尿液。

- A、肠管
- B、肛门
- C、尿道
- D、输尿管

答案: A

10、预防继发性脊髓神经损伤患者有颈椎损伤时,翻身必须(),勿扭曲或者旋转患者的头部,固定头部的操作者,沿纵轴向上略加牵引,使头、颈随躯干一起缓慢移动。

- A、由双人操作
- B、由三人操作
- C、由四人操作

D、 由三至四人操作

答案： B

11、 标准大气压是指下列哪种条件下物体在单位面积上所承受的压力()

A、 在海平面上温度为 4℃时

B、 在赤道海平面上, 温度为 0℃时

C、 在赤道海平面上, 温度为 4℃时

D、 在纬度为 45° 的海平面上, 温度为 0℃时

E、 在纬度为 45° 的海平面上, 温度为 4℃时

答案： D

12、 萧某, 男, 64 岁。 3 年前因“胃溃疡”行胃次全切除术, 4 天前无明显诱因出现黑便 2 次, 黑便后感乏力、 头晕, 拟“上消化道出血”收入院。 病人出现上消化道出血的可能原因是()

A、 消化性溃疡

B、 急性糜烂出血性胃炎

C、 吻合口溃疡

D、 食管曲张静脉破裂出血

E、 胃癌

答案： C

13、 肝耗氧的主要来源是()

A、 门静脉

B、 肝动脉

C、 上腔静脉

D、 下腔静脉

E、 腹主动脉

答案： B

14、 PICC 导管一般用于()静脉输液治疗, 或用于需要静脉输注高渗性、 有刺激性药物的情况。

A、 1 天以内的短期

B、 1-3 天的中、 短期

C、 7 天以上的中、 长期

D、 10 天以上的中、 长期

答案： C

15、 青少年和运动猝死的最主要病因是()

A、 扩张型心肌病

B、 肥厚型心肌病

- C、 感染性心内膜炎
- D、 急性心包炎
- E、 病毒性心肌炎

答案： B

16、程某,女.60岁。因肝癌并发肝性脑病入院,病情逐渐加重,护士将病人仰卧,头偏向一侧,其目的是为了防止()

- A、 血压降低
- B、 呕吐
- C、 上消化道出血
- D、 污染床单元
- E、 窒息

答案： E

17、导致上消化道出血最常见的病因是()

- A、 肝硬化食管曲张静脉破裂
- B、 急性胃炎
- C、 食管癌
- D、 胃癌
- E、 消化性溃疡

答案： E

18、肾结核最常见的症状是()

- A、 肾积水
- B、 尿频
- C、 肾区疼痛
- D、 潮热、盗汗
- E、 贫血

答案： B

19、白某,男,48岁,诊断为COPD。病人诉咳痰费力,医生拟行纤维支气管镜检查。病人询问护士为什么要做该项检查,下列回答正确的是()

- A、 明确病因及出血部位
- B、 清除粘稠的分泌物
- C、 灌洗支气管肺泡
- D、 局部止血治疗
- E、 引导气管导管进行经鼻气管插管

答案： B

20、静脉注射穿刺成功的指征,哪项除外()

- A、 穿刺入血管
- B、 见回血
- C、 无肿块
- D、 注射药液有阻力

答案： D

21、 王某, 男, 3 岁。 在进餐中突然出现严重呼吸困难, 伴发绀。 急诊初步判断为异物吸入, 则异物最有可能吸入的部位是 ()

- A、 气管
- B、 右主支气管
- C、 左主支气管
- D、 细支气管
- E、 终末细支气管

答案： B

22、 破伤风最早发生强直性痉挛的肌群是

- A、 咽肌
- B、 面肌
- C、 咀嚼肌
- D、 颈背肌
- E、 腹肌

答案： C

23、 黄某, 女, 46 岁, 诊断为“消化性溃疡” 时有上腹疼痛、 反酸, 因饮食不当并发大出血, 此时不会出现 ()

- A、 呕吐
- B、 黑便
- C、 昏厥
- D、 休克
- E、 上腹痛加重

答案： E

24、 李某, 男, 60 岁。 患消化性溃疡 10 余年, 饮酒后出现剧烈上腹部疼痛, 诊断为急性胃穿孔。 首要护理措施为 ()

- A、 立即应用镇痛药
- B、 立即输血
- C、 禁食和胃肠减压
- D、 安慰并陪伴病人
- E、 立即输液

答案：C

25、康复医学是一门()

A、研究残疾人和病人的行为学

B、研究残疾人和病人的社会心理学

C、是一门语言矫治学

D、是一门有关促进病、伤、残者恢复身体、精神和社会生活功能为目标的学科

E、是一门有关促进残疾人恢复的特殊教育学

答案：D

26、单人做胸外心脏按压与人工呼吸次数的比例是

A、2:1

B、5:1

C、4:1

D、30:2

E、6:1

答案：D

27、胡某,男,45岁。近2个月来出现上腹隐痛,餐后加剧,伴有早饱、厌食、乏力,无发热、黄症,体重减轻约5kg,粪便隐血阳性。该病人应考虑的诊断是()

A、慢性胃炎

B、消化性溃疡

C、胃癌

D、胃溃疡出血

E、急性胃炎

答案：C

28、有关急性梗阻性化脓性胆管炎的叙述,哪项是错误的

A、梗阻的原因多是结石、寄生虫或胆管狭窄

B、病人过去可有反复发作的胆管炎史

C、起病急,右上腹绞痛伴高热、寒战、黄疸

D、烦躁、嗜睡、昏迷、血压下降

E、血培养可能阳性,但胆囊一定能触到

答案：E

29、宋某,男,56岁。诊断为慢性肺源性心脏病,血气分析结果示:PaO₂ 53mmHg, PaCO₂ 61mmHg。该病人适宜的氧疗方法是()

A、持续低流量给氧

B、间断低流量给氧

- C、 间断高浓度给氧
- D、 持续中浓度给氧
- E、 持续高浓度给氧

答案： A

30、抢救口服有机磷农药中毒病人洗胃时最常用的洗胃液是

- A、 0.9%氯化钠注射液、温开水
- B、 热开水
- C、 2%碳酸氢钠
- D、 1:5000 高锰酸钾溶液
- E、 5%葡萄糖注射液

答案： A

31、心力衰竭的代偿机制不包括()

- A、 Frank-Starling 机制
- B、 交感神经兴奋性增强
- C、 心肌肥厚
- D、 肾素-血管紧张素-醛固酮系统激活
- E、 心室重塑

答案： E

32、黎某,男,58岁,胃溃疡病史10年,经常怀疑胃部已癌变,故来咨询。下列选项不符合胃溃疡癌变的特点的是()

- A、 上腹痛的规律性消失
- B、 食欲减退
- C、 进行性贫血,消瘦
- D、 粪便隐血持续阳性
- E、 反酸,胃灼热加重

答案： E

33、刘某,女,45岁。诊断为“消化性溃疡”,近来病人感上腹饱胀,疼痛于餐后加重,且反复大量呕吐。病人可能出现的并发症是()

- A、 出血
- B、 穿孔
- C、 癌变
- D、 幽门梗阻
- E、 营养不良

答案： D

34、预防吸痰感染的方法,说法错误的是()

- A、 严格遵守无菌技术操作原则
- B、 吸痰管一次性使用
- C、 加强口腔护理
- D、 吸口、鼻腔及气管内的吸痰，可用同一根吸痰管

答案：D

35、鼻饲时一旦发生误吸，立即停止鼻饲，取头低右侧卧位，吸除气道内吸入物，气管切开者可经气管套管内吸引，然后胃管接()

- A、 负压瓶
- B、 引流袋
- C、 引流器
- D、 正压管

答案：A

36、肌肉注射时为防止针口渗液一次注射量接近()ml

- A、 5
- B、 3
- C、 6
- D、 4

答案：A

37、诊断心肌坏死最特异和敏感的实验室指标是()

- A、 CK-MB
- B、 CK
- C、 LDH
- D、 cTnI 或 cTnT
- E、 AST

答案：D

38、根据约束部位不同可分为手约束法、肢体约束法、()、全身约束法等

- A、 四肢约束法
- B、 肩部约束法
- C、 腹部约束法
- D、 胸部约束法

答案：B

39、林某.男.73岁。因 COPD 伴肺部感染导致肺功能急剧恶化,行气管插管给予机械通气。在现察过程中呼吸机突然发出压力过低报警,最可能的原因是()

- A、 病人咳嗽

- B、 病人痰液过多
- C、 病人痰液黏稠
- D、 输入气体管道扭曲
- E、 气管插管气囊漏气

答案： E

40、 许某, 男, 67 岁。有高血压糖尿病病史。病人突然感觉心前区憋闷, 严重窒息感, 伴有恶心, 呕吐, 出冷汗, 休息和服用硝酸甘油不能缓解。其最可能发生了()

- A、 急性心力衰竭
- B、 急性胰腺炎
- C、 急性胆囊炎
- D、 急性心肌梗死
- E、 急性胃炎

答案： D

41、 主要表现为急性右心功能衰竭: 呼吸困难, 呼吸频率可达()以上, 可出现极度烦躁、 大汗淋漓、 面色青灰以及濒死感

- A、 30 次/分
- B、 20 次/分
- C、 40 次/分
- D、 28 次/分

答案： C

42、 张某, 女, 57 岁, 有胃溃疡病史。近日来上腹部疼痛加剧, 医嘱做粪便隐血试验, 应给病人的菜谱是()

- A、 卷心菜, 五香牛肉
- B、 菠菜、 红烧青鱼
- C、 茭白, 鸡蛋
- D、 油豆腐. 鸡血汤
- E、 青菜、 炒猪肝

答案： C

43、 洗胃时采用(), 头稍低偏向一侧, 确保胃管在胃内, 拔管时反折或夹住胃管出口端以防止反流

- A、 半卧位
- B、 右侧卧位
- C、 平卧位
- D、 左侧卧位

答案：D

44、清洁灌肠前，嘱患者合理有效的饮食肠道准备前()天进无渣流质饮食

- A、 3-5 天
- B、 3-6 天
- C、 2-5 天
- D、 4-5 天

答案：A

45、冯某,男,24岁。腹胀、腹泻伴发热2个月。身体评估:腹肌稍紧张,移动性浊音阳性。结肠镜检查:全结肠连续性炎性改变。小肠钡餐检查:节段性病变。该病人最可能的诊断是()

- A、 肠结核并结核性腹膜炎
- B、 克罗恩病
- C、 淋巴瘤
- D、 溃疡性结肠炎
- E、 结肠癌

答案：A

46、于某,男,68岁。有糖尿病肾病有8年。3天前夜间突发呼吸困难,不能平卧。入院时血压168/102mmHg,心率105次/分,呼吸28次/分,双肺底湿啰音。血尿素氮38mmol/L,血肌酐884 μ mol/L。病人此时最适合的治疗措施是()

- A、 5%碳酸氢钠250ml 静脉滴注
- B、 洋地黄类药物强心
- C、 林格液补充血容量
- D、 50%葡萄糖液100ml 加普通胰岛素10u 缓慢静脉滴注
- E、 血液透析

答案：E

47、对慢性()患者,采用限制性给氧,氧浓度24%,33%,氧流量1—3L/min。

- A、 左心衰竭
- B、 心力衰竭
- C、 呼吸衰竭
- D、 右心衰竭

答案：C

48、尚某,男,45岁。身高165cm,体重82kg。平时偶饮酒,量不多,无厌油,纳差等症状。有高血脂病史,近半年服用降血脂药。身体评估:肝右肋下1指。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/937051000115006042>