

# 内科护理学形成性考核

## 一、选择题

1.咯血直接的致死原因为( ) [单选题] \*

- A.肺不张
- B.肺部感染
- C.窒息✓
- D.情绪紧张
- E.左心衰

2.下列哪项是慢支发生和加重的主要原因( ) [单选题] \*

- A.吸烟
- B.感染✓
- C.粉尘刺激
- D.寒冷
- E.免疫功能减退

3.慢支并发肺气肿时,其主要症状是( ) [单选题] \*

- A.突然出现呼吸困难
- B.逐渐加重的呼吸困难✓
- C.喘息
- D.咳嗽

4.患者男性,50岁,慢性支气管炎、肺气肿病史多年,于阵咳后突然出现呼吸困难,右胸刺痛,逐渐

加重，最可能是（ ）[单选题] \*

- A.急性心肌梗死
- B.慢支急性发作
- C.气胸✓
- D.支气管哮喘
- E.胸腔积液

5.关于缩唇、腹式呼吸的作用机制哪项最恰当？（ ）[单选题] \*

- A.增强吸气力量
- B.增强呼气力量
- C.降低气道内压，延缓小气道的陷闭
- D.增加气道内压，延缓小气道的陷闭✓
- E.增强膈肌收缩力

6.支气管哮喘最典型的临床表现是（ ）[单选题] \*

- A.留清鼻涕，连打喷嚏
- B.发作性吸气性呼吸困难
- C.混合性呼吸困难
- D.端坐呼吸
- E.发作性呼气性呼吸困难✓

7.治疗肺炎球菌性肺炎，停用抗生素的指标一般是（ ）[单选题] \*

- A.体温降至正常后 3 天✓
- B.体温降至正常后 1 周
- C.体温降至正常后 2 周

D.症状体征完全消失

E.X 线示炎症阴影完全消失

8.长期卧床的心力衰竭病人，其水肿最宜出现的部位是（ ）[单选题] \*

A.胫前

B.踝部

C.腹部

D.腰骶部✓

E.眼睑

9.左心功能不全病人出现呼吸困难的主要原因是（ ）[单选题] \*

A.痰液堵塞气道

B.支气管痉挛

C.左肺受到扩大的心脏的压迫

D.肺循环淤血✓

E.神经反应

10.护士在发给心衰患者地高辛之前，应该先数心率，若心率少于多少次则不能给药（ ）[单选题] \*

A.100 次/分

B.90 次/分

C.80 次/分

D.70 次/分

E.60 次/分✓

11.急性肺水肿患者咳出的痰液特点是（ ）[单选题] \*

A.粉红色泡沫样痰✓

- B.黄粘痰
- C.铁锈色痰
- D.痰液有臭味且分层
- E.灰绿色痰

12.心动过缓患者应避免用力排便等屏气用力动作，其目的是（ ）[单选题] \*

- A.防止血压增高
- B.防止血压降低
- C.防止诱发心动过速
- D.防止加重心动过缓✓
- F.节省体力

13.心脏听诊若闻及心尖部舒张期隆隆样杂音提示（ ）[单选题] \*

- A.二尖瓣狭窄✓
- B.二尖瓣关闭不全
- C.主动脉瓣狭窄
- D.主动脉瓣关闭不全
- E.三尖瓣狭窄

14.发生高血压急症时需快速降压，常用药物是（ ）[单选题] \*

- A.硝酸甘油舌下含服
- B.口服呋塞米(速尿)
- C.硝普钠静脉滴注✓
- D.甘露醇快速静滴
- E.地高辛口服

15.出现黑便其出血量至少应是( ) [单选题] \*

A.5ml

B.30ml

C.50ml✓

D.100ml

E.400ml

16.与消化性溃疡发病相关的损害性因素中，占主导的是( ) [单选题] \*

A.幽门螺杆菌感染

B.饮食失调

C.吸烟

D.精神因素

E.胃酸、胃蛋白酶✓

17.下列哪项为肝硬化患者肝功能失代偿期的典型表现( ) [单选题] \*

A.食欲不振

B.恶心、呕吐

C.腹水✓

D.乏力

E.肝掌

18.肝硬化患者感染后易诱发肝性脑病的原因( ) [单选题] \*

A.肝脏负荷加重✓

B.电解质失衡

C.中性粒细胞功能下降

D.脑缺血缺氧

E.抑制大脑功能

19.肾性水肿一般先发生部位 ( ) [单选题] \*

A. 双下肢

B.胸腔积液

C.腹水

D. 心包积液

E.眼睑及面部✓

20.急性肾炎临床首发症状多为 ( ) [单选题] \*

A.少尿、无尿

B. 高血压

C.心力衰竭 (全心衰)

D.水肿 血尿✓

E 高血压脑病症状

21.慢性肾炎患者 24 小时尿蛋白常为 ( ) [单选题] \*

A. <1g/d

B. >150mg/d

C.<2g/d

D. 1~2g/d

E. 1~3g/d✓

22.慢性肾炎患者给予低蛋白低磷饮食治疗目的是 ( ) [单选题] \*

A.减轻肾性水肿

B.控制高血压

C.预防低钾血症

D. 预防高钠血症

E.减轻肾小球内高压、高灌注及高滤过状态✓

23.下列哪项是原发肾病综合征主要并发症（ ）[单选题] \*

A.血栓及栓塞

B.动脉粥样硬化

C.肾功能不全

D. 感染✓

E.心绞痛、心肌梗死

24.急性肾衰少尿或无尿期易引起高血钾症，其危害是（ ）[单选题] \*

A.全身水肿

B.体重增加

C.高血压

D. 急性左心衰

E.抑制心肌细胞易致严重心率失常✓

25.慢性肾衰临床表现哪项是最早最突出症状（ ）[单选题] \*

A. 急性左心衰

B. 尿毒症性心肌炎

C.代谢性酸中毒呼吸深而长

D.胃肠道症状如食欲不振、恶心、呕吐等✓

E. 高血压

26.贫血是尿毒症必有症状，引起贫血的原因哪项是重要的（ ）[单选题] \*

A.毒素使红细胞寿命缩短

B.铁、叶酸缺乏

C.严重呕血、便血

D.肾产生红细胞生成素减少✓

E.代谢产物抑制骨髓造血

27.急性白血病易发生感染，主要原因是（ ）[单选题] \*

A.白血病细胞增多

B.继发性营养不良

C.成熟粒细胞缺乏✓

D.长期贫血导致机体抵抗力下降

E.骨髓造血功能衰竭

28.白血病细胞浸润部位中最难控制的是（ ）[单选题] \*

A.肝脏

B.脾脏

C.骨骼

D.淋巴结

E.脑膜及脑组织✓

29.目前糖尿病患者主要死亡原因为（ ）[单选题] \*

A.下肢动脉血栓形成

B.酮症酸中毒

C.高渗性非酮症昏迷

D.冠心病、脑血管疾病✓

E.糖尿病性肾病变

30. 糖尿病患者注射普通胰岛素后一小时方进餐，此时患者出现头昏、心悸、多汗饥饿感，护士应想到

患者发生哪些病情变化（ ）[单选题] \*

A. 胰岛素过敏

B. 冠心病 心绞痛

C.低血糖反应✓

D.酮症酸中毒早期

E.高渗性昏迷先兆

31.男性，25岁，突发剧烈头痛，伴频繁呕吐，继之神志不清。检查：体温 36.8℃，颈强，肺无异常，

肢体无偏瘫，您考虑为（ ）[单选题] \*

A. 脑出血

B. 脑血栓形成

C.脑肿瘤

D.蛛网膜下腔出血✓

F.脑栓塞

32.肺结核的重要传染源是（ ）[单选题] \*

A.痰结核菌阳性病人✓

B. 原发性肺结核病人

C.结核性胸膜炎病人

D.结核菌素试验阳性病人

E.血行播散型肺结核病人

33.控制哮喘慢性炎症最有效的药物是 ( ) [单选题] \*

A.糖皮质激素✓

B.茶碱

C.白三烯调节剂

D.胆碱能受体拮抗剂

E.β<sub>2</sub> 受体激动剂

34.哮喘病人禁忌用的药物是 ( ) [单选题] \*

A.地高辛

B.苯海拉明

C.普奈洛尔✓

D.氨茶碱

E.维生素 C

35.COPD 输氧宜选择 ( ) [单选题] \*

A.低流量高浓度

B.低流量低浓度✓

C.高流量低浓度

D.高流量高浓度

E.中流量高浓度

36.引起左心室后负荷(压力负荷)过重的是 ( ) [单选题] \*

A.二尖瓣狭窄

B.二尖瓣关闭不全

C.主动脉瓣狭窄✓

D.主动脉瓣关闭不全

E.甲亢

37.洋地黄中毒最严重的不良反应是 ( ) [单选题] \*

A.恶心、呕吐

B.视力模糊

C.心律失常 ✓

D.黄视绿视

E.头晕头痛

38.脉搏短绌常见于 ( ) [单选题] \*

A.窦性心动过缓

B.心房颤动 ✓

C.心室颤动

D.房室传导阻滞

E.阵发性心动过速

39.风湿性心脏瓣膜病最常受累的瓣膜是 ( ) [单选题] \*

A.主动脉瓣

B.二尖瓣 ✓

C.肺动脉瓣

D.三尖瓣

E.二尖瓣联合主动脉瓣

40. 急性心肌梗死 24 小时内禁止使用 ( ) [单选题] \*

A.吗啡

B.利多卡因

C.硝酸甘油

D.阿司匹林

E.地高辛✓

41.肝硬化最常见的并发症是（ ）[单选题] \*

A.上消化道出血✓

B.肝昏迷

C.肝肾综合征

D.感染

E.肝癌

42.肝性脑病人灌肠禁用（ ）[单选题] \*

A.肥皂水✓

B.生理盐水

C.蒸馏水

D.弱酸性溶液

E.硫酸镁

43. 在我国引起急性胰腺炎最常见的病因为（ ）[单选题] \*

A.酒精中毒

B.暴饮暴食

C.胰管结石

D.胆道疾病✓

E.流行性腮腺炎.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/937065012062006036>