

皮肤与性病学主治医师：相关专业知识与专业知识试题一

1、单选 患者，女性，40岁。躯干、上肢皮疹伴瘙痒2天就诊。患者2天前于颈前、上胸部、双前臂伸侧出现红色皮疹，有明显瘙痒，皮疹渐加重、扩大，出现局部渗出，该（江南博哥）患者发病前有去海边旅游日晒史。查体：颈前、上胸部、双前臂伸侧密集成簇分布的小丘疱疹、水疱，局部轻度肿胀、渗液。根据其皮疹表现应考虑（）。

- A. 烟酸缺乏症
- B. 多形性日光疹
- C. 日晒伤
- D. 夏季皮炎
- E. 卟啉病

正确答案：B

2、单选 抑制鸟嘌呤核苷酸的经典合成途径的是（）。

- A. 环磷酰胺
- B. 硫唑嘌呤
- C. 甲氨蝶呤
- D. 他克莫司
- E. 霉酚酸酯

正确答案：E

3、单选 下列抗真菌药物适应证不正确的是（）。

- A. 灰黄霉素口服治疗甲癣
- B. 制霉菌素口服治疗消化道念珠菌感染
- C. 两性霉素B治疗隐球菌病
- D. 联苯苄唑外用治疗足癣
- E. 伊曲康唑口服治疗曲霉病

正确答案：A

参考解析：灰黄霉素口服一般用来治疗头癣，由于它具有肝毒性，一般不用来治疗甲癣。

4、单选 患儿女，4岁。因自幼全身皮肤粗糙肥厚，脱屑。躯干及四肢经常起黄豆大小水疱，以胸背部为著，疱壁薄。数日内干燥脱屑而愈。近半年来水疱发生减少，皮肤潮红、粗糙及脱屑明显。组织病理示：显著角化过度，细胞内水肿，致表皮松解。对于该病可以进行治疗不包括（）。

- A. 遗传咨询
- B. 产前诊断
- C. 需要进行重症监护
- D. 水化保湿
- E. 糖皮质激素

正确答案：E

5、单选 下列关于阿弗他口炎的临床表现描述错误的是（）。

- A. 溃疡最常发生于颊黏膜，亦见于唇内侧、舌部、软腭等部位
- B. 本病为单发性疾病，无家族性发病现象
- C. 其自然演变可分为前兆期、疱疹期、溃疡期和愈合期等四期
- D. 女性患者多与月经周期相关，在经前期复发或病情加重
- E. 本病具有自限性，可自然缓解

**正确答案：**B

6、单选 粉剂适用于（）。

- A. 脓疱病
- B. 脓癣
- C. 寻常型银屑病
- D. 无渗出的褶烂
- E. 有渗出的急性皮炎

**正确答案：**D

**参考解析：**粉剂具有干燥、保护及散热作用，常用于急性或亚急性皮炎而无渗出。

7、单选 患者，女性，20岁。因“全身皮疹伴表皮破溃2天”就诊。患者1周前出现上呼吸道感染，多次给予多种抗生素及退热药物，2天前躯干部出现红色点状皮疹，迅速增多、增大，伴大小不等水疱、破溃。查体：T37.6℃，口腔黏膜轻度糜烂，躯干、四肢弥漫性暗红色斑片，伴大小不等松弛性水疱、大疱，尼氏征（+），部分水疱破溃见表浅糜烂面，水疱及破溃面积约占体表面积的40%。治疗原则首先考虑（）。

- A. 局部清创处理
- B. 糖皮质激素
- C. 停用可疑致敏药物
- D. 抗生素
- E. 抗感染

**正确答案：**C

8、单选 其抗原与桥粒相连的是（）。

- A. 寻常型天疱疮
- B. 落叶型天疱疮
- C. 大疱性类天疱疮
- D. 获得性大疱性表皮松解症
- E. 多形红斑

**正确答案：**A

9、单选 患者，男性，45岁。主因龟头起皮疹10余天伴瘙痒就诊。否认婚外性接触史。查体：龟头、包皮内板表现为红斑、丘疹、小的点片状的糜烂面，上覆白色点状乳酪状分泌物。目前主要的治疗是（）。

- A. 局部外用糖皮质激素
- B. 口服氟康唑治疗
- C. 局部使用 3%硼酸湿敷
- D. 口服甲硝唑治疗
- E. 口服氟康唑+局部外用克霉唑乳膏

正确答案：E

10、单选 下列关于黏膜白斑的说法不正确的是（）。

- A. 所有的黏膜白斑均是癌前病变
- B. 白斑的恶性程度与发生部位有关
- C. 黏膜白斑的发生不仅与局部慢性刺激相关，而且可能与全身性因素如糖尿病、内分泌紊乱、维生素缺乏等相关
- D. 该病的确诊要靠组织病理学依据，即上皮细胞不典型增生为主的病理改变
- E. 该病多累及中年和中年以上人群

正确答案：A

11、单选 不易发生瘢痕疙瘩的部位为（）。

- A. 胸骨区
- B. 肩部
- C. 面部
- D. 颈部
- E. 小腿伸侧

正确答案：E

12、单选 需与鳞状毛囊角化病鉴别的是（）。

- A. 鱼鳞病
- B. 花斑癣
- C. 副银屑病
- D. 连圈状秕糠疹
- E. 以上均正确

正确答案：E

13、单选 下列不是系统性硬皮病的皮肤症状的是（）。

- A. 色素脱失
- B. 指尖皮肤溃疡
- C. Gottron 征
- D. 毛细血管扩张
- E. 色素沉着

正确答案：C

14、单选 患者，男，57岁，农民、独居。因颜面、双手背反复红斑、水疱、脱屑2年，双下肢麻木1年。嗜酒6年，每日饮白酒250ml，因牙齿全脱三餐以大米稀饭为主。病程中伴有腹泻、消瘦乏力、睡眠欠佳。经予以戒酒、进食多种蔬菜水果及补充多种水溶性维生素3个月后皮疹好转。结合其病史特点，该患者的诊断为（）。

- A. 日光性皮炎
- B. 接触性皮炎
- C. 蔬菜日光性皮炎
- D. 迟发性皮肤卟啉病
- E. 烟酸缺乏症

**正确答案：**E

15、单选 同形反应可见于（）。

- A. 湿疹
- B. 慢性单纯性苔藓
- C. 扁平苔藓
- D. 红皮病
- E. 多形红斑

**正确答案：**C

16、单选 患者，女性，18岁。右侧躯干可见一10cm长褐色扁平皮损，表面角化、粗糙。2岁发病，近期发展较快。以下不是本病好发部位的是（）。

- A. 面部
- B. 头皮
- C. 手背
- D. 腋下
- E. 前臂

**正确答案：**D

17、单选 有关女性非淋菌性泌尿生殖道炎的临床表现，错误的是（）。

- A. 尿道炎症状不明显，仅有轻度的尿道刺激症状或完全无症状
- B. 宫颈支原体感染与宫颈癌前期或恶性期改变之间有关系
- C. 子宫是感染的主要部位
- D. 围生期感染能引起新生儿衣原体性结膜炎
- E. 宫颈水肿，表面肥大性滤泡是宫颈炎特殊的外观

**正确答案：**B

**参考解析：**宫颈支原体感染与宫颈癌前期或恶性期改变之间没有明确关系。

18、单选 获得性掌跖角化病可见于（）。

- A. 慢性砷中毒
- B. 恶性肿瘤
- C. 内分泌疾病

D. 免疫性疾病

E. 以上都是

正确答案： E

19、单选 下列与 X 连锁鱼鳞病相关的是 ( )。

- A. 编码 K5 和 K14 的基因突变
- B. 编码板层素 5 和 Ⅲ型胶原基因突变
- C. 编码Ⅶ型胶原基因突变
- D. 类固醇硫酸酯基因缺陷
- E. 角化细胞黏附障碍

**正确答案：**D

20、单选 花斑癣表现为 ( )。

- A. 炎症性红斑
- B. 非炎症性红斑
- C. 出血斑
- D. 色素沉着斑
- E. 色素减退斑

**正确答案：**E

21、单选 患者，男，40 岁。已婚，健康检查发现血 RPR 阴性，TPPA 阳性。该患者采取的下列方法比较适当的是 ( )。

- A. 不需要任何处理
- B. 苄星青霉素 240 万 U，肌肉注射一次
- C. 阿奇霉素 1.0g，一次性顿服
- D. 通知患者与其配偶性生活时不需要使用安全套
- E. 2~3 周复查血 RPR+TPPA

**正确答案：**E

22、单选 调节上皮细胞的生成和分化的是 ( )。

- A. 维 A 酸
- B. 烟酰胺
- C. 伊曲康唑
- D. 氯喹
- E. 阿昔洛韦

**正确答案：**A

23、单选 患者，女，24 岁。躯干，四肢皮损 20 天，不痒。平素健康，近 2~3 周内未有用药史。体格检查：躯干、四肢广泛对称分布大量黄豆至小指甲大小圆形暗红色斑疹，表面无脱屑。两侧小阴唇内侧见少数灰白色斑片，表面轻度糜烂、结痂。实验室检查：血清 RPR 阳性，滴度 1:64，TPPA 阳性。若该患者既往有青霉素过敏性休克病史，则应采用 ( )。

- A. 头孢拉定 500mg，口服，每日 4 次，连续 2 周
- B. 左氧氟沙星 200mg，口服，每日 2 次，连续 2 周
- C. 阿奇霉素 1g，一次性顿服
- D. 米诺环素 100mg，口服，每日 2 次，连续 2 周

E. 头孢曲松 1g，静脉滴注，每日 1 次，连续 2 周

**正确答案：** D

24、单选 二期梅毒的骨关节损害最常见的是（）。

- A. 骨折
- B. 骨软骨垢炎
- C. 关节强直
- D. 骨髓炎
- E. 骨膜炎

**正确答案：** E

25、单选 以下关于潜伏梅毒错误的是（）。

- A. 潜伏梅毒无临床症状或临床症状已消失
- B. 潜伏梅毒脑脊液检查可以正常
- C. 潜伏梅毒血清学检查为阳性
- D. 潜伏梅毒的发生与机体免疫力较差有关
- E. 潜伏梅毒与治疗暂时抑制了 TP 有关

**正确答案：** D

**参考解析：** 潜伏梅毒机体的免疫力较强。

26、单选 Peutz-Jeghers 综合征又称为（）。

- A. 肠病性肢端皮炎
- B. 结节性硬化
- C. 色素失禁症
- D. 口周-黑子肠息肉综合征
- E. 家族性慢性良性天疱疮

**正确答案：** D

27、单选 SLE 中与活动性肾脏损害密切相关的抗体是（）。

- A. ANA
- B. 抗 SSA/SSB 抗体
- C. 抗 dsDNA 抗体
- D. 抗心磷脂抗体
- E. 抗 RNP 抗体

**正确答案：** C

**参考解析：** 抗 dsDNA 抗体是判断病情活动的标准之一，特别是与活动性肾损密切相关。

28、单选 以线性隧道为特征性临床表现的皮损是（）。

- A. 虫咬皮炎
- B. 疥疮
- C. 痒疹
- D. 脓疱疮

E. 蜂蜇伤

**正确答案：** B

29、单选 有关疱疹样皮炎的临床特征的描述不正确的是（）。

- A. 多发于青年人
- B. 表现为疱壁厚、易破的大疱
- C. 好发于四肢伸侧
- D. 尼氏征阴性
- E. 口腔黏膜损害少

**正确答案：** B

**参考解析：** 疱疹样皮炎疱壁厚、不易破的大疱，尼氏征阴性；口腔黏膜一般不受累；多见于中青年。故选 B。

30、单选 患儿，男性，10岁。自2岁开始反复出现四肢屈侧、颈前区皮疹伴有瘙痒，外用药物治疗后可缓解，病程中伴过敏性鼻炎及过敏性哮喘反复发作。查体：系统检查无异常。皮肤科专科检查见四肢关节屈侧、颈前区淡褐色浸润性斑块，轻度苔藓化，上覆少许干燥鳞屑。该患者诊断可能性最大为（）。

- A. 慢性湿疹
- B. 自身敏感性皮炎
- C. 特应性皮炎
- D. 接触性皮炎
- E. 湿疹样皮炎

**正确答案：** C

31、单选 肥厚性瘢痕与瘢痕疙瘩的鉴别要点是（）。

- A. 好发于胸骨区
- B. 胶原纤维致密增生
- C. 有色人种易发病
- D. 无蟹足状伸展，皮损经1年或数年后可变平
- E. 与皮肤损伤有关

**正确答案：** D

**参考解析：** 肥厚性瘢痕无蟹足状伸展，皮损经一年或数年后可变平，而瘢痕疙瘩则持续存在，甚至超过原损伤部位。

32、单选 患者，男，70岁。鼻梁右侧皮肤可见黑色结节，边缘呈珍珠样，中央有溃疡，病程慢性，长期不愈合。以下不是本病的组织病理学特点的是（）。

- A. 真皮内基底样细胞团块
- B. 瘤细胞核质比例大
- C. 细胞界限不清
- D. 细胞间桥发达



E. 瘤体与周围间质之间存在收缩间隙

**正确答案：**D

33、单选 下列有关大疱性类天疱疮的叙述，不正确的是（）。

- A. 好发于 60 岁以上的老人
- B. 疱壁厚且不易破
- C. 尼氏征阳性
- D. 常伴有黏膜损害
- E. 糖皮质激素治疗为首选

**正确答案：**C

34、单选 下列关于腺性唇炎临床表现的说法，错误的是（）。

- A. 该病以唇部异位唾液腺的增大和继发性炎症性改变为其特征，好发于下唇
- B. 多数患者自觉唇部肿胀，绷紧感，有时有触痛和感觉过敏
- C. 单纯型腺性唇炎为后天性，病情较轻，多数无自觉症状
- D. 化脓型腺性唇炎炎症反应较明显，被认为是癌前期病变
- E. 化脓型腺性唇炎多为后天性，如用致敏的牙膏，漱口水，或外伤所致

**正确答案：**E

**参考解析：**化脓型腺性唇炎多为先天性或家族性，呈常染色体显性遗传，炎症反应明显。

35、单选 干扰真菌细胞膜麦角固醇的合成的是（）。

- A. 维 A 酸
- B. 烟酰胺
- C. 伊曲康唑
- D. 氟唑
- E. 阿昔洛韦

**正确答案：**C

36、单选 利福平治疗正常成人皮肤结核的用量是（）。

- A. 每日口服 400mg
- B. 每日口服 450mg
- C. 每日口服 500mg
- D. 每日口服 550mg
- E. 每日口服 600mg

**正确答案：**E

37、单选 湿疹症状的特点是（）。

- A. 多形性皮疹，有渗出倾向，对称分布，瘙痒明显，易复发
- B. 皮疹为风团，发生及消退迅速，消退后不留痕迹
- C. 四肢伸侧为主，轻痒，伴银白色脱屑
- D. 以脱屑为主，开始即有苔藓化表现，瘙痒明显
- E. 皮损局限于某一部位，边界清楚，痒不明显，自限性

**正确答案：**A

38、单选 患儿，女，6岁。因右侧面部红斑就诊，皮损出生时即有，随着年龄增加有增大趋势。体格检查：局部大片红斑，表面光滑，边界清楚，压之褪色。该患者诊断应首先考虑（）。

- A. 表皮痣
- B. 脂溢性角化病
- C. 面部丹毒
- D. 鲜红斑痣
- E. 血管角皮瘤

**正确答案：**D

39、单选 易出现胃肠道反应、角膜色素沉着斑（）。

- A. 氯喹
- B. 氨苯砞
- C. 沙利度胺
- D. 烟酰胺
- E. 钙剂

**正确答案：**A

40、单选 皮疹与胚胎期黑素细胞移行异常有关的皮肤疾病（）。

- A. 雀斑
- B. 黄褐斑
- C. 白癜风
- D. 太田痣
- E. 蒙古斑

**正确答案：**E

**参考解析：**雀斑是好发于面部的常染色体显性遗传性色素沉着病，皮损为针尖至米粒大小、圆形或卵圆形淡褐色或黄褐色斑疹，其组织病理显示：表皮基底层色素颗粒增加，但黑素细胞数目并不增多。白癜风为一种后天获得性色素缺乏症，属病因复杂、发病机制尚不明确的疾病，其组织病理显示：表皮黑素细胞及黑素颗粒明显减少、基底层几乎完全缺乏多巴染色阳性的黑素细胞。太田痣为一种波及面部三叉神经第一、第二支分布区域及同侧巩膜的灰蓝色斑状损害，由日本太田于1938年首先描述，又名眼上腭部褐青色痣。蒙古斑系胚胎发育中的黑素细胞向表皮移行延迟、未能穿过表皮-真皮交界而停留在真皮层所致，可自行消退。

41、单选 单纯性大疱性表皮松解症是（）。

- A. 常染色体显性遗传性疾病
- B. 常染色体隐性遗传性疾病
- C. 性连锁显性遗传性疾病
- D. 性连锁隐性遗传性疾病

E. 多基因遗传性疾病

**正确答案：**A

42、单选 下列关于传染性软疣的描述错误的是（）。

- A. 感染传染性软疣病毒所致
- B. 多见于儿童及青年人
- C. 半球形丘疹，有脐凹
- D. 主要采用局部治疗
- E. 必须口服抗生素

**正确答案：**E

43、单选 患者，女，24岁。躯干，四肢皮损20天，不痒。平素健康，近2~3周内未有用药史。体格检查：躯干、四肢广泛对称分布大量黄豆至小指甲大小圆形暗红色斑疹，表面无脱屑。两侧小阴唇内侧见少数灰白色斑片，表面轻度糜烂、结痂。实验室检查：血清RPR阳性，滴度1:64，TPPA阳性。该患者诊断应考虑（）。

- A. 玫瑰糠疹
- B. 药疹
- C. 早期梅毒
- D. 病毒疹
- E. 寻常型银屑病

**正确答案：**C

44、单选 患者，女性，58岁。主因外阴部皮疹伴剧烈瘙痒4年余，加重1个月就诊。查体：心肺腹未见异常。双侧小阴唇部浸润肥厚、皲裂，呈白色，以右侧小阴唇较明显。最可能的诊断是（）。

- A. 尖锐湿疣
- B. 皮脂腺异位症
- C. 白癜风
- D. 黏膜白斑
- E. 硬化萎缩性苔藓

**正确答案：**D

45、单选 有关臭汗症，下列不正确的是（）。

- A. 小汗腺分泌引起的臭汗症是皮肤表面的角蛋白、脂质因浸渍可被寄生菌分解而产生
- B. 可为全身性臭汗症
- C. 食用大蒜、生葱等后某些成分可由小汗腺随汗液排出而产生臭味
- D. 足臭受性激素的影响
- E. 可为局部性臭汗症

**正确答案：**D

46、单选 关于治疗植物日光性皮炎，错误的是（）。

- A. 避免过多服食和接触有关的植物
- B. 避免强烈日光暴晒
- C. 口服维生素 C、B1 和烟酸
- D. 禁用皮质类固醇激素
- E. 局部对症治疗

**正确答案：** D

47、单选 Kogoj 海绵状微脓肿常见于（ ）。

- A. 寻常型银屑病
- B. 关节病型银屑病
- C. 脓疱型银屑病
- D. 红皮病型银屑病
- E. 红皮病

**正确答案：** C

48、单选 患者，男性，34 岁。全身皮损 3 个月伴瘙痒，曾诊断为皮炎，给予口服抗组胺剂和外用卤米松软膏治疗 3 周皮损无明显改善。专科检查：躯干、四肢散在斑疹、斑丘疹，其上细碎鳞屑，刮去鳞屑见出血点。躯干少许散在脓疱，部分疱破，呈脓湖状，以腰腹部为多。为控制皮损临床上最佳的选择是（ ）。

- A. 免疫抑制剂联合 PUVA
- B. 系统应用糖皮质激素
- C. 干扰素联合免疫抑制剂
- D. 维 A 酸类药物联合窄谱中波紫外线
- E. 加强外用药物联合窄谱中波紫外线

**正确答案：** E

49、单选 下列叙述不正确的是（ ）。

- A. 水痘是由水痘-带状疱疹病毒引起的、以散在分布水疱为特征、传染性很强的呼吸道传染病
- B. 带状疱疹是由水痘-带状疱疹病毒引起的、多为单侧，沿神经根走向的成簇水疱、丘疱疹、血疱或脓疱伴基底红晕的疾病
- C. 面瘫、耳痛、外耳道疱疹三联症又称 Meniere 综合征
- D. HSV- I 型主要是引起生殖器以外的皮肤黏膜和器官的感染
- E. 单纯疱疹的治疗原则为缩短病程，防止感染和并发症，减少复发

**正确答案：** C

50、单选 类脂质渐进性坏死的描述错误的是（ ）。

- A. 病变主要在真皮
- B. 多见于妇女，部分患者伴有糖尿病
- C. 伴有糖尿病者多为肉芽肿型
- D. 小腿以外的损害大多为肉芽肿型

E. 主要损害在小腿伸面

**正确答案：** C

51、单选 下列鱼鳞病不伴有掌跖角化过度的是（ ）。

- A. 寻常型鱼鳞病
- B. 板层状鱼鳞病
- C. 性联隐性鱼鳞病
- D. 先天性非大疱性鱼鳞病样红皮病
- E. 先天性大疱性鱼鳞病样红皮病

**正确答案：** C

52、单选 以下不是特异性肉芽肿性炎症的是（ ）。

- A. 结核
- B. 麻风
- C. 梅毒
- D. 湿疹
- E. 深部真菌病

**正确答案：** D

53、单选 酒渣鼻红斑期是（ ）。

- A. 皮色丘疹，毛囊开口不明显
- B. 鼻、两颊部对称性分布的红斑
- C. 鼻尖部紫红色结节状突起
- D. 面颊部丘疹、脓疱，毛囊口扩大
- E. 暗红色结节

**正确答案：** B

54、单选 生殖器疱疹主要是哪种病毒感染（ ）。

- A. HSV1
- B. HSV2
- C. HPV6
- D. HPV1
- E. HPV11

**正确答案：** B

**参考解析：**生殖器疱疹主要为HSV2（约占90%）感染。

55、单选 对人而言，HLA 抗原属于（ ）

- A. 异种抗原
- B. 改变的自身抗原
- C. 同种异型抗原
- D. 隐蔽抗原
- E. 异嗜性抗原

**正确答案：** C

56、单选 结缔组织痣患者可合并下列症状，其中不包括（）。

- A. 脱发
- B. 白癜风样痣
- C. 色素痣
- D. 疣状痣样皮损
- E. 血管瘤

**正确答案：** E

57、单选 人工性荨麻疹（）。

- A. 玻片压诊法
- B. 皮肤划痕试验
- C. Wood 灯检查
- D. 醋酸白试验
- E. 真菌镜检

**正确答案：** B

58、单选 皮肌炎的特异性抗体是（）。

- A. 抗 PM-1 抗体
- B. 抗 SSA 抗体
- C. 抗 SM 抗体
- D. 抗核仁 RNA 抗体
- E. 抗着丝点抗体

**正确答案：** A

**参考解析：** SLE 常见的抗体包括抗双链 DNA、抗单链 DNA、抗组蛋白等，其中抗 SM 为 SLE 的标记抗体。抗着丝点抗体是 CREST 的标记抗体。皮肌炎则可见抗 PM-1、抗 Mi-1、抗 PL-7、抗 JO-1 抗体阳性。

59、单选 女，4 月龄。患儿出生后不久手足出现水疱，以关节和摩擦部位为著，摩擦后加重。患儿出生正常。母孕期无感染及服药史，父母非近亲结婚。家族中无类似疾病。体检：生长发育良好，生命体征正常，头颅及耳鼻检查无异常，颈无抵抗，心、肺、腹部检查无异常，口唇周围及手足皮肤可见大小不等透亮水疱，直径约 1~2cm。该病透射电镜下皮肤松解发生于表皮基底细胞下部。该病的描述下面不正确的是（）。

- A. 是一类角蛋白疾病
- B. 水疱发生在透明板内
- C. 内脏很少受累
- D. 通常由角蛋白 5 和角蛋白 14 的基因突变所致
- E. 该病多为常染色体显性遗传

**正确答案：** B

60、单选 患儿，男性，9岁。因“双下肢皮疹伴剧烈瘙痒1天”就诊。患儿1天前去野外郊游，后于双下肢出现多个红色皮疹，剧烈瘙痒。查体：双下肢多发淡红色纺锤形坚实斑丘疹，个别皮疹顶端见张力性水疱，尼氏征（-），皮损无破溃。根据其病史和临床表现，诊断考虑（）。

- A. 急性荨麻疹
- B. 玫瑰糠疹
- C. 丘疹性荨麻疹
- D. 线状 IgA 大疱病
- E. 多形红斑

**正确答案：C**

61、单选 患者，男，43岁。双手阵发性苍白、麻木伴疼痛2年。病程中无吞咽困难、胸闷等症状。体格检查：双手、前臂及面部皮肤紧张，不能捏起，表面有光泽；手指变细，张口受限，鼻变尖，呈面具样脸，四肢活动障碍，偶有四肢关节酸痛。实验室检查：血沉：43mm/h；血抗 ANA 抗体（+），斑点型；肺无间质性病变。腹部B超未见异常。该病出现何种情况时提示预后良好（）。

- A. 抗 SCL-70 抗体阳性
- B. 抗着丝点抗体阳性
- C. 雷诺现象
- D. 外周血补体及血沉正常
- E. 皮肤异色病样改变

**正确答案：B**

62、单选 患者，男，25岁。前胸部暗红色丘疹，数年内逐渐扩大连接为片状斑块，暗红色，质地坚韧，表面光滑无毛，病程慢性，偶有痛痒感。本病与肥厚性瘢痕的主要鉴别要点为（）。

- A. 皮损是否柔软
- B. 皮损范围是否超过原有损害范围
- C. 皮损表面是否有毛发生长
- D. 是否有自觉症状
- E. 皮损表面是否光滑

**正确答案：B**

63、单选 疣状增生的病理变化不包括（）。

- A. 角化过度
- B. 角化不良
- C. 颗粒层增厚
- D. 棘层肥厚
- E. 乳头瘤样增生

**正确答案：B**

**参考解析：**疣状增生指表皮角化过度、颗粒层肥厚、棘层肥厚和乳头瘤样增生。



64、单选 患者，男性，45岁。主因龟头起皮疹10余天伴瘙痒就诊。否认婚外性接触史。查体：龟头、包皮内板表现为红斑、丘疹、小的点片状的糜烂面，上覆白色点状乳酪状分泌物。最可能的诊断是（）。

- A. 坏疽性龟头炎
- B. 干燥闭塞型龟头炎
- C. 念珠菌性包皮龟头炎
- D. 浆细胞性包皮龟头炎
- E. 环状糜烂性包皮龟头炎

**正确答案：C**

65、单选 患者，女性，36岁。主因发现外阴部皮疹2个月余就诊。近期内白带较多，皮损处不痛不痒，否认不洁性接触史。查体：小阴唇内侧可见针尖至粟粒大小的近肤色的小丘疹，散在的息肉状小丘疹呈线状排列，呈绒毛状外观。目前的主要处理是（）。

- A. 无须特殊处理
- B. 冷冻治疗
- C. 激光治疗
- D. 外用干扰素软膏
- E. 外用抗生素软膏

**正确答案：A**

66、单选 胶原溶解见于（）。

- A. 营养不良型大疱性表皮松解症
- B. 单纯性大疱性表皮松解症
- C. 天疱疮
- D. 大疱性类天疱疮
- E. 重型多形性红斑

**正确答案：A**

**参考解析：**胶原溶解指在光学显微镜下，表皮下乳头层狭窄的地带中出现均一化的胶原变性。见于营养不良性大疱性表皮松解症。

67、单选 患者，女性，40岁。右足趾部色素斑35年，糜烂、渗出2个月。患者5岁时即发现其右足趾部有一针尖大小的黑点，随年龄逐渐长大至直径为5mm的色素斑。2个月前，患者干农活时，不慎扎破脚，正好为色素斑处，外用抗生素软膏，创面不愈合，且见色素斑扩大。无其他系统性疾病史。查体：右足趾前部有一直径2cm大小圆形糜烂面，表面少量渗液，中央有一大致呈圆形、直径约1cm的黑色斑；未触及浅表淋巴结肿大。本病例应首先考虑的诊断是（）。

- A. 色素痣继发感染
- B. 色素型基底细胞上皮瘤
- C. 鳞状细胞癌合并色素痣

- D. 创伤性湿疹合并色素痣
- E. 色素痣恶变

**正确答案：**E

68、单选 只有婆罗门教僧侣才能教授《吠陀经》的文明古国是（）

- A. 古代埃及
- B. 古代巴比伦
- C. 古代中国
- D. 古代印度

**正确答案：**D

69、单选 属于中效外用激素的是（）。

- A. 甲泼尼龙
- B. 0.05%地塞米松
- C. 0.05%肤轻松
- D. 0.05%丙酸氯倍他索
- E. 地塞米松

**正确答案：**B

70、单选 花斑癣与下列哪种感染有关（）。

- A. 小孢子菌
- B. 糠秕马拉色菌
- C. 红色毛癣菌
- D. 毛囊虫
- E. 纤细棒状杆菌

**正确答案：**B

71、单选 男性，25岁。尿道流脓伴尿痛2天。起病前3天有冶游史。查体：尿道口轻度红肿，可见中量的黄色分泌物，内裤有污秽。本病最可能的诊断是（）。

- A. 非淋菌性尿道炎
- B. 非特异性尿道炎
- C. 淋病
- D. 前列腺炎
- E. 化脓性包皮龟头炎

**正确答案：**C

**参考解析：**从患者病史分析，起病急，起病前有冶游史，尿道有脓性分泌物，最可能的诊断为淋病。

72、单选 有关色素失禁症下述不正确的是（）。

- A. 常见于男性
- B. 出现色素性斑疹
- C. 可有癫痫、智力迟钝

- D. 可伴有骨骼异常
- E. 可发生牙齿异常

**正确答案：**A

**参考解析：**95%以上的色素失禁症常见于女性。

73、单选 患者，男，57岁，农民、独居。因颜面、双手背反复红斑、水疱、脱屑2年，双下肢麻木1年。嗜酒6年，每日饮白酒250ml，因牙齿全脱三餐以大米稀饭为主。病程中伴有腹泻、消瘦乏力、睡眠欠佳。经予以戒酒、进食多种蔬菜水果及补充多种水溶性维生素3个月后皮疹好转。此病临床上典型的三联征为（）。

- A. 皮炎、腹泻、痴呆
- B. 皮炎、关节炎、肾炎
- C. 皮炎、肾炎、痴呆
- D. 腹泻、痴呆、肾炎
- E. 腹泻、皮炎、肾炎

**正确答案：**A

74、单选 患者男，53岁。22岁时掌跖部出现角质丘疹，质地坚硬，部分皮疹已剥除或自行脱落呈喷火形凹陷。随年龄增长皮损逐渐增多。患者家族中有5人患病。近1个月患者胸背部出现红斑鳞屑性皮疹，刮除表面鳞屑可见薄膜现象和点状出血。系统检查无异常。下面治疗不适宜其伴发疾病的是（）。

- A. 外用糖皮质激素
- B. 外用维A酸霜
- C. 应用抗生素
- D. 口服糖皮质激素
- E. 应用角质促成剂

**正确答案：**D

75、单选 中年女性，乳头、乳晕部红斑、脱屑或糜烂、渗液三年，瘙痒不明显，皮损渐向周围扩展，病理显示表皮内有Paget细胞。该患者的诊断最可能是（）。

- A. 乳房湿疹
- B. 乳房Paget病
- C. 蕈样肉芽肿
- D. 鲍温病
- E. 基底细胞癌

**正确答案：**B

**参考解析：**乳房Paget病好发于中年女性，乳头、乳晕部红斑、脱屑或糜烂、渗液，瘙痒不明显，病理显示表皮内有Paget细胞。

76、单选 色素失禁症的基因定位于（）。

- A. Xq28

- B. Xq22.3
- C. 1q21
- D. 2q33-q35
- E. 3q21-q22

**正确答案：A**

77、单选 弹力过度性皮肤的发病机制主要是（）。

- A. 网状纤维量的缺陷及形态上的异常
- B. 胶原纤维量的缺陷及形态上的异常
- C. 弹力纤维量的缺陷及形态上的异常
- D. 真皮含水量的增加，真皮基质黏性增加
- E. 血清中弹性硬蛋白酶抑制剂水平低下，导致弹力纤维破坏

**正确答案：B**

78、单选 患者，女性，30岁。双侧手指皮疹反复发作数年，自觉瘙痒及烧灼感，多于春末夏初发病，夏季加重，伴有多汗现象。查体：双手指侧面、指端散在分布位于表皮深部的米粒大小圆形小水疱，部分皮肤伴有领圈状脱屑。下列治疗及预防不正确的是（）。

- A. 避免精神紧张和情绪激动
- B. 早期水疱外用炉甘石洗剂外擦
- C. 长期口服强的松以达到防止复发
- D. 脱屑时可用皮质激素
- E. 反复脱屑、干燥疼痛者可外用水杨酸软膏

**正确答案：C**

79、单选 其抗原与锚丝相连的是（）。

- A. 寻常型天疱疮
- B. 落叶型天疱疮
- C. 大疱性类天疱疮
- D. 获得性大疱性表皮松解症
- E. 多形红斑

**正确答案：D**

80、单选 患者，女性，32岁。全身泛发性风团3个月，难自行消退，触之有浸润感，皮损消退后遗留色素沉着，自觉局部有烧灼感，伴有不规则发热、关节疼痛，血常规提示 WBC $9 \times 10^9/L$ 、N92%、L7%、PLT $230 \times 10^9/L$ 。ESR42mm/h，血清 C3、C4 低于正常水平。此病组织病理学特征性改变为（）。

- A. 白细胞碎裂性血管炎
- B. 白细胞和淋巴细胞碎裂性血管炎
- C. 淋巴细胞碎裂性血管炎
- D. 真皮浅层的毛细血管和细小血管的内皮细胞肿胀，管腔闭塞，血管壁有纤维蛋白沉积、变性和坏死

E. 真皮浅层毛细血管和小血管炎

**正确答案：**A

81、单选 最早出现的二期梅毒疹是（）。

A. 丘疹性梅毒疹

B. 掌跖梅毒疹

C. 扁平湿疣

D. 脓疱性梅毒疹

E. 斑疹性梅毒疹

**正确答案：**E

**参考解析：**以上均为二期梅毒疹，但最早出现的是斑疹性梅毒疹。

82、单选 抗病毒药物（）。

A. 利福平

B. 阿昔洛韦

C. 碘化钾

D. 灰黄霉素

E. 红霉素

**正确答案：**B

83、单选 VDRL 试验出现阳性的时间一般为硬下疳发生后（）。

A. 1~2 周

B. 2~4 周

C. 3~6 周

D. 6~8 周

E. 8~12 周

**正确答案：**A

84、单选 Hailey-Hailey 病的基因定位于（）。

A. 3q21-q22

B. 2q33-q35

C. 1q21

D. 1q25-1q32

E. Xq22.3

**正确答案：**A

85、单选 患者，女性，65 岁。因右侧面颊部溃疡 1 个月就诊，患者 1 年前于患处发生一角化性丘疹，后逐渐增大，并于 1 个月前在皮损表面出现溃疡。体格检查：右侧面颊部一 3cm×4cm 大小角化性疣状增生，表面凹凸不平，并有一 1cm×1cm 大小溃疡，边缘隆起，底部有出血。本病与其他疾病进行鉴别主要借助于（）。

A. Wood 灯

B. 细菌培养

- C. 细胞培养
- D. 免疫荧光
- E. 组织病理学

**正确答案：**E

86、单选 下列不属于梅毒实验室诊断方法的是（）。

- A. 血清不加热的反应素试验
- B. VDRL 试验
- C. 胶体金试验
- D. 快速血浆反应素环状卡片试验
- E. 墨汁试验

**正确答案：**E

**参考解析：**血清不加热的反应素试验、VDRL 试验、快速血浆反应素环状卡片试验都是梅毒血清试验，胶体金试验为诊断神经梅毒脑脊液检查所用的方法。

87、单选 下列疾病不属于脓皮病的是（）。

- A. 疔疮
- B. 丹毒
- C. 蜂窝织炎
- D. 毛囊炎
- E. 脓癣

**正确答案：**E

**参考解析：**脓癣属于头癣的一种，系炎症较重的一种特殊类型。

88、单选 患儿男，2岁。因面及手足部色素斑2年就诊。患儿在出生后1个月即在面、手背等暴露部位出现红色斑点，继之皮疹渐增多，颜色变为褐色。日晒后加重，无痛痒等不适。其父母非近亲结婚，否认家族遗传病史。患儿皮肤干燥，暴露部位密集雀斑样色素沉着，淡棕至深褐色，面及手足伸侧伴脱屑性红棕色斑片。双眼畏光流泪，球结膜无充血。该病治疗下面不对的是（）。

- A. 外用遮光剂
- B. 维A酸药物
- C. 手术治疗
- D. 糖皮质激素
- E. 特定脂质体进行DNA修复

**正确答案：**D

89、单选 不符合寻常型银屑病的临床表现是（）。

- A. 银白色鳞屑
- B. 束状发
- C. 甲板顶针状凹陷
- D. 消退期常见Koebner现象
- E. 多数患者病情冬重夏轻

**正确答案：D**

90、单选 参与视紫质合成的是（）。

- A. 维生素 A
- B. 维生素 K
- C. 维生素 B1
- D. 维生素 E
- E. 维生素 C

**正确答案：A**

91、单选 女性，50岁。因面部出现水肿性紫红色斑伴四肢肌肉酸痛无力半年，吞咽困难10余天就诊。查体发现双手指伸侧对称分布扁平紫红色鳞屑性丘疹，甲周可见毛细血管扩张及瘀点。最可能的诊断为（）。

- A. SLE
- B. 皮炎
- C. 系统性硬皮病
- D. 重症肌无力
- E. 混合性结缔组织病

**正确答案：B**

92、单选?对痤疮瘢痕治疗无效的为（）。

- A. 糖皮质激素局封
- B. 磨削术
- C. 激光
- D. 口服抗生素药物
- E. 美容手术

**正确答案：D**

93、单选 有关玫瑰糠疹的治疗，不正确的是（）。

- A. 抗组胺剂口服
- B. 硫代硫酸钠静推
- C. 氢化可的松外用
- D. 中波紫外线照射
- E. 皮质类固醇口服

**正确答案：E**

94、单选 患者，男性，39岁。确诊为寻常型银屑病12年，四肢多关节疼痛伴部分关节肿胀2个月。专科检查：束状发，躯干四肢散在斑疹、斑丘疹，伴银白色鳞屑。双侧肩关节、双侧髋关节压痛。腰椎多椎体间压痛；双侧腕关节和部分掌指关节肿胀畸形，伴压痛。部分指（趾）甲变形、变脆，甲下厚积鳞屑。为控制关节炎症状，最不常联合使用的药物是（）。

- A. 口服糖皮质激素
- B. 干扰素

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/938046017134006065>