

1. 是甲类传染病
  - . 疟疾
  - . 炭疽
  - . 艾滋病
  - . 黑热病
  - . 鼠疫
2. 申请护士执业注册应具备条件
  - . 具备彻底民事行为能力
  - . 在中等职业学校、高等学校完成教育部和卫生部规定的普通全日制学习并取得相应学历证书
  - . 通过国务院卫生主管部门组织的护士执业资格考试
  - . 获得经省级以上卫生行政部门确认免考资格的普通中等卫生（护士）学校护理专业毕业文凭者，可以免于护士执业考试
  - . 符合国务院卫生主管部门规定的健康标准
3. 建立良好护患关系，沟通策略不包括
  - . 管理沟通人性化
  - . 形成互帮互助氛围
  - . 实现年龄、学历各因素互补
  - . 遇到冲突据理力争，坚守阵地
  - . 构建和谐工作环境
4. 腰椎间盘突出最易发生部位是
  - . 胸 12—腰 1
  - . 腰 1—2
  - . 腰 2—3
  - . 腰 3—4
  - . 腰 4-5
5. 心脏复苏首选药
  - . 阿托品
  - . 利多卡因
  - . 肾上腺素
  - . 异丙肾上腺素
  - . 氯化钙
6. 在胎儿分娩过程中，贯通整个产程
  - . 衔接
  - . 下降
  - . 俯屈
  - . 仰伸
  - . 内旋转
7. 正常分娩胎膜破裂的时间普通是
  - . 临产前
  - . 潜伏期
  - . 活跃期
  - . 第二产程
  - . 第三产程

8. 不属于医院基本饮食的是
- . 普通饮食
  - . 软质饮食
  - . 半流质饮食
  - . 流质饮食
  - . 治疗饮食
9. 缓解心绞痛发作最有效、作用最快药物是
- . 硝苯地平
  - . 普奈洛尔
  - . 阿司匹林
  - . 硝酸甘油
  - . 阿托品
10. 中医五脏指的是
- . 脾、胆、胃、肺、女小胞
  - . 肝、胆、胃、大肠、小肠
  - . 心、肝、脾、肺、膀胱
  - . 心、肝、脾、肺、肾
  - . 心、肝、脾、胆、胃
11. 下列因素中，可能引起窦性心动过缓的是
- . 缺氧
  - . 发热
  - . 失血性贫血
  - . 甲亢
  - . 高钾
12. 临终患者通常最早浮现的心理反应
- . 协议期
  - . 愤怒期
  - . 否认期
  - . 接受期
  - . 忧郁期
13. 患儿男，5岁，因“肾病综合症”以肾上腺皮质激素治疗5个月，浮现浮肿减轻，食欲增加，双下肢疼痛，最应关注的药物副作用是
- . 高血压
  - . 骨质疏松
  - . 白细胞计数下降
  - . 消化道溃疡
  - . 库欣氏综合症
14. 甲状腺功能亢进病人的心理护理，错误的是
- . 限制患者参加社团活动
  - . 向患者家属解释病情
  - . 与患者交谈鼓励病人表达内心感受
  - . 指导患者家属勿提供兴奋、激动的信息
  - . 理解、同情患者，保持病情稳定
15. 中医情志包括

- . 怒喜思悲恐
- . 酸苦甘辛咸
- . 木火土金水
- . 风暑湿燥寒
- . 青赤黄白黑

16. 护患沟通过程中，提问首先应遵循的原则

- . 中心性原则
- . 开放性原则
- . 鼓励性原则
- . 安慰性原则
- . 谨慎性原则

17. 属于开放式提问的是

- . 您昨天呕吐几次
- . 您早餐后服过药吗
- . 现在您还头晕吗
- . 您需要吃点什么吗
- . 您昨晚睡了几个小时

18. 压疮原因不包括

- . 局部组织长期受压
- . 使用石膏绷带补垫不当
- . 全身营养不良
- . 局部皮肤时常受排泄物刺激
- . 肌肉软弱萎缩

19. 对类风湿性关节炎描述不正确的

- . 基本病变是滑膜炎
- . 疾病与自身免疫有关
- . 皮下结节提示病情活动
- . 类风湿因子阳性
- . 不引起脏器伤害

20. 给患儿口服脊髓灰质炎减毒活疫苗时，正确的是

- . 用温开水服用
- . 热开水服用
- . 冷开水或者含服
- . 热开水溶解后服
- . 服后 30 分钟可饮用热牛奶

21. 亚急性心内膜炎血培养标本采集量

- . 1~3ml
- . 4~6ml
- . 7~9ml
- . 10~15ml
- . 16~18ml

22. 肺炎患者咳大量黄色脓痰时，提示可能感染的是

- . 肺炎链球菌
- . 金葡菌

- . 冠状病毒
  - . 白色念珠菌感染
  - . 肺炎支原体感染
23. 抑制胃酸分泌最强的是
- . 奥美拉唑
  - . 法莫替丁
  - . 氢氧化铝镁
  - . 枸橼酸铋钾
  - . 硫糖铝
24. 有关直肠肛管脓肿错误的是
- . 多由肛腺或者肛窦感染引起
  - . 以肛门周围脓肿最常见
  - . 坐骨直肠窝脓肿很少见
  - . 骨盆直肠窝脓肿，全身中毒症状重
  - . 脓肿一旦形成，切开引流
- 25 猩红热的主要致病菌
- . 金黄色葡萄球菌
  - . A 组 B 溶血性链球菌
  - . B 组链球菌
  - . C 组链球菌
  - . 肺炎链球菌
26. 利尿剂的作用机制
- . 减少血容量
  - . 阻断 $\beta$ 受体
  - . 阻断 $\alpha$ 受体
  - . 阻滞钙通道
  - . 扩张小动脉
27. 采集的 24 小时尿标本正确的是
- . 早 7:00 至次晨 7:00
  - . 早 9:00 至次晨 9:00
  - . 早 11:00 至次日 9:00
  - . 晚 7:00 至次日晚 7:00
  - . 晚 11:00 至次日晚 11:00
28. 护士执业许可证变更的期限是
- . 1 年
  - . 3 年
  - . 5 年
  - . 10 年
  - . 15 年
29. 蜂窝性组织炎的选择抗生素的依据是
- . 感染发生的部位
  - . 感染严重程度
  - . 药物敏感试验结果
  - . 患者抵抗力

- . 病菌的种类
30. 肛周脓肿的病人在进手术室之前的表现
- . 兴奋
  - . 焦虑
  - . 烦躁
  - . 忧虑
  - . 愤怒
31. 下列属于侵犯患者隐私权的是
- . 未经患者许可对其体检时让医学生观摩
  - . 对疑难病例进行科室内讨论
  - . 在患者允许下将其资料用于科研
  - . 在患者病历上标记传染病符号
  - . 对患有淋病的患者询问其性生活史
32. 临产的最主要产力
- . 子宫收缩力
  - . 腹肌收缩力
  - . 膈肌收缩力
  - . 肛提肌收缩力
  - . 骨骼肌收缩力
33. 慢性阻塞性肺气肿病理改变不包括
- . 肺过度膨胀
  - . 外观黄白或者灰白
  - . 镜检可见肺大泡
  - . 肺血供增多
  - . 弹力纤维网损坏
34. 正常宫颈部上皮为
- . 单层立方上皮
  - . 单层柱状上皮
  - . 复层柱状上皮
  - . 复层鳞状上皮
  - . 单层鳞状上皮
35. 肺心病的预防不包括
- . 提倡戒烟
  - . 增强免疫力
  - . 减少有害物质吸收
  - . 预防感染
  - . 多睡少动
36. 最易发生阻塞性肺气肿的疾病是
- . 慢性支气管炎
  - . 支气管哮喘
  - . 慢性肺脓肿
  - . 支气管扩张
  - . 肺结核
37. 通过兴奋 B2 肾上腺素能受体缓解支气管痉挛的药物是

- . 氨茶碱
- . 麻黄素
- . 阿托品
- . 肾上腺素
- . 沙丁胺醇

38. 暴发性流脑病情危重，死亡率高，患者家属均可产生焦虑及恐怖心理，护士进行护理时，不妥的做法是

- . 镇静、守候在患者床前
- . 鼓励患者朋友、家人探视
- . 密切观察病情变化
- . 取得患者及家属的信赖
- . 做好安慰和解释工作

39. 《中华人民共和国献血法》规定我国实行

- . 有偿献血制度
- . 无偿献血制度
- . 自愿献血制度
- . 义务献血制度
- . 互助献血制度

40. 慢性肺心病患者的心理社会状况，评估内容不包括

- . 家庭角色和家庭关系变化
- . 经济问题
- . 社会孤立
- . 失业问题
- . 治疗方案

41 患者男，20岁，自述：“在天桥上看到火车开过来，浮现想跳下去自杀的念头，虽不伴有相应的行动，但却因此感到焦虑、紧张。护士评估时考虑为

强迫怀疑

强迫性穷思竭虑

强迫情绪

强迫意向

强迫行为

42 患者男，45岁，患十二指肠球部溃疡5年，近日原疼痛节律消失，变为持续性上腹痛，伴频繁呕吐隔夜酵酸性食物，最可能的并发症是

上消化道出血

溃疡穿孔

幽门梗阻

溃疡癌变

复合性溃疡

43 护士在为社区人群进行健康宣教，在下列人群中，可以指导其应用口服避孕药进行避孕的是

患有严重心血管疾病者

乳房有肿块者

甲状腺功能亢进者

患有慢性肝炎者

子宫畸形者

4410 月龄患儿，病毒性肠炎入院，不宜进食的食物有

41. 吸氧时流量为 3Lmin，其氧浓度为

- . 29%
- . 33%
- . 37%
- . 41%
- . 45%

42. 小儿的自我概念开始形成的时期是

- . 婴儿期
- . 幼儿期
- . 学龄前期
- . 学龄期
- . 青春期

43. 与婴幼儿智力发育密切相关的内分泌腺是

- . 下丘脑
- . 腺垂体
- . 神经垂体
- . 甲状腺
- . 胰腺

44. 判断小儿体格发育的主要指标是

- . 体重、身高
- . 牙齿、囟门
- . 运动发育水平
- . 语言发育水平
- . 智力发育水平

45. 目前医学界主张判断死亡的诊断标准是

- . 瞳孔散大固定
- . 各种反射消失
- . 呼吸住手
- . 心跳住手
- . 脑死亡

46. 心脏正常窦性心律起搏点

- . 心房
- . 窦房结
- . 房室束
- . 希氏束
- . 左心室

47. 对诊断不明急腹症禁用泻药的主要原因是

- . 易致感染扩散
- . 减少胃肠蠕动
- . 易致血压下降

- . 影响肠道消化吸收
  - . 易致水、电解质失衡
48. 在执行医疗护理中，护士有权拒绝执行医嘱的情况是
- . 护理程序繁琐
  - . 医嘱中需监测的生理指标太多
  - . 需要额外的劳动和付出费用太多
  - . 医嘱有误
  - . 接触被污染衣物
49. 护士工作中患血源性传染的最常见的病因
- . 针刺伤
  - . 侵袭性操作
  - . 接触被污染的体液
  - . 为污染伤口换药
  - . 接触污染衣物
50. 水痘皮肤病变的病理特征
- . 仅限粘膜
  - . 仅限表皮
  - . 仅限真皮
  - . 可侵及皮下组织
  - . 可侵及肌层
51. 对于需要静脉输液的成人，使用头皮针进行静脉穿刺时优先选择的血管是
- . 贵要静脉
  - . 头静脉
  - . 桡静脉
  - . 手背静脉网
  - . 肘正中静脉
52. 下列人员中，允许在医疗机构从事诊疗技术规范规定的护理活动的是
- . 护理学本科毕业未取得护士执业证书的护士
  - . 护士执业注册有效期满未延续注册的护士
  - . 工作调动，执业证书未变更执业地点的护士
  - . 工作十年，因故吊销执业证书的护士
  - . 取得执业证书 1 年，后出国留学 2 年再返回原医院的护士
53. 尿常规检查时，留取尿标本的时间正确的是
- . 饭前半小时
  - . 全天尿液
  - . 早晨第一次尿
  - . 随时采集
  - . 饭后半小时
54. 抢救时间记录不包括
- . 病人到达的时间
  - . 医生到达的时间
  - . 抢救措施落实时间
  - . 病情变化的时间
  - . 家属到达时间



55. 婴儿喂养最佳食品是

- . 纯母乳
- . 全脂奶粉
- . 母乳加奶粉
- . 母乳加辅食
- . 婴儿配方奶粉

56. 预防慢性肺阻塞疾病急性发作的措施不包括

- . 戒烟
- . 防止感冒
- . 合理膳食
- . 适当运动
- . 冬季住手一切户外运动

57. 心肺复苏，ABC 中的“A”指的是

- . 胸外人工按压
- . 人工呼吸
- . 清理呼吸道
- . 开放气道
- . 头部降温

58. 地高辛用于治疗心衰的主要药理作用是

- . 扩张冠状动脉
- . 增强心肌收缩力
- . 减轻心脏前负荷
- . 减少心律失常的发生
- . 降低心脏的传导性

59. 在护理实践中，“尊重原则”主要指尊重患者的

- . 健康
- . 家属
- . 个体差异
- . 自主性
- . 疾病

60. 肾病综合症最根本的病理生理改变是

- . 水肿
- . 高血压
- . 低蛋白血症
- . 大量蛋白尿
- . 高胆固醇血症

61. 正确测量胃管插入长度的方法是

- . 鼻尖到剑突
- . 眉心到剑突
- . 从眉心至胸骨柄
- . 从前发际至剑突
- . 从前发际至胸骨柄

62. 预防、医疗、保健机构发现艾滋病毒感染者时，以下措施不正确的是

- . 身体约束

- . 留院观察
  - . 赋予宣教
  - . 医学观察
  - . 定期不定期诊视
63. 患者男， 56 岁， 支气管哮喘发作， 呼吸艰难， 赋予体位
- . 半卧位
  - . 端坐卧位
  - . 中凹卧位
  - . 头高足底
  - . 头低足高位
64. 患者男， 35 岁， 右外踝软组织擦伤半天， 局部青紫、 肿胀， 应赋予
- . 热湿敷
  - . 冰袋冷敷
  - . 红外线灯
  - . 局部按摩
  - . 早期功能锻炼
65. 患者男， 68 岁， 48 小时前急性心梗入院， 现其病情稳定， 家属强烈要求探视， 但未到探视时间， 此时护士首先应
- . 请护士长出面调解
  - . 请主管大夫出面调解
  - . 向家属耐心解释， 取得家属理解
  - . 悄悄让家属进入病房
  - . 不予理睬
66. 护士对患抑郁症患者宣教， 患者情绪不耐烦， 此时护士最佳的反应是
- . “你该认真听讲， 不然你的病会更重的”
  - . “您不想听也行， 我陪您坐一会儿吧”
  - . “你这样孤傲对你没有好处， 这是为你好”
  - . “不听可不行， 护士长会检查的”
  - . “不想听也行， 我把宣传资料放在这里， 一会您自己看”
67. 患者男， 肾衰竭住院， 护士观察其 24 小时尿量为 360ml， 其排尿状况是
- . 正常
  - . 尿量减少
  - . 无尿
  - . 少尿
  - . 尿潴留
68. 患者男得知自己患淋巴瘤后情绪易怒， 且有时会拒绝治疗， 此时护士沟通应避免
- . 为他提供发泄的机会
  - . 倾听了解他的感受
  - . 患者拒绝治疗时， 对其进行批评
  - . 及时满足患者的合理需求
  - . 对其不合理情绪表示理解
69. 患者男， 25 岁， 肺炎入院治疗， 患者入病区后， 护士的初步护理工作不包括
- . 迎接新病人
  - . 通知病区医生

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/938122071055006034>