

2023 年宁夏中西医执业医师考试真题卷(4)

本卷共分为 1 大题 50 小题，作答时间为 180 分钟，总分 100 分，60 分及格。

一、单项选择题（共 50 题，每题 2 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1. 流行性出血热治疗原则中的“三早一就”不包括

- A. 早发现
- B. 早休息
- C. 早诊断
- D. 早治疗
- E. 就近治疗

2. 循行“入上齿中”的经脉是

- A. 足太阴脾经
- B. 手阳明大肠经
- C. 足阳明胃经
- D. 足厥阴肝经
- E. 手太阴肺经

3. 既能治疗崩漏，又能治疗疝气的穴位是

- A. 隐白
- B. 归来
- C. 大敦
- D. 横骨
- E. 太冲

4. 属于同名经配穴的是

- A. 耳鸣取外关、中渚
- B. 眩晕取百会、足三里
- C. 头痛取风池、足临泣
- D. 肝气郁结证取太冲、内关
- E. 便秘取支沟、天枢

5. 前正中线上，脐上 4 寸，或脐与胸剑联合连线的中点处的腧穴是

- A. 中极
- B. 关元
- C. 中脘
- D. 气海
- E. 神阙

6. 一般认为 SARS 的传播途径不包括

- A. 飞沫传播
- B. 接触传播
- C. 呼吸道传播
- D. 实验室传播
- E. 蚊虫叮咬

7. AIDS 的原发病变是

- A. 淋巴组织的病变
- B. 无菌性脑膜炎
- C. 卡波济肉瘤
- D. 亚急性脑病
- E. 空洞性脊髓病

8. 针灸治疗缺乳的主穴是

- A. 乳根、足三里、脾俞
- B. 乳根、膻中、少泽
- C. 乳根、内关、太冲
- D. 膻中、期门、肝俞
- E. 肝俞、膈俞、足三里

9. 起于中焦，下络大肠的经脉是

- A. 手太阴肺经
- B. 手阳明大肠经
- C. 足太阴脾经
- D. 足阳明胃经
- E. 手少阴心经

10. 三棱针挑刺法常用于治疗

- A. 肩周炎、胃痛
- B. 急性吐泻
- C. 局部瘀血、水肿
- D. 咽喉肿痛
- E. 扭挫伤

11. 阴郄穴的定位是

- A. 腕横纹上 1 寸，尺侧腕屈肌腱的桡侧缘
- B. 屈肘，在肘横纹内侧端与肱骨内上髁连线的中点处
- C. 腕横纹上 0.5 寸，尺侧腕屈肌腱的桡侧缘
- D. 腕横纹尺侧端，尺侧腕屈肌腱的桡侧凹陷处
- E. 小指桡侧指甲根角旁 0.1 寸

12. 对提插补泻法中补法的操作，叙述错误的是

- A. 先浅后深

- B. 轻插重提
- C. 提插幅度小，频率慢
- D. 操作时间短
- E. 以下插用力为主

13. 某女，患流行性出血热 1 周，24 小时尿量 100ml，心率 118 次/分，血压 164/100mmHg，伴有头痛、喷射性呕吐，心烦。以上症状、体征为

- A. 心力衰竭的表现
- B. 小脑扁桃体疝所致
- C. 颅压升高引起
- D. 高血容量综合征的表现
- E. 血钾升高的表现

14. 某女，26 岁。持续高热 4 天，体温 39.6℃，乏力，肝脏于右侧肋下 1.5cm 可触及，血常规：WBC $2.7 \times 10^9/L$ ，N 0.55；HBsAg(-)；肥达反应“O” 1:160，“H” 1:160。此患者最可能的诊断是

- A. 急性食物中毒
- B. 急性细菌性痢疾
- C. 疟疾
- D. 伤寒

E. 急性病毒性肝炎

15. 某男，40 岁。HBsAg(+)6 年，常有全身乏力感、食欲不振，有助于确诊的检查是

A. 腹部 B 超检查

B. 腹部 CT 检查

C. HBV-DNA

D. 肝功能

E. 病原学检查及肝功能

16. 5 岁男孩，7 月下旬急性发病，高热、抽搐，粪便镜检有白细胞，诊断应首先考虑

A. 霍乱

B. 阿米巴痢疾

C. 细菌性食物中毒

D. 乙型脑炎

E. 中毒型菌痢

17. 女性，35 岁。低热、多关节肿痛、双侧胸腔积液、蛋白尿(+)半年，血清学检查 ANA(+), 抗 SSA(+), 抗 Sm(+). 首选治疗的药物应是

A. 阿司匹林

- B. 扑热息痛
- C. 糖皮质激素
- D. 免疫抑制剂
- E. 糖皮质激素加免疫抑制剂

18. 男性，30岁。近7年来常有空腹痛和夜间痛，服用制酸剂可使腹痛减轻，1h前餐后突感上腹持续性剧痛入院，该病人目前的诊断是

- A. 胃穿孔
- B. 十二指肠溃疡穿孔
- C. 肠梗阻
- D. 胃炎
- E. 肠痉挛

19. 女，32岁，多次血压测量，上肢血压130/80mmHg、下肢血压120/70mmHg，应考虑为

- A. 主动脉缩窄
- B. 主动脉瓣狭窄
- C. 正常人
- D. 主动脉瓣关闭不全
- E. 心包积液

20. 某女，47 岁。一年前患者出现月经周期紊乱，心悸汗出等症，近 3 月来患者逐渐出现情绪低落，对任何事情都漠不关心，并出现自杀倾向，考虑诊断为更年期抑郁症，应给的治疗药物是

- A. 氯丙嗪
- B. 丙咪嗪
- C. 雌激素
- D. 地西洋
- E. 阿托品

21. 某男，19 岁。左小腿近端疼痛，左小腿正侧位片显示：左侧胫骨干骺端骨质密度增高，骨纹理观察不清，外侧骨皮质骨质破坏，并见放射状层状骨膜反应，局部软组织肿胀，最可能的诊断是

- A. 骨肉瘤
- B. 骨软骨瘤
- C. 骨结核
- D. 急性骨髓炎
- E. 骨巨细胞瘤

22. 某女，44 岁。患风湿性心脏病并二尖瓣狭窄，慢性心功能不全 II 度。3 天前患者因呼吸道感染，出现心悸、气短及

双下肢凹陷性水肿，在抗感染的基础上，还应该配合使用的药物是

- A. 阿司匹林
- B. 卡托普利
- C. 奎尼丁
- D. 氢氯噻嗪
- E. 泼尼松

23. 某女，27岁。有性乱史。近2周来，持续发热，伴有头痛、咽喉痛、全身乏力感。查体：体温38.5℃，双侧颌下、腋下淋巴结肿大，肝脏右侧肋下1cm可触及。血清学检测：HIVp24(+)，抗-HIV(-)，本例患者最可能的诊断是

- A. 艾滋病急性感染期
- B. 艾滋病无症状感染期
- C. 艾滋病前期
- D. 艾滋病期
- E. 艾滋病潜伏期

24. 男性患者，55岁，体胖诊为2型糖尿病，经饮食治疗和运动锻炼，2个月后查空腹血糖为8.8mmol/L，餐后2小时血糖13.0mmol/L。进一步治疗应选择

- A. 加磺脲类降血糖药物

- B. 加双胍类降血糖药物
- C. 加胰岛素治疗
- D. 加口服降血糖药和胰岛素
- E. 维持原饮食治疗和运动

25. 某男，45 岁。近日发现粪便色黑，伴不规则上腹痛。近半年来明显消瘦。应首先考虑的是

- A. 消化性溃疡病
- B. 胆管感染合并出血
- C. 胃癌
- D. 血小板减少性紫癜
- E. 肝硬化

26. 某女，35 岁。因过量服用镇静剂致血压降至 66/40mmHg，给予去甲肾上腺素静滴治疗，输液过程中患者抗拒治疗，使药液渗漏出血管，这时的处理方法是

- A. 50%硫酸镁溶液湿敷
- B. 酚妥拉明局部浸润注射
- C. 温盐水浸泡出血部位
- D. 给予立止血注射
- E. 以上都不对

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/938132070037006047>