

皮肤与性病学主治医师：相关专业知识与专业知识题库考点

1、单选 患者，女性，18岁。面部、手背部皮疹10余年，不痛不痒，日晒后加重。查体：面部、手背部可见散在的米粒大的淡褐色的斑疹。目前不适当的处理是（）。

- (江南博哥) A. 避免日光照射
B. 外用2%~3%氢醌霜
C. 液氮冷冻
D. Alex755nm 激光
E. 外用化学剥脱剂

正确答案：E

2、单选 有关淋病的治疗，下列错误的是（）。

- A. 头孢曲松钠对淋菌性咽炎疗效较好
B. 妊娠期梅毒用喹诺酮类和四环素类药物
C. 新生儿淋菌性眼炎的治疗中单剂头孢曲松钠的剂量不能超过125mg
D. 淋菌性脑膜炎的疗程应满2周，心内膜炎的疗程应满4周
E. 治疗淋球菌性盆腔炎时，除应用头孢曲松钠外，还同时口服甲硝唑或多西环素

正确答案：B

参考解析：大观霉素对淋菌性尿道炎、宫颈炎、直肠炎疗效较好，头孢曲松钠对淋菌性咽炎疗效较好。

3、单选 病理上典型的角化珠的改变见于（）。

- A. 黑素瘤
B. 组织细胞病
C. 鳞状细胞癌
D. 蕈样肉芽肿
E. 基底细胞瘤

正确答案：C

4、单选 调节上皮细胞的生成和分化的是（）。

- A. 维A酸
B. 烟酰胺
C. 伊曲康唑
D. 氯喹
E. 阿昔洛韦

正确答案：A

5、单选 婴儿湿疹的皮损特点是（）。

- A. 丘疱疹、糜烂
B. 扁平小丘疹，有少许鳞屑
C. 丘疱疹和糜烂，结黄色干痂

D. 毛囊性红丘疹，覆有油腻性鳞屑

E. 薄壁的脓疱，疱周绕以红晕

正确答案：C

参考解析：婴儿湿疹初发皮损为对称性分布的红斑，后期逐渐出现丘疹、丘疱疹、水疱，常因搔抓、摩擦导致水疱破损，形成渗出性糜烂面，水疱干枯后形成黄色痂皮。

6、单选 患者，女性，43岁。面部、肩背部、双侧前臂皮肤肿胀发硬2个月。发病前无发热、咽痛病史。病程中无关节痛，无肌肉酸痛，无张口困难和呼吸受限。既往体健，无糖尿病病史。有躯干、四肢“湿疹”1个月，予“皿治林、去炎松尿素霜”治疗后皮疹消退。家族中无类似病史。皮肤科专科检查：面部、肩背部、双侧前臂皮肤明显肿胀发硬，肿胀为非凹陷性，与周围皮肤界限不清。皮损表面为正常肤色，无萎缩和溃疡，捏压皮肤时可发皱。肩背部对称性、充血性红斑，散在抓痕、结痂。该病多发于感染后，以下哪种病原体感染最常见（）。

A. 金葡菌

B. 链球菌

C. 淋球菌

D. 柯萨奇病毒

E. 白色念珠菌

正确答案：B

7、单选 关于儿童型皮肌炎，错误的是（）。

A. 在皮肤、皮下组织关节附近及病变肌肉处易见钙质沉积

B. 合并恶性肿瘤者较少

C. 预后较成人差

D. 60%的儿童型皮肌炎患者可有低滴度的ANA

E. 雷诺现象少

正确答案：C

参考解析：与成人皮肌炎相比，儿童型皮肌炎较少伴发恶性肿瘤，易发生皮肤、皮下组织、关节周围及肌肉的钙沉积，雷诺现象少见。

8、单选 有助于黄瘤诊断的辅助检查不包括（）。

A. 冷冻切片苏丹红染色

B. 血脂检查

C. 脂蛋白电泳

D. 免疫球蛋白测定

E. 血液涂片查泡沫细胞

正确答案：E

参考解析：黄瘤病的皮损组织病理可检见泡沫细胞，而非血液涂片

9、单选 甲癣口服药治疗，由于用药时间较长，在治疗期间最需检查（）。

- A. 血常规
- B. 肝功能
- C. 肾功能
- D. 尿常规
- E. 凝血象

正确答案：B

参考解析：甲癣口服药有肝功能损害的副作用。

10、单选 下列不是慢性光化性皮炎诊断依据的是（）。

- A. 持久性皮炎或湿疹性皮炎
- B. 可伴有浸润性丘疹或斑块，主要累积于曝光区
- C. 光激发试验或光斑试验可呈阳性
- D. 皮肤划痕试验阳性
- E. 组织病理为慢性湿疹或假性淋巴瘤改变

正确答案：D

参考解析：慢性光化性皮炎诊断依据：持久性皮炎或湿疹性皮炎，可伴有浸润性丘疹或斑块，主要累积于曝光区，光激发试验或光斑试验可呈阳性，组织病理为慢性湿疹或假性淋巴瘤改变。

11、单选 下列疾病不伴有掌跖角化的是（）。

- A. 角化型足癣
- B. 板层状鱼鳞病
- C. 毛发红糠疹
- D. 掌跖慢性湿疹
- E. 毛周角化

正确答案：E

12、单选 下列有关红斑肢痛病的叙述不正确的是（）。

- A. 是一种少见的阵发性血管扩张性疾病
- B. 分为原发性和继发性两种
- C. 多发生于40岁以前
- D. 具有遗传现象
- E. 口服小剂量阿司匹林可使发作减轻

正确答案：C

13、单选 患者，男性，30岁。系“发热伴全身皮疹1天，突发晕厥5分钟”就诊。患者1天前出现全身大小不等红色不规则皮疹，时起时消，伴瘙痒感，同时伴有38~39℃发热，无咳嗽腹泻，5分钟前突然出现面色苍白、出冷汗，随即意识丧失，被急诊抬入门诊。查体：T38.3℃，心率120次/分，BP70/45mmHg，呼吸急促，神志不清，唤无应答，四肢厥冷，全身见大小不等鲜红色风团，融、合成片状，血常规提示：WBC $10.5 \times 10^9/L$ ，N80.6%。有关该种休克，不对的是（）。

- A. 外周血管扩张
- B. 毛细血管床容积减小
- C. 通透性增加
- D. 血浆外渗
- E. 心排出量下降

正确答案： B

14、单选 花斑癣表现为（）。

- A. 炎症性红斑
- B. 非炎症性红斑
- C. 出血斑
- D. 色素沉着斑
- E. 色素减退斑

正确答案： E

15、单选 Kogoj 海绵状微脓肿常见于（）。

- A. 寻常型银屑病
- B. 关节病型银屑病
- C. 脓疱型银屑病
- D. 红皮病型银屑病
- E. 红皮病

正确答案： C

16、单选 患者，男，23岁。尿道分泌物伴尿道刺痒3天。发病10天前有不洁性交史。体格检查：尿道口轻度红肿，可挤出少量乳白色稀薄分泌物。若无实验室条件进行病原学检查，该患者诊断应首先考虑的是（）。

- A. 急性淋病
- B. 急性细菌性前列腺炎
- C. 白念珠菌感染
- D. 衣原体性尿道炎
- E. 急性淋病合并非淋菌性前列腺炎

正确答案： D

17、单选 患者，女，27岁。肛周新生物1个月。体格检查：肛周见2个红色斑块，略高出皮面，大小分别为1.5cm×1.5cm和2cm×2cm，表面湿润。该患者诊断首先考虑（）。

- A. 尖锐湿疣
- B. 肛周脓肿
- C. 肛周囊肿
- D. 扁平湿疣
- E. 鳞状细胞癌

正确答案： D

18、单选 与血管发育异常或血管增生无关的疾病是（）。

- A. 鲜红斑痣
- B. 草莓状血管瘤
- C. 老年性血管瘤
- D. 血管角皮瘤
- E. 皮肤纤维瘤

正确答案：E

参考解析：鲜红斑痣、草莓状血管瘤、海绵状血管瘤均系因先天性血管发育畸形或血管内皮细胞增生而形成的良性肿瘤，其中鲜红斑痣和海绵状血管瘤属于先天性发育畸形，草莓状血管瘤为一种真性毛细血管内皮细胞增生瘤。血管角皮瘤为一组伴有角化过度的皮肤毛细血管腔的扩张，不伴有血管内皮细胞增生，部分患者与遗传有关。皮肤纤维瘤为真皮成纤维细胞和胶原纤维增生而形成的良性瘤，可能是一种皮肤反应性增生性炎症，一般无血管内皮细胞增生，也与血管发育异常无关。

19、单选 黄癣菌感染用 Wood 灯照射后呈（）。

- A. 珊瑚红色
- B. 亮绿色
- C. 暗绿色
- D. 无荧光
- E. 棕色

正确答案：C

参考解析：真菌感染用 Wood 灯照射后，如铁锈色小孢子菌、羊毛状小孢子菌和石膏样小孢子菌为亮绿色荧光；黄癣菌为暗绿色荧光；花斑癣菌为棕色荧光；紫色毛癣菌和断发毛癣菌无荧光。

20、单选 有关女性淋病的临床表现错误的是（）。

- A. 症状较轻，急、慢性症状不易区分
- B. 宫颈内膜、尿道是最常见的受累部位
- C. 如直肠、咽部出现感染，则症状较男性明显
- D. 盆腔炎患者发生宫外孕概率高
- E. 急性感染者常于性交后 2~5 天出现尿道刺激症状

正确答案：C

参考解析：女性直肠、咽部出现感染，症状较轻。

21、单选 患者，女性，36 岁。主因发现外阴部皮疹 2 个月余就诊。近期内白带较多，皮损处不痛不痒，否认不洁性接触史。查体：小阴唇内侧可见针尖至粟粒大小的近肤色的小丘疹，散在的息肉状小丘疹呈线状排列，呈绒毛状外观。本病具有的特征是（）。

- A. 好发于小阴唇内侧及阴道前庭
- B. 多伴有念珠菌性阴道炎

- C. 无不洁性接触史
- D. 醋酸白试验阴性
- E. 以上均是

正确答案： E

22、单选 导致表皮松解性掌跖角化病的临床表现较轻的突变基因是（）。

- A. 连接蛋白 26
- B. 兜甲蛋白
- C. 角蛋白 1
- D. 角蛋白 9
- E. 角蛋白 14

正确答案： C

23、单选 患者，女性，17岁。右侧面部起皮疹3年。3年前无明显诱因下于右侧眼睛周围出现褐青色斑，逐渐扩大。查体：右侧上下眼睑、额头部、颧部青灰色斑片，右侧巩膜轻度变蓝。最可能的诊断是（）。

- A. 黄褐斑
- B. 蓝痣
- C. 太田痣
- D. 咖啡斑
- E. 蒙古斑

正确答案： C

24、单选 Hailey-Hailey病的基因定位于（）。

- A. 3q21-q22
- B. 2q33-q35
- C. 1q21
- D. 1q25-1q32
- E. Xq22.3

正确答案： A

25、单选 患者，男性，20岁。主诉面部皮疹反复发作4年余，时轻时重。查体：面部油脂分泌较多，可见红色丘疹、粉刺、脓肿、结节，凹陷性瘢痕。为控制疾病的发作，平日应注意（）。

- A. 少食辛辣、油腻食物
- B. 使用温水洗脸
- C. 不使用粉质化妆品
- D. 不使用油质化妆品
- E. 以上均正确

正确答案： E

26、单选 患者，男性，34岁。因全身红斑，继发水疱和大疱1周入院。皮疹发生前2个月车祸伤致外伤性癫痫，口服卡马西平2周。T38.9℃，血压110/76mmHg，心率108次/分。专科检查：面、颈、躯干和四肢大片状红斑、丘疹，并见密集分布于躯干和四肢的水疱和大疱，并见部分血疱。尼氏征阳性。眼结膜、口腔黏膜、肛门和外生殖器黏膜见糜烂，阴囊糜烂渗出明显。该患者最先考虑的诊断是（）。

- A. 斑疹-丘疹型多形红斑
- B. 水疱-大疱型多形红斑
- C. Steven-Johnson 综合征
- D. 寻常型天疱疮
- E. 疱疹样皮炎

正确答案：C

27、单选 1982年ARA修订的SLE11项诊断标准中，可诊断SLE需同时或相继出现（）。

- A. 3项
- B. 4项
- C. 5项
- D. 6项
- E. 7项

正确答案：B

28、单选 患者，女性，32岁。全身泛发性风团3个月，难自行消退，触之有浸润感，皮损消退后遗留色素沉着，自觉局部有烧灼感，伴有不规则发热、关节疼痛，血常规提示WBC $9 \times 10^9/L$ 、N92%、L7%、PLT $230 \times 10^9/L$ 。ESR42mm/h，血清C3、C4低于正常水平。此病组织病理学特征性改变为（）。

- A. 白细胞碎裂性血管炎
- B. 白细胞和淋巴细胞碎裂性血管炎
- C. 淋巴细胞碎裂性血管炎
- D. 真皮浅层的毛细血管和细小血管的内皮细胞肿胀，管腔闭塞，血管壁有纤维蛋白沉积、变性和坏死
- E. 真皮浅层毛细血管和小血管炎

正确答案：A

29、单选 雷诺现象和雷诺病的病理生理机制为何种血管痉挛产生（）。

- A. 小动脉
- B. 小静脉
- C. 毛细血管
- D. 中动脉
- E. 大静脉

正确答案：A

30、单选 下列痤疮愈后不留瘢痕的是（）。

A. 聚合性痤疮

- B. 结节性痤疮
- C. 囊肿性痤疮
- D. 坏死性痤疮
- E. 以上都不是

正确答案：E

31、单选 盘状红斑狼疮常见（）。

- A. 角化过度
- B. 角化不全
- C. 角化不良
- D. 毛囊角质栓
- E. 疣状增生

正确答案：D

参考解析：角化过度指角质层过度增厚，如颗粒层和棘层相应增厚，则是扁平苔藓；如颗粒层和棘层并不随之增厚，则是寻常型鱼鳞病。角化不全指角质层内有细胞核残留。角化不良指棘层及颗粒层个别或小群角质形成细胞提前异常角化。

32、单选 患者，女性，30岁，妊娠4个月。躯干皮疹伴阵发性剧痒2周，以夜间为重。专科检查：躯干散在粟粒至绿豆大小丘疹，见线状抓痕和少许血痂。该患者最可能的诊断是（）。

- A. 局限性瘙痒症
- B. 丘疹性荨麻疹
- C. 妊娠性瘙痒症
- D. 妊娠疱疹
- E. 疥疮

正确答案：C

33、单选 下列不是界线类偏瘤型麻风表现的是（）。

- A. 皮损似瘤型，有斑疹、斑块、浸润、丘疹和结节
- B. 皮损分布广泛，部分皮损中央可见“打洞区”；面部皮损可形成“狮面”
- C. 受累神经有对称倾向，质较软，较均匀一致
- D. 查菌强阳性、麻风菌素试验强阳性
- E. 皮损虽多发但不对称，多数皮损疹龄不长

正确答案：D

34、单选 关于疱疹样皮炎的叙述，不正确的为（）。

- A. 可能是遗传易感性的免疫病
- B. 皮疹对称发生于四肢伸侧
- C. 尼氏征阴性
- D. 治疗首选免疫抑制剂
- E. 免疫病理提示真皮乳头层及基底膜带有颗粒状 IgA 沉积

正确答案： D

35、单选 生殖器疱疹主要是哪种病毒感染（）。

- A. HSV1
- B. HSV2
- C. HPV6
- D. HPV1
- E. HPV11

正确答案： B

参考解析：生殖器疱疹主要为 HSV2（约占 90%）感染。

36、单选 关于一期梅毒，错误的是（）。

- A. 一般患者起病前有不洁性交史
- B. 潜伏期 2~4 周
- C. 硬下疳是主要的表现
- D. 在硬下疳处取材以暗视野检查可见苍白螺旋体
- E. 梅毒血清试验阴性可排除一期梅毒

正确答案： E

参考解析：梅毒早期血清学试验可为阴性。

37、单选 患者，男，43 岁。10 余年前每于夏季在腹股沟、大腿内侧、腋下出现皮疹，主要表现为红斑、小水疱，自觉瘙痒，抓挠后有渗出。一般夏季加重，冬季缓减，每年反复发作。其父有类似病史。皮科情况：双腋下 0.5cm×1.0cm~1.0cm×2.0cm 大小红斑，无糜烂及渗液；双大腿根部内侧大片红斑，中央糜烂渗液，有异味。红斑边缘见黄豆大水疱，壁松弛，疱液混浊，尼氏征阳性。根据以上病史及临床表现该病可诊断为（）。

- A. 寻常性天疱疮
- B. 大疱性类天疱疮
- C. 家族性慢性良性天疱疮
- D. 疱疹样天疱疮
- E. 湿疹

正确答案： C

38、单选 各种类型的头癣使用 Wood 灯检查结果正确的是（）。

- A. 白癣为黄色荧光
- B. 黑点癣为土灰色荧光
- C. 白癣为无荧光
- D. 黄癣为无荧光
- E. 黄癣为暗绿色荧光

正确答案： E

39、单选 下列描述化脓性汗腺炎错误的是（）。

- A. 好发于腋部和会阴部

- B. 表现为皮下结节，有疼痛或压痛
- C. 可形成脓肿、瘘管、窦道
- D. 与遗传无关
- E. 与聚合型痤疮、穿凿型毛囊炎统称为毛囊闭锁三联症

正确答案：D

40、单选 患者，男性，45岁。系双侧小腿伸侧对称分布的皮损5年。自觉瘙痒明显，皮损多为褐红或褐黄色圆锥形丘疹，呈绿豆大。质地坚硬，孤立散在。部分排列成念珠状，组织病理提示为大量的淀粉样物质沉积于表皮和真皮。有关此病的治疗应除外（）。

- A. 外用糖皮质激素
- B. 冷冻
- C. 口服维A酸
- D. 试用青霉胺
- E. 加强抗感染治疗

正确答案：E

41、单选 对固定型药疹下列说法不恰当的是（）。

- A. 是特定药物引起的药疹
- B. 停药致敏药物后可以痊愈
- C. 边界清楚的红斑
- D. 经常发作可使病变数增加
- E. 有水疱发生

正确答案：A

42、单选 患者女，32岁。小阴唇内侧密集小丘疹，表面光滑，不融合，呈“鱼子状”，自觉症状缺如，醋酸白试验（-），应诊断为（）。

- A. 尖锐湿疣
- B. 扁平湿疣
- C. 生殖器疱疹
- D. 女阴假性湿疣
- E. 鳞癌

正确答案：D

参考解析：女性假性湿疣表现为小阴唇内侧密集小丘疹，呈鱼子状，无自觉症状，醋酸白试验阴性。

43、单选 服用或接触含有某些光敏感性物质的蔬菜后，并经受日晒后引起的急性光毒性炎症反应称（）。

- A. 慢性光化性皮炎
- B. 日晒伤
- C. 植物-日光性皮炎
- D. 多形性日光疹

E. 夏季皮炎

正确答案：C

参考解析：植物-日光性皮炎是患者过多服用或接触含有某些光敏感性物质的蔬菜后，并经日晒后引起的急性光毒性炎症反应。

44、单选 患者，女性，24岁。双下肢遇冷后出现大理石样纹，部分皮肤呈斑点状红斑，自觉双下肢刺痛感间或麻木感，保暖后症状缓解。系统性检查无异常。双侧足趾冬季易发冻疮，血尿常规检查无异常，免疫系统检查正常。下列治疗方案不适合于此病治疗的是（）。

- A. 注意保暖
- B. 早期足量应用糖皮质激素
- C. 应用扩血管药物
- D. 降低血液黏稠度
- E. 如合并基础疾病应予以积极治疗

正确答案：B

45、单选 患者，女性，20岁。反复头面、四肢皮疹伴痒2个月余，加重3天。患者反复于头面、四肢出现红斑、丘疹、丘疱疹等皮疹，自用激素类药膏外涂后可减轻，但易反复。3天前饮酒后皮疹再次加重伴剧烈瘙痒。查体：头面、四肢、手等部位对称性红斑、丘疹、丘疱疹、抓痕，耳垂、手部大量渗出。若治疗处理不当，疾病可能的转归方式不包括（）。

- A. 继发感染
- B. 慢性湿疹
- C. 湿疹样皮炎
- D. 脓疱疮
- E. 苔藓化

正确答案：D

46、单选 患者，女性。反复手掌处皮疹数年伴痒，每于夏季加重，冬季缓解，病程中不伴有甲损害及脓疱发生。查体：双手掌对称性角化、脱屑、肥厚，边界不清。排除真菌感染，患者最可能的诊断是（）。

- A. 掌跖脓疱病
- B. 光化性皮炎
- C. 慢性湿疹
- D. 胼胝
- E. 掌跖角化病

正确答案：C

47、单选 银屑病皮损好发于（）。

- A. 四肢伸侧
- B. 面部
- C. 四肢屈侧

D. 掌跖部

E. 阴囊

正确答案：A

48、单选 患者，女性。双侧内眦部位皮疹3年，且逐渐增多。皮疹对称性分布，呈扁平柔软表面黄色小丘疹。组织病理提示真皮内多数胞质充满脂质微粒的单核或多核泡沫细胞及巨细胞。有关此病的治疗应除外（）。

A. 激光

B. 冷冻

C. 手术

D. 电凝

E. 口服维A酸

正确答案：E

49、单选 急性湿疹的好发部位是（）。

A. 耳后

B. 颈部

C. 胸部

D. 背部

E. 四肢

正确答案：A

50、单选 下列不属于梅毒实验室诊断方法的是（）。

A. 血清不加热的反应素试验

B. VDRL 试验

C. 胶体金试验

D. 快速血浆反应素环状卡片试验

E. 墨汁试验

正确答案：E

参考解析：血清不加热的反应素试验、VDRL 试验、快速血浆反应素环状卡片试验都是梅毒血清试验，胶体金试验为诊断神经梅毒脑脊液检查所用的方法。

51、单选 慢性湿疹最需鉴别的疾病是（）。

A. 荨麻疹

B. 慢性单纯性苔藓

C. 急性湿疹

D. 特应性皮炎

E. 药疹

正确答案：B

52、单选 属于皮肤的原发性损害的是（）。

A. 风团

B. 瘢痕

- C. 苔藓样变
- D. 糜烂
- E. 溃疡

正确答案：A

参考解析：皮肤原发性损害包括斑疹、丘疹、斑块、结节、水疱 / 大疱、脓疱、风团、囊肿。

53、单选 着色性干皮病的特征，除外（）。

- A. 光敏感
- B. 色素改变
- C. 皮肤过早老化
- D. 癌变
- E. 毛发增加

正确答案：E

54、单选 患者，女性，65岁。全身皮疹反复发作30年，近半年来皮损加重。患者既往诊断银屑病予外用药物治疗，具体不详。2年前间断口服泼尼松治疗，皮损控制不理想，于半年前自行停用。系统检查：急性病容，T38.7，脉搏98次/分，轻度库欣面容。专科检查见颜面、躯干和双大腿大片状潮红斑，见细碎鳞屑。头皮见斑丘疹，伴厚层鳞屑，四肢散在斑丘疹、丘疹，其上附着鳞屑。为控制皮损和全身症状，临床上最佳的选择是（）。

- A. 免疫抑制剂联合PUVA
- B. 系统应用糖皮质激素
- C. 干扰素联合免疫抑制剂
- D. 维A酸类药物联合全舱窄谱中波紫外线
- E. 加强外用药物联合全舱窄谱中波紫外线

正确答案：D

55、单选 患者，男性，24岁。主因发现阴茎部皮疹1天就诊。患者在洗澡时发现冠状沟处皮疹，不痛不痒，否认不洁性接触史。查体：冠状沟处可见针尖大小、表面光滑的乳白色小丘疹，直径1~2mm，圆顶状，呈线状排列。最可能的诊断是（）。

- A. 尖锐湿疣
- B. 皮脂腺异位症
- C. 鲍温样丘疹病
- D. 阴茎珍珠样丘疹病
- E. 假性湿疣

正确答案：D

56、单选 女，20岁。因掌跖皮肤出现红斑、增厚18年伴部分末端指（趾）节畸形、溃疡8年余。系统查体未见明显异常。皮肤科检查：手部见弥漫性红斑、增厚伴手指畸形外观，中指伸侧有蜂窝状凹陷。双手拇指关节处见海星状角化。双足跖弥漫性角化增厚并有皲裂、糜烂伴恶臭，角化增厚边缘附黄色厚鳞屑，第一趾和第二趾可见甲变形、甲分离和混浊。组织病理示：表皮明显角化过度，颗粒层、棘层肥厚，表皮突延长，真皮可见少量炎性细胞浸润，皮下脂肪组织大致正常。引起该病的基因突变是（）。

- A. 角蛋白1
- B. 连接蛋白26
- C. 角蛋白9
- D. 跨膜蛋白
- E. 桥粒斑蛋白

正确答案：B

57、单选 尖锐湿疣（）。

- A. 梅毒螺旋体直接检查
- B. TPPA
- C. RPR
- D. 醋酸白试验
- E. 毛滴虫检查

正确答案：D

58、单选 下列不属于银屑病临床分型的是（）。

- A. 寻常型
- B. 脓疱型
- C. 关节病型
- D. 斑块型
- E. 红皮病型

正确答案：D

参考解析：银屑病的临床分型为寻常型、脓疱型、关节病型和红皮病型。

59、单选 梅毒治疗的首选药物是（）。

- A. 螺旋霉素
- B. 青霉素
- C. 四环素
- D. 庆大霉素
- E. 氯霉素

正确答案：B

60、单选?对痤疮瘢痕治疗无效的为（）。

- A. 糖皮质激素局封
- B. 磨削术

- C. 激光
- D. 口服抗生素药物
- E. 美容手术

正确答案：D

61、单选 不符合寻常型银屑病的临床表现是（）。

- A. 银白色鳞屑
- B. 束状发
- C. 甲板顶针状凹陷
- D. 消退期常见 Koebner 现象
- E. 多数患者病情冬重夏轻

正确答案：D

62、单选 患者，女性，30岁。双侧手指皮疹反复发作数年，自觉瘙痒及烧灼感，多于春末夏初发病，夏季加重，伴有多汗现象。查体：双手指侧面、指端散在分布位于表皮深部的米粒大小圆形小水疱，部分皮肤伴有领圈状脱屑。关于汗疱疹的可能发病原因不包括（）。

- A. 精神因素
- B. 胃肠功能紊乱
- C. 接触刺激物品
- D. 汗腺受侵，汗液潴留
- E. 镍镉等金属的系统性过敏

正确答案：D

63、单选 患者，女性，18岁。右侧躯干可见一10cm长褐色扁平皮损，表面角化、粗糙。2岁发病，近期发展较快。该患者诊断应首先考虑（）。

- A. 表皮痣
- B. 脂溢性角化病
- C. 皮角
- D. 鳞状细胞癌
- E. 汗管瘤

正确答案：A

64、单选 下列念珠菌对氟康唑天然耐药的是（）。

- A. 近平滑念珠菌
- B. 热带念珠菌
- C. 白色念珠菌
- D. 克柔念珠菌
- E. 都柏林念珠菌

正确答案：D

65、单选 毛发上皮瘤的好发部位是（）。

- A. 鼻唇沟
- B. 眼睑部位
- C. 腋下
- D. 外阴部位

E. 手足部位

正确答案：A

66、单选 对人而言，HLA 抗原属于（）

- A. 异种抗原
- B. 改变的自身抗原
- C. 同种异型抗原
- D. 隐蔽抗原
- E. 异嗜性抗原

正确答案：C

67、单选 下列有关急性和慢性包皮龟头炎的描述，其中错误的是（）。

- A. 急性包皮龟头炎通常自冠状沟起病，然后扩展到龟头及包皮内侧
- B. 急性包皮龟头炎的皮损表现为红斑、水肿，常伴有黏液性渗出
- C. 慢性包皮龟头炎包括糖尿病性包皮龟头炎、念珠菌性龟头炎、环状糜烂性龟头炎等
- D. 念珠菌性龟头炎患者有烧灼、疼痛感，伴剧烈瘙痒
- E. 对严重的持续性念珠菌性龟头炎患者，应做血糖、尿糖和糖耐量试验，检查是否患有糖尿病

正确答案：D

参考解析：念珠菌性龟头炎的症状为烧灼、疼痛感，但瘙痒程度较轻。

68、单选 下列疾病常与多发性毛发上皮瘤伴发的是（）。

- A. 圆柱瘤
- B. 毛母质瘤
- C. 顶泌汗腺腺瘤
- D. 汗管瘤
- E. 神经纤维瘤

正确答案：A

69、单选 患儿，男性，10岁。咽痛10天，四肢皮疹5天。查体：精神状况佳，T37.0℃。扁桃体I度肿大。四肢密集红色斑丘疹，其上附着厚层鳞屑。皮疹以双下肢为多，并见躯干散在分布少许红斑、丘疹。为鉴别诊断，最为有效简便的方法是（）。

- A. 皮肤划痕试验
- B. 点刺试验
- C. 斑贴试验
- D. Auspitz 三联征试验
- E. 组织病理试验

正确答案：D

70、单选 男性，42岁。会阴和肛门周围瘙痒剧烈、糜烂，部分皮疹呈苔藓样变，病史3年。应诊断为（）。

- A. 乳房外湿疹样癌
- B. 扁平苔藓
- C. 会阴瘙痒症
- D. 会阴、阴囊和肛门湿疹
- E. 白塞病

正确答案： D

参考解析： 会阴、阴囊和肛门湿疹表现为外阴和肛门周围瘙痒剧烈、糜烂，部分皮疹呈苔藓样变。

71、单选 大疱性表皮松解症临床表现的共同特点是（）。

- A. 皮肤感染后容易引起大疱或水疱
- B. 皮肤在受到轻微摩擦后容易引起大疱或水疱
- C. 机体免疫功能紊乱，皮肤容易引起大疱或水疱
- D. 皮肤对过敏原反应增强，容易引起大疱或水疱
- E. 皮肤脆性增强，受伤后容易出现皮肤缺失或裂痕

正确答案： B

72、单选 关于吉-海反应，错误的是（）。

- A. 一种急性变态反应
- B. 多于梅毒患者治疗后数小时发生
- C. 表现为寒战、发热、头痛、呼吸加快、心动过速、全身不适和原有疾病加重
- D. 严重时心血管梅毒常发生肺动脉破裂
- E. 泼尼松可用于预防

正确答案： D

73、单选 患儿，女，6天。双眼流脓2天。体格检查：双侧球结膜充血，见较多黄色脓性分泌物。分泌物涂片检查见较多细胞内革兰阴性双球菌。对该患儿下列处理不正确的是（）。

- A. 头孢曲松钠按 30~50mg/kg·d 静脉滴注，每天一次，连续1周
- B. 头孢曲松钠按 30~50mg/kg·d 静脉滴注一次
- C. 生理盐水冲洗眼部，每小时一次
- D. 1%硝酸银溶液点眼，每日一次
- E. 3日内复诊

正确答案： B

74、单选 黄褐斑表现为（）。

- A. 炎症性红斑
- B. 非炎症性红斑
- C. 出血斑
- D. 色素沉着斑
- E. 色素减退斑

正确答案： D

75、单选 下列有关大疱性类天疱疮的叙述，不正确的是（）。

- A. 好发于 60 岁以上的老人
- B. 疱壁厚且不易破
- C. 尼氏征阳性
- D. 常伴有黏膜损害
- E. 糖皮质激素治疗为首选

正确答案： C

76、单选 紫外线治疗的禁忌证是（）。

- A. 玫瑰糠疹
- B. 无肌病性皮炎
- C. 慢性溃疡
- D. 痤疮
- E. 毛囊炎、疖

正确答案： B

77、单选 梅毒的确诊试验是（）。

- A. RPR
- B. TPPA
- C. WB
- D. HIV-Ab
- E. HSVELISA

正确答案： B

参考解析：梅毒的筛查试验是以非梅毒螺旋体为抗原来检测抗体，如 RPR、VDRL 等，确诊试验采用乳胶凝集试验（PA），如 TPHA、TP-PA 等。

78、单选 患者，男，54 岁。头皮损害 1 个月就诊，自觉轻度疼痛。体检：头皮可见 1cm×2cm 簇集性毛囊性小脓疱伴断发，枕部淋巴结肿大，无发烧，病史中患者无外伤史，平常养宠物。请你根据以上病史、体检资料给予可能的诊断（）。

- A. 毛囊炎
- B. 脓疱疮
- C. 头癣
- D. 带状疱疹
- E. 疖

正确答案： C

79、单选 瘢痕疙瘩最好发于（）。

- A. 胸骨区
- B. 肩部
- C. 面部
- D. 颈部

E. 耳部

正确答案：A

80、单选 对B淋巴细胞抑制作用较强的是（）。

- A. 环磷酰胺
- B. 甲氨蝶呤
- C. 硫唑嘌呤
- D. 氨苯砞
- E. 他克莫司

正确答案：A

81、单选 下列有关地图舌与扁平苔藓的鉴别，说法错误的是（）。

- A. 地图舌多限于舌部，而扁平苔藓则不局限于舌，还可见于颊、唇等部位
- B. 地图舌以儿童、妇女多见，而扁平苔藓以中年妇女居多
- C. 地图舌的病变表现为斑丘疹，且病区常变动，而扁平苔藓则以丘疹常见，位置较固定
- D. 地图舌的病变较持久，可复发，而后者的病期呈间歇发作
- E. 地图舌的皮损形态中央呈红色剥脱及灰白色活动性边缘，后者呈扁平丘疹，相互融合成网状或线条状

正确答案：D

参考解析：地图舌的病期呈间歇发作，一面发展，一面消退、愈合，所以形状逐日变化，病区常有变动，而后者的病变较持久，可复发。

82、单选 患者，男性，10岁。1个月前有上呼吸道感染史，半个月前开始出现双侧下肢出血点、出血斑伴关节酸痛、腹痛，病程中无呕血、血常规提示WBC $12\times 10^9/L$ 、N82%、L19%、Hb115g/L，PLT 230×10^9 ，尿常规提示隐血++、RBC2~3/HP。此病最容易累及的系统性脏器为（）。

- A. 心
- B. 肝
- C. 脑
- D. 肺
- E. 肾

正确答案：E

83、单选 患者，男性，35岁。双侧下肢、臀部泛发性紫癜、血疱、水疱，部分皮疹呈暗红色结节样，少数溃疡，附血痂、见少数萎缩性瘢痕。病程中伴发热，自觉皮疹疼痛明显，血常规正常，尿常规提示隐血++、RBC2~3/HP。该病发病从免疫学角度分析，属于（）。

- A. I型变态反应
- B. II型变态反应
- C. III型变态反应
- D. IV型变态反应

E. 不定型变态反应

正确答案：C

84、单选 男，43岁。鼻部皮疹5年，初为鼻尖部红斑，对称分布，逐渐出现丘疹、脓疱和结节。最可能的诊断是（）。

- A. 酒渣鼻红斑期
- B. 结节性痤疮
- C. 脂溢性皮炎
- D. 酒渣鼻丘疹脓疱期
- E. 酒渣鼻鼻赘期

正确答案：D

参考解析：酒渣鼻丘疹脓疱期的临床特点是鼻尖出现丘疹脓疱和结节。

85、单选 患者，女性，17岁。腹泻、发热4天，全身皮疹伴痒2天。患者4天前出现反复腹泻，呈黄色稀水样便，无脓血，伴反复高热，给予抗感染补液等治疗病情控制不佳，1天前出现多部位大片状鲜红色隆起性皮疹，有痒感，皮疹消退后反复发生，既往无药物过敏史。查体：专科检查见躯干、四肢大小不等水肿性红斑，不规则形。实验室检查：血常规提示：WBC $15.3 \times 10^9/L$ ，N89.0%，大便常规提示WBC+++。患者的诊断是（）。

- A. 败血症；急性肠炎
- B. 急性荨麻疹；急性肠炎
- C. 药疹；急性肠炎
- D. 过敏性皮炎；急性肠炎
- E. 变应性亚败血症；急性肠炎

正确答案：B

86、单选 雀斑是（）。

- A. 代谢性疾病
- B. 内分泌紊乱疾病
- C. 性染色体遗传疾病
- D. 常染色体显性遗传疾病
- E. 常染色体隐性遗传疾病

正确答案：D

87、单选 患者，男性。平素体健，半个月前因手工制作时出现左手食指外伤，伤口愈合后出现外伤部位一肿块，呈棕红色，且逐渐增大，触压有疼痛感，质软，破溃后出血明显。该病的治疗方案最佳为（）。

- A. 手术切除+组织病理
- B. 激光
- C. 电凝
- D. 放射
- E. 无须治疗，临床观察

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/946102044232010125>