

# 公共卫生与预防医学考试题库

## 第一部分 单选题(300题)

1、下列哪项不属医院感染【单选题】——

- A. 阑尾穿孔引起的腹膜炎
- B. 入院 72 小时后发生的肺炎
- C. 无症状导管菌尿症
- D. 烧伤 6 小时入院的创面感染      产道分娩吸入阴道分泌物的新生儿肺炎

【答案】：A

2、属于高效消毒剂的是【单选题】——

- A. 醋酸氯己定
- B. 新洁尔灭
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】：D

3、关于医院感染知识培训错误的是【单选题】——

- A. 培训内容包括管理知识和专业知识
- B. 非专职人员每年不少于 2 小时培训
- C. 培训对象包括管理. 医务. 工勤人员
- D. 实习医师必须培训      进修医师必须培训

【答案】：B

4、穿过皮肤或黏膜进入无菌的组织或器官内部的器材【单选题】——

- A. 灭菌剂或物理. 化学灭菌方法
- B. 应用灭菌剂或高效消毒剂
- C. 杀灭结核杆菌的消毒剂或中. 低效消毒剂
- D. 应用物理灭菌方法      杀灭细菌繁殖体的消毒剂

【答案】：A

5、刘某,被诊断为霍乱,对其应该采取的隔离方式是【单选题】——

- A. 消化道隔离
- B. 严密隔离
- C. 昆虫隔离
- D. 保护性隔离      呼吸道隔离

【答案】： B

6、紫外线灯做空气消毒时,照射时间不少于【单选题】——

- A. 35 分钟
- B. 25 分钟
- C. 15 分钟
- D. 30 分钟      20 分钟

【答案】： D

7、新生儿重症监护室对每张床位占地面积的要求是不少于一般新生儿床位的【单选题】——

- A. 1 倍
- B. 2 倍
- C. 3 倍
- D. 4 倍      5 倍

【答案】： B

8、一级医院【单选题】——

- A. 医院感染发生率 $\leq$ 8%
- B. 切口感染率 $\leq$ 0.5%
- C. 两者均是
- D. 两者均不是

【答案】： D

9、根据《综合医院建筑标准》有关的卫生学标准及预防医院感染的要求,对医院的改建、扩建和新建,提出建设性意见【单选题】——

- A. 卫生部医院感染管理咨询专家委员会
- B.

省医院感染管理专家咨询委员会

- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：C

10、传染科病房属于【单选题】——

- A. I类地区
- B. II类地区
- C. III类地区
- D. IV类地区 非分类地区

【答案】：D

11、减少免疫功能低下者发生医院感染的措施不正确的是【单选题】

- A. 尽量减少侵入性操作
- B. 大量应用广谱抗菌作用预防感染
- C. 积极发现和治疗局部病灶和潜在性感染
- D. 采取保护性隔离措施,切断感染途径 采用选择性脱污染措施,减少内源性感染

【答案】：B

12、脊髓灰质炎宜采取【单选题】——

- A. 消化道隔离
- B. 呼吸道隔离
- C. 两者均是
- D. 两者均不是

【答案】：C

13、根据我国卫生标准回答以下问题:对医院发生的医院内感染流行、暴发流行进行调查分析,提出控制措施,并组织实施的应是【单选题】

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会

B. 省医院感染管理专家咨询委员会

C.

各级医院的医院感染管理委员会

- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：D

14、层流洁净室【单选题】——

A. 空气 $\leq 10\text{cfu}/\text{m}^3$ , 物体表面 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^3$ , 医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$

B. 空气 $\leq 200\text{cfu}/\text{m}^3$ , 物体表面 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^3$ , 医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$

C. 空气 $\leq 500\text{cfu}/\text{m}^3$ , 物体表面 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^3$ , 医护人员手

$\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$

D. -, 物体表面 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^3$ , 医护人员手 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$  空气

$\leq 1000\text{cfu}/\text{m}^3$ , 物体表面 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^3$ , 医护人员手 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^2$ ?下列各医

疗区的细菌学指标是

【答案】：A

15、除灭菌速度快、灭菌效果好、经济、环境污染小的压力蒸气灭菌

法外,目前最常用的低温灭菌方法是【单选题】——

A. 环氧乙烷灭菌法

B. 戊二醛浸泡灭菌法

C. 辐射灭菌法

D. 过氧乙酸浸泡灭菌法 微波灭菌法

【答案】：A

16、传染病区医务人员使用的隔离衣一般情况下更换时间是【单选题

】——

A. 24h

B. 6h

C. 48h

D. 12h 72h

【答案】：A

17、我国艾滋病最常见的传播途径是【单选题】——

A. 输血和血制品

B. 静脉注射毒品

C.

母婴垂直传播

D. 性传播 儿童疫苗注射

【答案】： B

18、关于使用中的消毒剂、灭菌剂的监测,下列哪项是错误的【单选题】——

A. 应进行生物和化学监测

B. 生物监测:消毒剂每季度 1 次,其细菌含量必须 $<100\text{cfu/mL}$ ,不得检出致病性微生物

C. 灭菌剂每月生物监测 1 次,不得检出任何微生物

D. 含氯消毒剂、过氧乙酸等的浓度应每天监测 对戊二醛浓度的监测应每月不少于 1 次

【答案】： E

19、传染病区中划分为清洁区的是【单选题】——

A. 走廊

B. 洗漱室

C. 配餐室

D. 化验室 浴室

【答案】： C

20、以下概念正确的是【单选题】——

A. 地面应湿式清扫,保持清洁,局部有血迹等污染时局部用消毒剂处理

B. 地面应经常用含氯消毒剂拖洗,既能消毒,又能增白

C. 检验科的地面每天均需用消毒剂拖洗

D. 拖洗工具使用后先洗净,再消毒,然后晾干 因为 2%戊二醛是高水平消毒剂,有条件时最好用戊二醛拖地,消毒效果好

【答案】： A

21、下排气式灭菌器灭菌包体积不应大于【单选题】——

A.  $30\text{cm} \times 30\text{cm} \times 20\text{cm}$

B.  $30\text{cm} \times 30\text{cm} \times 40\text{cm}$

C.



30cm×40cm×30cm

D. 30cm×30cm×25cm 20cm×30cm×40cm

【答案】：D

22、血液净化室的医院感染管理下列哪项不正确【单选题】——

- A. 应对病人常规进行血液净化前肝功能、肝炎病原体等检查
- B. 工作人员定期体检,加强个人防护
- C. 透析器、管道应专人专用
- D. 传染病病人在隔离血液净化间内进行,专机透析 急诊病人不需固定透析机

【答案】：E

23、高度危险性物品是指【单选题】——

- A. 受到一定量病菌污染才造成危害的物品
- B. 虽有微生物污染,但一般情况下无害的物品
- C. 进入无菌组织或与破损的组织、皮肤粘膜密切接触的物品
- D. 仅和皮肤粘膜相接触,而不进入无菌的组织内的物品 直接地和健康无损的皮肤粘膜密切接触的物品

【答案】：C

24、妊娠妇女不宜用的抗菌药物是【单选题】——

- A. 青霉素
- B. 磷霉素
- C. 林可霉素
- D. 四环素 头孢菌素

【答案】：D

25、消毒药械管理中下列哪项错误【单选题】——

- A. 根据消毒的目的选用消毒药械
- B. 同一消毒剂消毒不同物品应有同一浓度
- C. 加强消毒效能监测
- D. 防止使用中的消毒剂再污染 注意影响消毒效果的因素

【答案】：B

26、取无菌溶液时下列哪项是错误的【单选题】——

- A. 倒溶液时瓶签向下
- B. 用前核对瓶签
- C. 检查药液有无沉淀
- D. 保持瓶盖内面无菌 用后立即盖上

【答案】：A

27、艾滋病人感染的预防,下列哪项错误【单选题】——

- A. 晚期病人应接受保护性隔离
- B. 病人血中 CD4+T 淋巴细胞 $<0.2 \times 10^9/L$  时应接受抗肺孢子虫感染的预防
- C. 一旦发病即应用广谱抗菌药预防全身感染
- D. 医务人员受 HIV 污染针头刺伤,应立即报告并接受药物(AZT)预防 确诊并发感染应早期抗生素治疗

【答案】：C

28、患者出院后,需将其用过的被褥在阳光下曝晒 6 小时,可达到哪种效果【单选题】——

- A. 隔离
- B. 清洁
- C. 灭菌
- D. 灭虱 消毒

【答案】：E

29、关于锐器伤后的预防措施,错误的是【单选题】——

- A. 如不慎发生锐器伤,应立即采取相应的保护措施,清创、对创面进行严格消毒处理
- B. 对发生锐器伤者进行血源性疾病的检查和随访
- C. 被 HBV 阳性病人血液、体液污染锐器刺伤,应在 1 周内注射乙型肝炎高效价免疫球蛋白
- D. 被 HBV 阳性病人血液、体液污染的锐器刺伤,应及时进行血液乙肝标志物检查

被 HBV 阳性病人血液体液、污染锐器刺伤,血液乙肝标志物阴性者按规定接种乙肝疫苗

【答案】：C

30、交叉感染【单选题】——

- A. 病人在家中已发生的感染
- B. 病原体来源于病人本身的感染
- C. 病人与医生及其他病人通过直接或间接传播引起的感染
- D. 在诊疗过程中,由于器械消毒不严或制剂不纯引起的感染 病人入院时已处于另一种传染病的潜伏期,入院后发病,并传给其他病人

【答案】：C

31、关于压力蒸汽灭菌效果监测要求正确的是【单选题】——

- A. 工艺监测每天进行
- B. 化学监测每包进行
- C. 生物监测每周进行
- D. B-D 试验每天灭菌后进行 B-D 试验每锅进行

【答案】：B

32、对芽孢无效的化学消毒剂是【单选题】——

- A. 0.5%过氧乙酸溶液
- B. 环氧乙烷
- C. 40%甲醛溶液
- D. 2%戊二醛溶液 70%乙醇溶液

【答案】：E

33、关于医院感染的概念正确的是【单选题】——

- A. 与上次住院有关的感染不是医院感染
- B. 医院感染是指在医院内获得的感染
- C. 诊疗措施激活的潜在性感染不是医院感染
- D. 婴幼儿经胎盘获得的感染是医院感染 出院之后发生的感染一定不是医院感染

【答案】：B

34、下列消毒剂中属中效消毒剂的是【单选题】——

- A. 戊二醛
- B. 过氧乙酸
- C. 氯己定
- D. 臭氧 碘伏

【答案】：E

35、根据我国卫生标准回答以下问题：进入组织、器官或接触破损皮肤、黏膜的医疗用品【单选题】——

- A. 必须无菌
- B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{cfu/g}$  或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$ ,致病性微生物不得检出
- C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$  或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$ ,致病性微生物不得检出
- D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$ ,致病性微生物不得检出 细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$ ,致病性微生物不得检出

【答案】：A

36、下述不属于灭菌剂是【单选题】——

- A. 20%戊二醛
- B. 过氧乙酸
- C. 环氧乙烷
- D. 甲醛 含氯消毒剂

【答案】：E

37、下述不符合环境卫生学标准的是【单选题】——

- A. 层流洁净手术室物体表面细菌数 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$
- B. 普通手术室空气细菌数 $\leq 500\text{cfu}/\text{m}^3$
- C. 治疗室医务人员手细菌数 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$
- D. 传染病房物体表面细菌数 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$  婴儿室空气细菌数 $\leq 200\text{cfu}/\text{m}^3$

【答案】：B

38、关于医院感染知识培训要求,下述中错误的是【单选题】——

- A. 培训内容包括管理知识和专业知识
- B. 培训对象包括管理、医务、工勤人员
- C. 非专职人员每年培训不少于 2 小时
- D. 进修医师必须培训 实习医师必须培训

【答案】： C

39、保管无菌物品哪项是错误的【单选题】——

- A. 无菌物品应放在清洁干燥、固定的地方
- B. 取出的无菌物品不得放回无菌容器内
- C. 无菌包必须注明灭菌日期
- D. 无菌物与非无菌物应分别放置 已启用的无菌包,48h 后必须重新灭菌

【答案】： E

40、高效消毒剂是【单选题】——

- A. 醋酸氯己定
- B. 新洁尔灭
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】： D

41、传染病院应设置在下列哪个地方【单选题】——

- A. 远离公共场所
- B. 交通便利的地方
- C. 城市中心
- D. 靠近综合性医院 水源充足的地方

【答案】： A

42、有关内镜消毒下列哪项是错误的【单选题】——

- A. 腹腔镜用环氧乙烷消毒
- B. 消化内镜用  $500 \times 10^{-6}$  有效氯的含氯消毒剂消毒
- C.

直肠镜采用高压灭菌

D. 内镜活检钳使用过频时,采用 2%戊二醛消毒 45 分钟  
苯二甲醛消毒内镜 5 分钟可灭菌

【答案】： B

43、当被沾有 HBsAg 阳性血的针头刺伤时,立即应作的主要处理是【单选题】——

- A. 乙型肝炎高价免疫血清注射
- B. 给受伤者立即注射丙种球蛋白
- C. 乙型肝炎疫苗注射
- D. 伤口立即涂以碘酒 受伤者立即抽血作乙型肝炎全套抗原抗体检测

【答案】： A

44、WHO 认为医院监测的最终目标是【单选题】——

- A. 为了减少医院感染和由此所造成的损失
- B. 降低医院感染率,减少获得医院感染的危险因素
- C. 建立医院的医院感染发病率基线
- D. 利用调查资料说服医务人员遵守感染控制规范与指南 评价效果,调整和修改感染控制规范

【答案】： A

45、有关紫外线消毒效果监测下列哪项规定是错误的【单选题】——

- A. 对灯管应用时间、照射累计时间进行记录并签名
- B. 对紫外线灯管在安装后、使用前应进行强度监测
- C. 使用中的灯管的强度监测应每个月监测 1 次
- D. 新购灯管强度大于  $100 \mu W/cm^2$ ,使用中灯管强度大于  $70 \mu w/cm^2$  为合格灯管 照射前后人工染菌杀灭率达到 99.9%以上为合格灯管

【答案】： C

46、若需提高煮沸温度,可在水中加入【单选题】——

A. 碳酸氢钠

B.

高锰酸钾

- C. 乙醇
- D. 亚硝酸钠 氯化钠

【答案】：A

47、美国一护士在护理埃博拉感染患者时,也被诊断为埃博拉出血热,其属【单选题】——

- A. 外来病毒感染
- B. 非接触性感染
- C. 自患传染性疾病
- D. 医院感染 因空气造成的感染

【答案】：D

48、经血液、体液传播病原体不包括【单选题】——

- A. 麻疹病毒
- B. 乙型肝炎病毒
- C. 人类免疫缺陷病毒
- D. 疟原虫 丙型肝炎病毒

【答案】：A

49、使用紫外线照射消毒,关灯后至再使用前须间隔【单选题】——

- A. 3~4min
- B. 5~6min
- C. 1~2min
- D. 7~8min 9~10min

【答案】：A

50、不属于高度危险物品的是【单选题】——

- A. 腹腔镜
- B. 导尿管
- C. 体温表
- D. 穿刺针 手术器材

【答案】：C



51、护理传染病病人,在离开传染病房时要按照要求刷手。正确的刷手顺序是【单选题】——

- A. 手掌.腕部.手指.指甲.指缝.手背
- B. 腕部.前臂.手掌.手背.手指.指甲
- C. 前臂.腕部.指甲.指缝.手指.手背.手掌
- D. 手指.指甲.指缝.手背.手掌.腕部.前臂 前臂.腕部.手背.手掌.手指.指缝.指甲

【答案】：E

52、碘伏属于【单选题】——

- A. 中效消毒剂
- B. 低效消毒剂
- C. 以上都不是
- D. 高效消毒剂 中低效消毒剂

【答案】：A

53、严密隔离的措施不对的是【单选题】——

- A. 隔离病房应经常开窗通风,不同类感染患者可同居一室
- B. 入室人员需戴口罩、穿隔离衣及戴手套。一切物品专用
- C. 接触每个患者及其污染物后,必须洗手
- D. 污染的敷料及用品应装袋贴标签,送消毒处理 接触者尽可能注射疫苗或采取预防措施

【答案】：A

54、医院发现一次性使用无菌医疗用品不合格产品或质量可疑产品时,应【单选题】——

- A. 立即停止使用,与供应商联系进行退、换货处理
- B. 立即停止使用,并报告医院管理部门进行退、换货处理
- C. 可继续使用,但应注意密切观察有无不良反应发生
- D. 立即停止使用,并及时报告当地药品监督管理部门,不得自行作退、换货处理

立即停止使用,并及时报告医院管理部门,就地销毁不合格产品

【答案】：D

55、调查医院感染的最佳方法【单选题】——

- A. 从医院微生物室获得病例来源
- B. 临床医师填报病例
- C. 专职护士到病室前瞻性发现病例
- D. 病室监控护士报告病例 专职护士到病案室从出院病历中  
查找病例

【答案】：C

56、医源性感染【单选题】——

- A. 病原体来源于病人本身的感染
- B. 在诊疗过程中,由于器械消毒不严或制剂不纯引起的感染
- C. 病人与医生及其他病人通过直接或间接传播引起的感染
- D. 病人入院时已处于另一种传染病的潜伏期,入院后发病,并传给  
其他病人 病人在家中已发生的感染

【答案】：B

57、下列概念中不正确的是:【单选题】——

- A. 医院感染散发是指医院感染在某医院或某地区住院患者中历年的一  
般发病率水平
- B. 医院感染的流行趋势是指医院感染持续流行
- C. 医院感染发病率是指一定时间内住院患者中发生医院感染新发  
病例的频率
- D. 医院感染流行是指某医院.某科室医院感染发病率显著超过历  
年散发发病率水平 医院感染暴发是指在某医院、某科室的住院  
患者中,短时间内、突然发生许多医院感染病例的现象

【答案】：B

58、无需执行昆虫隔离的疾病是【单选题】——

- A. 疟疾
- B.

气性坏疽

- C. 斑疹伤寒
- D. 流行性出血热 流行性乙型脑炎

【答案】：B

59、下列各项中错误的是【单选题】——

- A. 医护人员在采血、输血前后要洗手
- B. 每批一次性注射器均应注明出厂日期、灭菌日期和有效期
- C. 使用过的一次性注射器、输血器材应消毒毁灭或焚烧
- D. 实验工作人员不能用口吸管,处理污物时要戴手套 艾滋病的潜伏期内无传染性

【答案】：E

60、预真空蒸汽灭菌器手术器械包的体积不得超过多少【单选题】——

- A. 30cm×30cm×30cm
- B. 30cm×30cm×50cm
- C. 30cm×30cm×45cm
- D. 30cm×30cm×25cm 35cm×35cm×50cm

【答案】：B

61、医院感染的病原特点不对的是【单选题】——

- A. 90%为条件致病微生物,少数为致病微生物
- B. 一种病原引起多部位感染或一个部位有多种细菌感染
- C. 近年来 G-杆菌中非发酵菌和 G+球中的表皮葡萄球菌以及真菌下降趋势
- D. 多为耐药菌或多重耐药菌 免疫功能低下患者的病原谱广,病原随抗生素应用或免疫功能缺损程度而有变迁

【答案】：C

62、对医院发生的医院感染流行、暴发流行进行调查分析,提出控制措施,并组织实施【单选题】——

- A. 卫生部医院感染管理咨询专家委员会
- B.

省医院感染管理专家咨询委员会

- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：D

63、I类、II类区域工作人员卫生手及物体表面的合格标准为【单选题】——

- A. 细菌总数 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$ ,未检出致病菌
- B. 细菌总数 $\leq 20\text{cfu}/\text{cm}^2$ ,未检出致病菌
- C. 细菌总数 $\leq 25\text{cfu}/\text{cm}^2$ ,未检出致病菌
- D. 细菌总数 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$ ,未检出致病菌 细菌总数 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$ ,未检出致病菌

【答案】：D

64、普通病房【单选题】——

- A. 空气 $\leq 10\text{cfu}/\text{m}^3$ ,物体表面 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^3$ ,医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$
- B. 空气 $\leq 200\text{cfu}/\text{m}^3$ ,物体表面 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^3$ ,医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$
- C. 空气 $\leq 500\text{cfu}/\text{m}^3$ ,物体表面 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^3$ ,医护人员手 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$
- D. -,物体表面 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^3$ ,医护人员手 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$  空气 $\leq 1000\text{cfu}/\text{m}^3$ ,物体表面 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^3$ ,医护人员手 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^2$ ?下列各医疗区的细菌学指标是

【答案】：C

65、医院的医院感染管理委员会的主要职责不包括【单选题】——

- A. 依据有关政策法规,制定全院控制医院感染规划、管理制度,并组织实施
- B. 根据《综合医院建筑标准》有关卫生学标准及预防医院感染的要求,对医院的改建、扩建和新建提出建设性意见
- C. 建立会议制度,定期研究、协调和解决有关医院感染管理方面的重大事项;遇有紧急问题随时召开

D. 定期总结、分析细菌学检测监测资料,向有关部门反馈,并向全院公布

对医院感染管理科拟定的全院医院感染管理工作计划进行审定,对其工作进行考评

【答案】：D

66、有关医院感染预防与控制的概念,错误的是:【单选题】——

- A. 外源性感染是可以预防的
- B. 洗手是预防医院感染的重要措施
- C. 做好消毒隔离就可杜绝医院感染的发生
- D. 内源性医院感染是难以预防的 滥用抗菌药物可致二重感染

【答案】：C

67、根据我国卫生标准回答:使用中的消毒剂【单选题】——

- A. 必须无菌
- B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{Cfu/g}$  或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$ ,致病性微生物不得检出
- C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$  或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$ ,致病性微生物不得检出
- D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$ ,致病性微生物不得检出 细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$ ,致病性微生物不得检出

【答案】：D

68、无菌盘铺好后有效时间不超过【单选题】——

- A. 4h
- B. 6h
- C. 8h
- D. 5h 7h

【答案】：A

69、对一次性卫生用品、消毒药械的购置查检许可证,对其抽检进行细菌学检查【单选题】——

- A. 卫生部医政司医院感染管理委员会

B. 省市卫生行政部门医院感染管理委员会

C.



医院的医院感染管理委员会

D. 医院感染管理科 临床科室以下各项工作是哪个部门的职责

【答案】：D

70、预防免疫功能低下病人发生医院内感染不正确的是【单选题】——

- A. 注射相关疫苗
- B. 全身使用广谱抗生素预防感染
- C. 治疗局部感染病灶
- D. 保护性隔离 保护皮肤黏膜的完整性

【答案】：B

71、张某,大面积烧伤病人,创面出现铜绿假单胞菌感染,创面换药后敷料的正确处理方法为【单选题】——

- A. 扔入污物桶
- B. 焚烧
- C. 清洗后放日光下曝晒
- D. 清洗后再消毒 灭菌后再清洗

【答案】：B

72、供应室无菌区【单选题】——

- A. 空气 $\leq 10\text{cfu}/\text{m}^3$ ,物体表面 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^3$ ,医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$
- B. 空气 $\leq 200\text{cfu}/\text{m}^3$ ,物体表面 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^3$ ,医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$
- C. 空气 $\leq 500\text{cfu}/\text{m}^3$ ,物体表面 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^3$ ,医护人员手 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$
- D. -,物体表面 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^3$ ,医护人员手 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$  空气 $\leq 1000\text{cfu}/\text{m}^3$ ,物体表面 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^3$ ,医护人员手 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^2$ ?下列各医疗区的细菌学指标是

【答案】：B

73、术前皮肤消毒应由【单选题】——

A. 巡回护士完成

B.

未洗手的手术医生完成

C. 手术护士完成

D. 已洗手的手术医生完成 麻醉医生完成

【答案】：D

74、腹部手术铺单原则【单选题】——

A. 先上后下,先远后近

B. 以上都不是

C. 先上后下,先近后远

D. 先下后上,先远后近 先下后上,先近后远

【答案】：D

75、引起医院感染的病原微生物主要是【单选题】——

A. 条件致病菌

B. 细菌

C. 弓形体

D. 衣原体 真菌

【答案】：A

76、标准预防针对体内物质的隔离预防不包括【单选题】——

A. 血液

B. 体液

C. 汗液

D. 排泄物 分泌物

【答案】：C

77、医务人员在诊疗埃博拉患者时,须做好那种隔离措施【单选题】——

A. 接触隔离

B. 床边隔离

C. 保护性隔离

D. 空气隔离 消化道隔离

【答案】：A

78、带入感染【单选题】——

- A. 病人与医生及其他病人通过直接或间接传播引起的感染
- B. 在诊疗过程中,由于器械消毒不严或制剂不纯引起的感染
- C. 病人入院时已处于另一种传染病的潜伏期,入院后发病,并传给其他病人
- D. 病人在家中已发生的感染 病原体来源于病人本身的感染

【答案】：C

79、III类区域空气消毒合格的标准是【单选题】——

- A. 细菌总数 $\leq 200\text{cfu}/\text{m}^3$ ,未检出致病菌
- B. 细菌总数 $\leq 10\text{cfu}/\text{m}^3$ ,未检出致病菌
- C. 细菌总数 $\leq 500\text{cfu}/\text{m}^3$ ,未检出致病菌
- D. 细菌总数 $\leq 400\text{cfu}/\text{m}^3$ ,未检出致病菌 细菌总数 $\leq 300\text{cfu}/\text{m}^3$ ,未检出致病菌

【答案】：C

80、关于医院内感染知识培训,错误的叙述是【单选题】——

- A. 培训内容包括管理知识和专业知识
- B. 培训对象包括管理、医务、工勤人员
- C. 非专职人员每年不少于2小时培训
- D. 进修医师必须培训 实习医师必须培训

【答案】：C

81、下列哪项不是医院感染病原学的特点【单选题】——

- A. 细菌是最常见的病原体,细菌的种类和分布因感染类型、医院类别、患者具体情况和采取措施不同
- B. 目前以革兰阴性杆菌为主,如肠杆菌和非发酵菌,这些细菌常有耐药性
- C. 近年来随着抗生素的大量使用,革兰阳性球菌感染,特别是耐甲氧西林金黄色葡萄球菌感染、凝固酶阴性葡萄球菌感染正在增加
- D. 厌氧菌和深部真菌是机体正常菌群常引起内源性感染

真菌感染正在减少

【答案】：E

82、SARS 最主要的传染源是【单选题】——

- A. SARS 患者
- B. SARS 病毒携带者
- C. SARS 感染的动物
- D. 携带 SARS 的动物 污染的环境

【答案】：A

83、在医院中幽门螺杆菌的传播以下列哪种方式最多见【单选题】——

- A. 空气传播
- B. 接触传播
- C. 血液传播
- D. 唾沫传播 内镜操作传播

【答案】：E

84、传染病区使用的拖把【单选题】——

- A. 每次使用后清水冲洗,悬挂晾干备用
- B. 先用 1000mg/L 有效氯消毒剂适量倒在污染地面 30min 后,用拖把拖干净
- C. 应先消毒,用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min,再用水洗干净,然后用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min,悬挂晾干备用
- D. 拖把应有明显的标记,严格分区使用 拖把用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min 后,再洗干净,晾干备用

【答案】：C

85、传染病房两病床之间的距离应【单选题】——

- A.  $\geq 2.0\text{m}$
- B.  $\geq 1.5\text{m}$
- C.

≥1.2m

D.        ≥1.1m        ≥1.0m

【答案】：D

86、下列消毒剂中属高水平消毒剂的有【单选题】——

A. 戊二醛

B. 络合碘

C.        苯扎溴铵

D.        乙醇                碘酊

【答案】：A

87、下列概念中不正确的是【单选题】——

A. 医院感染发病率是指一定时间内住院病人中发生医院感染新发病例的频率

B. 医院感染暴发是指在某医院、某科室的住院病人中,短时间内、突然发生3例以上同源感染病例的现象

C.        医院感染流行是指某医院、某科室医院感染发病率显著超过历年散发发病率水平

D.        医院感染散发是指医院感染在某医院、或某地区住院病人中历年的一般发病率水平        医院感染的流行趋势是指医院、某科室的医院感染持续流行,长时间不能控制

【答案】：E

88、用平车护送伤寒患者摄片,正确的方法是【单选题】——

A. 协助患者直接卧于平车上

B. 铺清洁大单于平车上,协助其卧上

C.        协助患者卧于平车上后,再盖上一条清洁大单

D.        患者更换清洁衣裤后,卧于平车上        将患者床单铺在平车上,协助其卧上

【答案】：B

89、下列概念中哪项是错误的【单选题】——

A. 全面综合性监测可获得医院感染本底感染率

B.

目标性监测是将有限的人力、财力用于解决医院感染的关键问题

- C. 医院感染与传染病相同的是培养出细菌即能确诊
- D. 医院感染的现患率高于同期的感染发生率 医院感染漏报率的调查目的是对感染率监测质量的评估

【答案】： C

90、普通手术室医护人员手表面细菌菌落总数卫生标准应【单选题】

——

- A.  $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$
- B.  $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$
- C.  $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$
- D.  $\leq 200\text{cfu}/\text{cm}^2$   $\leq 500\text{cfu}/\text{cm}^2$

【答案】： A

91、潜伏病毒的激活感染是【单选题】——

- A. 麻疹恢复期
- B. 隐性乙型脑炎病毒感染
- C. 乙型肝炎病毒携带者
- D. 单纯疱疹反复发作 慢性活动性肝炎

【答案】： D

92、为预防医院感染的发生新生儿病房每张床位占地面积不应少于【单选题】——

- A.  $5\text{m}^2$
- B.  $4\text{m}^2$
- C.  $3\text{m}^2$
- D.  $2\text{m}^2$   $1\text{m}^2$

【答案】： C

93、组织实施国家有关政策法规【单选题】——

- A. 卫生部医政司医院感染管理委员会
- B. 省市卫生行政部门医院感染管理委员会



- C. 医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科

临床科室以下各项工作是哪个部门的职责

【答案】：B

94、洗手过程中手触及未消毒物品应【单选题】——

- A. 更改浸泡用药液
- B. 重新洗手
- C. 延长浸泡时间
- D. 继续原有洗手步骤 多戴一副手套

【答案】：B

95、调查医院内感染的最佳方法是【单选题】——

- A. 从医院微生物室获得病例来源
- B. 临床医院填报病例
- C. 专职护士到病案室前瞻性发现病例
- D. 病室监控护士报告病例 专职护士到病案室从出院病历中  
找查病例

【答案】：C

96、下列有关医院感染的管理人员培训要求描述错误的是【单选题】

——

- A. 300 张床位以上的医院设医院感染管理科
- B. 1000 张床位以上的大型医院,医院感染管理专职人员的配备不得少于 10 人
- C. 300 张床位以下的医院,医院感染管理专职人员的配备不少于 1 人
- D. 300 张床位以下的医院应配备医院感染管理专职人员  
300-500 张床位的医院,医院感染管理专职人员的配备不得少于 2 人

【答案】：B

97、煮沸消毒灭菌时,错误的操作是【单选题】——

- A. 大小相同的盆应重叠
- B. 玻璃类用纱布包好
- C.

物品完全浸没在水中

D. 煮沸过程中再加物品,应在第二次水沸后重新计时 有轴节的器械宜打开

【答案】: A

98、根据我国下列卫生标准回答:进入组织、器官或接触破损皮肤、黏膜的医疗用品的卫生标准是【单选题】——

A. 必须无菌

B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{cfu/g}$ 或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$ ,致病性微生物不得检出

C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$ 或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$ ,致病性微生物不得检出

D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$ ,致病性微生物不得检出 细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$ ,致病性微生物不得检出

【答案】: A

99、对本地区的医院感染管理进行技术指导【单选题】——

A. 卫生部医院感染管理咨询专家委员会

B. 省医院感染管理专家咨询委员会

C. 各级医院的医院感染管理委员会

D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】: B

100、巴氏消毒常用消毒指标是【单选题】——

A. 消毒温度为 $65\sim 75^\circ\text{C}$ ,作用时间 $10\sim 15\text{min}$

B. 消毒温度为 $70\sim 80^\circ\text{C}$ ,作用时间 $5\sim 8\text{min}$

C. 消毒温度为 $45\sim 55^\circ\text{C}$ ,作用时间 $20\sim 25\text{min}$

D. 消毒温度为 $85\sim 95^\circ\text{C}$ ,作用时间 $10\sim 15\text{min}$  消毒温度为 $62^\circ\text{C}$ ,作用时间 $30\text{min}$

【答案】: E

101、从医院获得幽门螺杆菌感染的高危人群中主要是【单选题】——

A. 检验人员

B.

消化内科医师

C. 消化内科护士

D. 腹部外科医师 口腔科医师

【答案】：B

102、有关隔离的概念,下列哪项是错误的【单选题】——

A. 咽白喉应严格隔离,皮肤白喉需接触隔离

B. 流行性腮腺炎进行呼吸道隔离,脊髓灰质炎进行肠道隔离

C. 大面积烧伤进行接触隔离

D. 多重耐药株感染应列入接触隔离 活动性肺结核的隔离期是有效治疗后6周

【答案】：E

103、妇产科检查室【单选题】——

A. 空气 $\leq 10\text{cfu}/\text{m}^3$ ,物体表面 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^3$ ,医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$

B. 空气 $\leq 200\text{cfu}/\text{m}^3$ ,物体表面 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^3$ ,医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$

C. 空气 $\leq 500\text{cfu}/\text{m}^3$ ,物体表面 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^3$ ,医护人员手 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$

D. -,物体表面 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^3$ ,医护人员手 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$  空气 $\leq 1000\text{cfu}/\text{m}^3$ ,物体表面 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^3$ ,医护人员手 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^2$ ?下列各医疗区的细菌学指标是

【答案】：C

104、对到传染病室探视的亲友应注意的事项哪些不对【单选题】——

A. 对于有感染指征的来访者,一律谢绝探视

B. 探视者在进入隔离室前要先报告值班护士

C. 对于有感染指征的患者,应尽量控制和减少探视

D. 医务人员应指导和监督探视者按规定进行隔离 积极向探视者进行卫生知识宣传教育,保护探视者不受感染

【答案】：C

105、灭菌速度快、灭菌效果好、对经济、环境污染小的是【单选题】

——

A.

环氧乙烷灭菌法

- B. 戊二醛浸泡灭菌法
- C. 辐射灭菌法
- D. 过氧乙酸浸泡灭菌法 压力蒸气灭菌法

【答案】： E

106、根据我国卫生标准回答:对医院发生的医院内感染流行、暴发流行进行调查分析,提出控制措施,并组织实施的应是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】： D

107、下列有关护理工作的描述,不正确的是【单选题】——

- A. 各种治疗、护理、换药操作应按清洁伤口、感染伤口、隔离伤口依次进行
- B. 起封抽吸的各种溶媒超过 36 小时不得使用,最好采用大包装
- C. 无菌物品必须一人一用一灭菌
- D. 灭菌物品提倡使用小包装,无菌棉球或纱布罐一经打开,使用时间不得超过 24 小时 治疗室、处置室布局合理,清洁区、污染区分区明确

【答案】： B

108、III类区域工作人员卫生手及物体表面的合格标准为【单选题】——

- A. 细菌总数 $\leq 20\text{cfu}/\text{cm}^2$ ,未检出致病菌
- B. 细菌总数 $\leq 25\text{cfu}/\text{cm}^2$ ,未检出致病菌
- C. 细菌总数 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$ ,未检出致病菌
- D. 细菌总数 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$ ,未检出致病菌 细菌总数 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$ ,未检出致病菌

【答案】： C

109、治疗室的管理中,下列哪项是错误的【单选题】——

- A. 注射治疗时要铺无菌盘,抽出的药液存放不能超过 2 小时
- B. 治疗室中开启的各种溶酶超过 24 个小时不能使用,最好采用小包装
- C. 治疗室中开启的无菌溶液需在 2 小时内使用
- D. 碘酊、乙醇瓶应保持密闭,每周更换并对容器灭菌 1~2 次 经灭菌后的棉球、纱布包一经打开,使用时间不能超过 48 小时

【答案】：E

110、为阳离子表面活性剂,对阴离子表面活性剂有拮抗作用的是【单选题】——

- A. 乙醇
- B. 甲醛
- C. 苯扎溴铵
- D. 过氧乙酸 纯乳酸

【答案】：C

111、下列关于禽流感的描述不对的是【单选题】——

- A. 是禽流行性感冒的简称
- B. 由 A 型禽流感病毒引起的一种禽类传染病
- C. 由 H5N1 血清型引起的禽流感称高致病性禽流感
- D. 属甲类传染病之一 人感染高致病性禽流感可以在人与人之间传播

【答案】：D

112、有关医院内感染预防与控制的概念,错误的是【单选题】——

- A. 部分医院内感染是可以预防的
- B. 洗手是预防医院内感染的重要措施
- C. 医院内感染一定是由于消毒隔离缺陷所致
- D. 内源性医院内感染是医院内感染的重要原因 滥用抗菌药物可致二重感染

【答案】：C



113、B-D 试验合格的标准是【单选题】——

- A. 指示图各部位颜色变化由深变浅
- B. 指示图各部位颜色变化为浅灰色
- C. 指示图各部位颜色变化为深黑色
- D. 指示图各部位颜色变化大致均匀 指示图各部位颜色变化深浅一致均匀

【答案】：E

114、传染病区使用拖把的描述哪项是正确的【单选题】——

- A. 应先消毒,用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min,再用水洗干净,然后用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min,悬挂晾干备用
- B. 每次使用后清水冲洗,悬挂晾干备用
- C. 先用 1000mg/L 有效氯消毒剂适量倒在污染地面 30min 后,用拖把拖干净
- D. 拖把用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min 后,再洗干净,晾干备用 拖把应有明显的标记,严格分区使用

【答案】：A

115、损伤性废物【单选题】——

- A. 使用过的注射针头
- B. 带血的敷料
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】：A

116、需要采取严密隔离的疾病是【单选题】——

- A. 乙型肝炎
- B. 艾滋病
- C. 鼠咬热
- D. 肺鼠疫

【答案】：D

117、三级医院【单选题】——

- A. 医院感染发生率 $\leq$ 8%
- B. 切口感染率 $\leq$ 0.5%
- C. 两者均是
- D. 两者均不是

【答案】：B

118、医院内尿路感染的常见诱因是【单选题】——

- A. 留置导尿管
- B. 气管切开
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】：A

119、医疗废物为【单选题】——

- A. 使用过的注射针头
- B. 带血的敷料
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】：C

120、乙型脑炎主要传播媒介是【单选题】——

- A. 蚊
- B. 虱
- C. 螨
- D. 鼠 蚤

【答案】：A

121、MRSA 感染的最佳选药【单选题】——

- A. 去甲万古霉素、万古霉素
- B. 头孢唑林
- C.

氧氟沙星

D. 磷霉素 阿米卡星

【答案】：A

122、属于高度危险性物品的是【单选题】——

A. 手术器械和用品

B. 体温表

C. 呼吸机管道

D. 胃肠道内窥镜和气管镜 麻醉机管道

【答案】：A

123、关于血液净化室的医院内感染管理,下列哪项不正确【单选题】——

A. 应对病人常规进行血液净化前肝功能、肝炎病原体等检查

B. 工作人员定期体格检查,加强个人防护

C. 透析器、管路应一次性使用

D. 传染病病人在隔离净化室进行血液净化,专机透析 急诊病人不需固定透析机

【答案】：E

124、属污染区的区域是【单选题】——

A. 更衣室

B. 库房

C. 走廊

D. 浴室 化验室

【答案】：D

125、属于低水平消毒剂的是【单选题】——

A. 戊二醛

B. 过氧乙酸

C. 碘伏

D. 氯己定 异丙醇

【答案】：D

126、隔离衣一般情况下更换时间是【单选题】——

- A. 72h
- B. 24h
- C. 6h
- D. 12h 48h

【答案】： B

127、和破损皮肤、黏膜相接触,而不进入无菌的组织内的器材适用于下列哪种方式消毒【单选题】——

- A. 灭菌剂或物理、化学灭菌方法
- B. 杀灭细菌繁殖体的消毒剂
- C. 应用灭菌剂或高效消毒剂
- D. 杀灭结核杆菌的消毒剂或中、低效消毒剂 应用物理灭菌方法

【答案】： C

128、新紫外线灯管输出功率不低于【单选题】——

- A. 60uw/cm<sup>2</sup>
- B. 100uw/cm<sup>2</sup>
- C. 80uw/cm<sup>2</sup>
- D. 90uw/cm<sup>2</sup> 110uw/cm<sup>2</sup>

【答案】： D

129、ICU【单选题】——

- A. 空气 $\leq 10\text{cfu}/\text{m}^3$ , 物体表面 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^3$ , 医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$
- B. 空气 $\leq 200\text{cfu}/\text{m}^3$ , 物体表面 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^3$ , 医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$
- C. 空气 $\leq 500\text{cfu}/\text{m}^3$ , 物体表面 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^3$ , 医护人员手 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$
- D. -, 物体表面 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^3$ , 医护人员手 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$  空气 $\leq 1000\text{cfu}/\text{m}^3$ , 物体表面 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^3$ , 医护人员手 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^2$ ?下列各医疗区的细菌学指标是

【答案】： B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/948126064134006066>