

## 2022 年主管药师考试习题含答案

### 一、单项选择题（每小题 1 分，共 100 分）

1、药品临床使用单位必须配备的药学技术人员是

- A、药学大学毕业生
- B、药学研究生
- C、药学博士生
- D、依法经过资格认定的药学技术人员
- E、药学专家

**【答案】：D**

2、下列二氢吡啶类钙离子拮抗剂中 2, 6 位取代基相同的药物是

- A、尼莫地平
- B、尼群地平
- C、氨氯地平
- D、硝苯地平
- E、尼卡地平

**【答案】：D**

3、有关地高辛的叙述，下列哪项是错误的

- A、口服时肠道吸收较完全
- B、同服广谱抗生素可减少其吸收
- C、血浆蛋白结合率约 25%
- D、主要以原形从肾脏排泄
- E、肝肠循环少

**【答案】：B**

4、口服抗凝药与降血脂药和 HMG-CoA 还原酶抑制剂合用时应注意

- A、尽量避免将抗凝剂与氯贝特等降血脂药合并使用

B、监测 INR 和 PT

C、当开始使用降血脂药时，抗凝剂用量应减少；当停用降血脂药时，抗凝剂的用量增加

D、早先的证据表明 HMG-COA 还原抑制剂普伐他丁与华法林无相互作用

E、注意观察出血时的体征和症状

【答案】：C

5、糖尿病病人口服短效磺脲类降糖药的时间应在

A、每餐前 1 小时

B、每餐前半小时

C、同饭一同服

D、餐后半小时

E、餐后 1 小时

【答案】：B

6、下列叙述中有哪些是不正确的

A、磺酸基的引入使药物的水溶性增加，导致生物活性减弱

B、在苯环上引入羟基有利于与受体的结合，使药物的活性和毒性均增强

C、在脂肪链上引入羟基常使药物的活性和毒性均下降

D、季铵类药物不易通过血-脑脊液屏障，没有中枢作用

E、酰胺类药物和受体的结合能力下降，活性降低

【答案】：E

7、药物流行病学是将流行病的理论、知识、方法用于

A、研究药物在人群中的应用及效应

B、观察药物不良反应

C、观察药物的效应

D、研究药物在患者中的应用及效应

E、研究新药在人群中的应用及效应

【答案】：A

8、凡加工炮制毒性中药，必须遵守

A、《中华人民共和国药典》、《中药饮片炮制规范》

B、《中药志》、《中药饮片炮制规范》

C、《植物志》、《中华人民共和国药典》

D、《中药大辞典》、《中药饮片炮制规范》

E、《中药学》、《中华人民共和国药典》

【答案】：A

9、软膏剂的类型按分散系统分有3类，即

A、溶液型、糊剂型、乳剂型

B、溶液型、混悬型、乳剂型

C、糊剂型、凝胶型、混悬型

D、凝胶型、混悬型、乳剂型

E、溶液型、糊剂型、凝胶型

【答案】：B

10、液体黏度随剪切应力增加而增大的流动称为

A、塑性流动

B、胀性流动

C、触变流动

D、牛顿流体

E、假塑性流体

【答案】：B

11、强心苷最严重的毒性反应是

A、胃肠道反应

B、中枢神经系统反应

C、心脏反应(心律失常)

D、造血系统反应

E、泌尿系统反应

【答案】：C

12、不属于麻醉药品的是：

A、复方樟脑酊和速可眠胶囊

B、阿片粉和盐酸吗啡片

C、磷酸可待因片和硫酸吗啡控释片

D、盐酸可卡因粉和盐酸乙基吗啡粉

E、福尔可定片和美散痛片

【答案】：A

13、限量检查法中杂质限量的计算公式是

A、 $S / CV \times 100\%$

B、 $CVS \times 100\%$

C、 $VC / S \times 100\%$

D、 $CS / V \times 100\%$

E、 $VS / C \times 100\%$

【答案】：C

14、最容易引起水钠潴留的是

A、氢化可的松

B、地塞米松

C、泼尼松

D、醛固酮

E、可的松第一节肾上腺皮质激素

【答案】：D

15、患者，70岁。有冠状动脉供血不足病史，伴有心脏病，并开始服用华法林。一年后，医生开具考来烯胺治疗高胆固醇血症和伴行高甘油三酯血症，在患

者应用考来烯胺治疗后不久，患者出现消化道出血，并发现该患体有低凝血酶原血症。考来烯胺影响凝血是通过改变华法林和维生素 K 的

- A、吸收
- B、分布
- C、代谢
- D、排泄
- E、药效学

【答案】：A

16、喹诺酮类抗菌药限制在哪类人群使用

- A、成年人
- B、妇女
- C、儿童和青少年
- D、葡萄糖-6 磷酸脱氢酶缺乏病人
- E、感染病人

【答案】：C

17、苯巴比妥过量急性中毒，为加速其从肾排泄，应采取的主要措施是：

- A、静注大剂量维生素 C
- B、静滴碳酸氢钠
- C、静滴 10% 葡萄糖液
- D、静滴甘露醇
- E、静滴低分子右旋糖酐

【答案】：B

18、医院药剂科是集

A、药品采购供应、调剂制剂、经济管理、临床药学、科研工作及贯彻执行药事法律法规等为一体的综合性科室

B、药品采购供应、调剂制剂、经济管理、临床药学、科研工作的综合性科室

- C、药品采购供应、经济管理、临床药学的综合性科室
- D、药品法律法规贯彻执行的医技科室
- E、药品的采购供应、生产研究、临床药学的综合性科室

【答案】：A

19、属化学药品注册分类3和4的新药，应进行人体药动学研究和至少100对随机对照I临床试验。多个适应证的，每个主要适应证的病例数不少于

- A、50例
- B、60例
- C、70例
- D、80例
- E、100例

【答案】：B

20、患者女性，50岁。有轻度甲状腺功能亢进病史2年，并患有支气管哮喘，合用下列药物半年，出现皮肤变薄、多毛、糖尿。引起这些不良反应的药物是

- A、卡比马唑
- B、曲安西龙
- C、沙丁胺醇(哮喘严重时使用)
- D、甲硫氧嘧啶(与卡比马唑交替使用)
- E、氨茶碱

【答案】：B

21、巴比妥类药物鉴别反应的主要根据是

- A、具有2位不饱和碳氧双键
- B、丙二酰亚胺结构
- C、具有2个亚胺结构，但仅可在水中产生一级电离
- D、一取代时与取代基相连的碳上含有氢，可以发生互变异构
- E、互变异构以后，可以形成3个羟基，形成3个氧负离子

【答案】：B

22、首过效应主要发生于下列哪种给药方式

- A、静脉给药
- B、口服给药
- C、舌下含化
- D、肌肉注射
- E、透皮吸收

【答案】：B

23、下列疾病中禁用糖皮质激素类药物的是

- A、中毒性痢疾
- B、感染性休克
- C、活动性消化性溃疡
- D、重症伤寒
- E、肾病综合征

【答案】：C

24、水合氯醛的中毒血浓度和致死血浓度分别为

- A、 $100 / \mu\text{g} / \text{ml}$  和  $200 / \mu\text{g} / \text{ml}$
- B、 $100 \mu\text{g} / \text{ml}$  和  $250 / \mu\text{g} / \text{ml}$
- C、 $150 \mu\text{g} / \text{ml}$  和  $250 \mu\text{g} / \text{ml}$
- D、 $200 \mu\text{g} / \text{ml}$  和  $300 / \mu\text{g} / \text{ml}$
- E、 $50 / \mu\text{g} / \text{ml}$  和  $150 \mu\text{g} / \text{ml}$

【答案】：B

25、强心苷中毒引起的快速性心律失常疗效最好的药物是

- A、普萘洛尔
- B、维拉帕米
- C、苯妥英钠

D、利多卡因

E、胺碘酮

**【答案】：C**

26、医生开药，病人用药都是因为药物具有

A、某种合乎人体需要的作用

B、对人体的好处

C、有很多副作用

D、没有副作用

E、病人的要求

**【答案】：A**

27、制备注射剂过程中所使用的玻璃容器的质量要求不包括

A、无色透明

B、具有较高熔点

C、具有低膨胀系数

D、化学稳定性高

E、不得有气泡、麻点与沙粒

**【答案】：B**

28、在 Window95 中，有两个对系统资源进行管理的程序组，它们是资源管理器和

A、回收站

B、剪贴板

C、我的电脑

D、我的文档

E、开始菜单

**【答案】：C**

29、H1 受体阻断药的中枢镇静作用最强的是



- A、苯海拉明
- B、布克利嗪
- C、赛庚啶
- D、美克洛嗪
- E、马来酸氯苯那敏

【答案】：A

30、药物经济学研究中的间接成本包括患者的

- A、药物费用
- B、床位费
- C、检验费
- D、诊疗费
- E、往返医院的交通费用

【答案】：E

31、与氨基苷类抗生素或多黏菌素合用时，易致呼吸麻痹的药物是

- A、新斯的明
- B、毒扁豆碱
- C、琥珀胆碱
- D、毛果芸碱
- E、后马托品

【答案】：C

32、已经得到的维生素A立体异构体有几种

- A、2种
- B、4种
- C、6种
- D、8种
- E、10种

【答案】：C

33、两性霉素 B 抗真菌的作用于机制是

- A、竞争性抑制鸟嘌呤进入 DNA 分子，干扰 DNA 合成
- B、替代尿嘧啶进入 DNA 分子中，阻断核酸合成
- C、抑制以 DNA 为模板的 RNA 多聚酶，阻碍 mRNA 合成
- D、选择性与细胞膜的麦角固醇结合，增加膜的通透性
- E、选择性抑制细胞色素 P450 依赖性的 14- $\alpha$  脱甲基酶

【答案】：D

34、药典规定按干燥品(或无水物，或无溶剂)计算是指

- A、取经过干燥的供试品进行试验
- B、取除去溶剂的供试品进行试验
- C、取经过干燥失重的供试品进行试验
- D、取供试品的无水物进行试验
- E、取未经干燥的供试品进行试验，再根据测得的干燥失重在计算时从取样量中扣除

【答案】：E

35、非处方药目录的遴选、审批、发布和调整工作由：

- A、劳动和社会保障部负责
- B、卫生部负责
- C、科学技术部负责
- D、国家药品监督管理局负责
- E、国家质量技术监督局负责

【答案】：D

36、药物借助其脂溶性或膜内蛋白的载体作用，穿过细胞而被吸收的过程是

- A、细胞旁路通道转运
- B、主动转运

- C、被动扩散
- D、促进扩散
- E、细胞通道转运

【答案】：E

37、脂质体具有哪些特性不包括

- A、靶向性
- B、缓释性
- C、降低药物毒性
- D、放置很稳定
- E、提高药物稳定性

【答案】：D

38、异烟肼产生的不良反应不包括

- A、神经系统毒性，如周围神经炎
- B、消化道反应
- C、肝脏损害，如转氨酶升高，黄疸
- D、肾脏毒性
- E、中枢神经系统毒性反应

【答案】：D

39、下列哪个药物本身不具有生物活性，须经体内代谢活化后才有活性

- A、维生素 E
- B、维生素 C
- C、维生素 A 醋酸酯
- D、维生素 D<sub>3</sub>
- E、维生素 K<sub>3</sub>

【答案】：D

40、负责全国医疗机构药事管理工作的机构是：

- A、卫生部
- B、国家中医药管理局
- C、国家药品监督管理局
- D、卫生部和国家中医药管理局
- E、卫生部和国家药品监督管理局

【答案】：D

41、用 40%司盘 60 (HLB=4.7) 和 60%吐温 60 (HLB=14.9) 组成的混合表面活性剂的 HLB 是

- A、18.2
- B、10.82
- C、4.7
- D、14.9
- E、9.8

【答案】：B

42、黄体酮治疗先兆流产，必须肌肉注射给药的主要

- A、口服吸收缓慢
- B、口服后在消化道和肝内迅速破坏
- C、口服用药排泄快
- D、肌肉注射吸收迅速
- E、注射用药能维持较高浓度

【答案】：B

43、D、药学专业技术人员

E、调配人员

【答案】：D

44、药品在规定的储藏条件下保持其物理、化学指标稳定的指标

A、药品物理指标

- B、药品化学指标
- C、生物药剂学指标
- D、安全性指标
- E、稳定性指标

【答案】：E

45、三级医院药事管理委员会委员由哪些方面的专家组成

- A、高级技术职称的药学、临床医学、信息管理行政管理
- B、中级以上技术职称的药学、临床医学、医学检验、行政管理
- C、高级技术职称的药学、临床医学、院内感染管理、行政管理
- D、具备中级以上技术职称的执业医师、执业药师和行政主管
- E、高级技术职称临床药学、临床医学、行政管理

【答案】：C

46、医院药学部门的性质有：

- A、专业技术性
- B、信息指导性
- C、技术经济管理性
- D、行政职能性和工作多重性
- E、以上全部

【答案】：E

47、尼可刹米结构中有

- A、苯环
- B、呋喃环
- C、吡啶环
- D、哌啶环
- E、哌嗪环

【答案】：C

48、下列哪一项不属于阿司匹林的作用

- A、解热
- B、镇痛
- C、消炎抗风湿
- D、抗血小板聚集
- E、促进前列腺素合成

**【答案】：E**

49、抗心绞痛药共有的药理作用是

- A、扩张血管
- B、减少心肌耗氧量
- C、减慢心率
- D、抑制心肌收缩力
- E、减少心脏容积

**【答案】：B**

50、提高临床安全用药水平的方法，不包括

- A、了解病人的过敏史或药物不良反应史
- B、老人和成年人统一用药剂量
- C、肝病和肾病病人，适当减少剂量
- D、用药品种合理，避免不必要的联合用药
- E、注意早期发现不良反应，以便及时停药和处理

**【答案】：B**

51、处方：碘 50g、碘化钾 100g，蒸馏水适量，制成复方碘溶液 1000ml。碘化钾的作用是：

- A、助溶作用
- B、增溶作用
- C、潜溶作用

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/956234230200010043>