

病理学(医学高级)《诊断学基础考试答案》新版

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、单项选择题: 某患者疑诊为下呼吸道感染, 其病原学检查最好的标本是 ()。A. 鼻、咽拭子
B. 痰
C. 鼻咽洗液
D. 通过气管收集的标本
E. 静脉血
- 2、单项选择题: 关于 S2 分裂, 错误的是 ()。
A. 生理性分裂在青少年更常见
B. 二尖瓣狭窄伴肺动脉高压可通常有分裂
C. 固定分裂可见于先天性心脏病房间隔缺损
D. 反常分裂可见于完全性右束支传导阻滞
E. 主动脉瓣狭窄可出现逆分裂
- 3、单项选择题: 下列不属于先天性非溶血性黄疸的是 ()。A. Dubin-Johnson 综合征
B. Gilbert 综合征
C. 遗传性球形红细胞增多症
D. Crigler-Najjar 综合征
E. Rotor 综合征
- 4、单项选择题: 男性, 25 岁, 反复发作胸闷气促呼吸困难 8 年余, 再次发作 5 天入院, 查体双肺布满哮鸣音, 呼气音延长。首选作为监测患者病情的是 ()。A. PEF
B. 支气管舒张试验
C. MMF
D. 用力肺活量
E. 功能残气量
- 5、多项选择题: 脊柱侧凸可分为 ()。A. 骶段侧凸
B. 胸腰段联合侧凸
C. 腰段侧凸
D. 胸段侧凸
E. 颈段侧凸
- 6、单项选择题: 对创伤组织和脓肿标本的采集正确的是 ()。A. 对损伤范围较大的创伤, 应采集伤口处最典型的位置单一采集鉴定
B. 若标本过少则可用无菌低渗盐水以防干燥

- C. 封闭性脓肿采集时，则应在无菌的环境下切开，小心采集脓液或分泌物
- D. 开放性脓肿的采集，用无菌棉拭子采集脓液及病灶深部分泌物
- E. 创伤部位采集标本应先清除污物，但不可用碘酒、酒精消毒皮肤，以防影响检验结果
- 7、单项选择题：关于顺钟向转位的描述正确的是（ ）。A. QRS 电轴向右偏移
- B. QRS 电轴向左偏移
- C. 正常过渡区波形出现在 V1、V2 导联上
- D. 正常过渡区波形出现在 V5、V6 导联上
- E. 常见于左心室肥厚
- 8、多项选择题：病原菌鉴定的一般程序包括（ ）。A. 直接涂片
- B. 分离培养
- C. 生化鉴定
- D. 血清学鉴定
- E. 电镜观察
- 9、单项选择题：男性，35 岁，双手腕指关节疼痛 10 年，10 年前开始双手腕指关节早起时出现僵硬、不灵活感，以后出现疼痛，常服吲哚美辛、阿司匹林止痛，近 1 年止痛效果渐差，并出现腕关节及指关节肿胀变形。下列实验检查项目应首选（ ）。A. 血沉
- B. 血尿酸
- C. 类风湿因子
- D. 抗链球菌抗体
- E. C-反应蛋白
- 10、多项选择题：纤维支气管镜检查的并发症有（ ）。A. 术中、术后出血
- B. 气胸
- C. 术后发热
- D. 低氧血症
- E. 喉痉挛
- 11、单项选择题：引起包茎的常见原因不包括（ ）。A. 先天性包皮口狭窄
- B. 包皮炎症
- C. 包皮过长并狭窄
- D. 包皮外伤后粘连
- E. 阴茎癌
- 12、单项选择题：女，患者，16 岁，腰背疼痛半年，疼痛在弯腰时明显，伴有乏力、食欲不佳、午后低热来诊，查体，消瘦体型，前胸凹陷，脊柱胸腰段后突以胸 12 腰 1 明显，并有压痛。下列哪项检查作为首选（ ）。A. 脊柱照片
- B. 脊柱 CT
- C. 脊椎磁共振
- D. 结核抗体测定
- E. 血沉
- 13、单项选择题：引起不完全性代偿间歇的主要原因是（ ）。A. 节律重整
- B. 房室传导阻滞
- C. 窦房传入阻滞
- D. 异位搏动距窦房结较远

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/957145041003006105>