

老年照护中级练习题库与答案

1、 询问老年人的年、月、日、时是否清楚,是为了评定老年人的()

- A、 生活能力
- B、 工作能力
- C、 时间/空间定向
- D、 人物定向
- E、 心理状态

答案: C

难度系数为 C-A2-2,定向力是指老年人对时间、地点、人物以及自身状态的认识能力,其中对时间、地点的认识为时间/空间定向。故本题答案为 C。

2、 下列照护老年人使用外用药物的操作注意事项中,哪项不正确()

- A、 严格查对
- B、 使用前检查药物
- C、 操作者应洗净双手
- D、 避免损伤黏膜
- E、 药物用完后,可立即改变体位

答案: E

难度系数为 D-C1-3,在实施以上照护措施中,应该特别注意以下几点:(1)严格查对,不能出现服务对象错误和给药错误;(2)药物使用之前要检查药水有无过期、变色、浑浊、沉淀,充分摇匀;(3)动作应轻柔,避免损伤黏膜;(4)为了防止交叉感染,操作者应洗净双手,双侧都用药时,应先健侧、后患侧,先病情较轻侧、后病情较重侧;(6)药物用完后,不要立即改变体位,保证药物充分吸收.故本题应选 E。

3、 照护老人行超声雾化吸入治疗时,以下操作不正确的是()

- A、 水槽内加冷蒸馏水
- B、 药液用生理盐水稀释后放入雾化药液罐
- C、 先开雾化开关,再开电源开关
- D、 停用是先关雾化开关,再关电源开关
- E、 清洗雾化罐时动作轻柔,保护透声膜

答案: C

难度系数为 D-B1-1,使用超声雾化器时,先开电源开关,再开雾化开关。故本题应选 C。

4、 评估老年人认知功能的量表是()

- A、 MMSE
- B、 健康指数

- C、生活力量表
- D、抑郁量表
- E、焦虑量表

答案：A

难度系数为 G-A-3, 简明精神状态量表(MMSE)用于 60 岁以上疑有认知缺损老年人, 方法简便, 焦虑量表、抑郁量表是情绪评估, 生活力量表是评估日常生活能力。故本题应选 A。

5、王爷爷, 男性, 78 岁, 退休教师。高血压病史 9 年, 一周前晨起突发左侧肢体无力、活动障碍, 口角歪斜、口齿不清, 偶发进食呛咳。若王爷爷进行改良 Barthel 指数评定示中度功能缺陷, 其评分为()

- A、100 分
- B、75~95 分
- C、50~70 分
- D、25~45 分
- E、0~20 分

答案：C

难度系数为 F-A-3, 改良 Barthel 指数评定分级标准: 100 分=ADL自理; 75~95 分=轻度功能缺陷; 50~70 分=中度功能缺陷; 25~45 分=严重功能缺陷; 0~20 分=极严重功能障碍。

6、王爷爷, 87 岁, 上呼吸道感染 3 天。咳嗽、咳黏痰。医嘱: 超声波雾化吸入, 一天 2 次。照护人员指导王爷爷做超声波雾化吸入时, 不妥的是()

- A、吸入罐内放药液稀释至 30~50ml
- B、开机, 先调整定时器, 再调节雾量大小
- C、水温不超过 60℃不必关机
- D、吸入时间不超过 20 分钟
- E、完毕, 先关雾化开关, 再关电源开关

答案：C

难度系数为 D-B1-3, 水槽和雾化罐中切忌加温水或热水, 只能加冷蒸馏水或冷生理盐水; 使用时如水槽内水温超过 50℃或水量不足, 应关机更换冷蒸馏水。故本题应选 C。

7、吴奶奶, 10 年前出现记忆力下降, 老人脾气越来越暴躁, 偶尔出现攻击行为, 照护员为了避免攻击, 尽量减少与老人的接触与沟通, 不让老人出门。该失智症老年人照护员应对正确的是()

- A、减少与老人的接触
- B、营造安全环境

- C、减少与老人的沟通
- D、不让老人出门
- E、抗拒老人

答案：B

难度系数为 G-A-4,失智老年人攻击行为可能与沟通不良、照护不当,老人缺乏安全感有关,该照护员减少与老人的接触与沟通,不让老人出门是消极应对。故本题应选 B。

8、胡爷爷,70岁,医生开医嘱要求吸氧浓度达到45%,其流量应调节为:

- A、2L
- B、3L
- C、4L
- D、5L
- E、6L

答案：E

难度系数为 H-D-3,氧浓度=21+4×氧流量

9、通常情况下,临终老年人最后消失的是()

- A、听觉
- B、视觉
- C、触觉
- D、痛觉
- E、嗅觉

答案：A

难度系数为 I-A-1,人类死亡时最后消失的感知觉是听觉。故本题应选A。

10、李老伯,78岁,大学教授,非常爱干净,对于生活品质要求较高,一次在家里洗澡时,不慎摔伤骨折,住院治疗了一个月,之后需要回家进行慢性的康复治疗,由于儿女工作较忙,没时间照顾,经全家商议,选择住进养老院。儿女休息的时候也会经常去养老院看望老人,老人住进养老院后,看到周围都是护理型的老人,而且养老院提供的膳食也是集体供应,无法满足他的个性化的要求,口味、口感都满足不了他的要求,更重要的是李老伯认为周围的老年人文化层次较低,和他们没有共同语言,很难沟通、交流。因此情绪低落,郁郁寡欢,做什么也没有兴趣,心理健康出现了问题。照护人员为老年人开展心理照护,最重要的一项是()

- A、培养李老伯的业余爱好,积极参与活动
- B、建议子女将老人接回家照顾
- C、建议老人进行定期的心理相谈
- D、改善老人的生活环境,为老人提供个性的膳食服务

E、以上答案都不当

答案：C

难度系数为 E-B-3, 对于解决老年人心理问题较为有效的方法是相谈。通过相谈能解决老年人心里存在的疑问, 了解其心理活动状况。对李老伯来说, 首先要解决的问题是学会放松, 然后检讨自己的认知观念, 使之明白完美主义认识倾向使自己情绪陷入困顿的关键原因。他必须对自己看待问题的思维方法进行改进, 从而使他在认知改进的基础上进行情绪矫正。(10-12 题共用题干)

11、中级老年照护人员需要具备的职业能力之一: () 为老年人进行给药、观察、消毒、护理记录、急救处理以及常见病的技术护理照护。

- A、独立完成
- B、不能完成
- C、与医务人员一起
- D、指导医务人员
- E、协助医务人员

答案：E

难度系数为 A.-B.-3, 中级老年照护人员不具备独立开展医疗服务资质, 技术护理属于医疗服务范畴, 所以只能协助医务人员进行。故选择 C。

12、为老年人使用滴鼻剂, 有助于药物吸收的措施不包括 ()

- A、用药前清洁鼻腔
- B、滴药后轻轻揉按鼻翼两侧
- C、用药后保持头后仰位 1~2 分钟
- D、吐出由鼻腔流入口腔的药液
- E、协助老人滴药

答案：D

难度系数为 D-C2-2, 吐出由鼻腔流入口腔的药液, 目的是减少对口腔的刺激, 并非利于药物吸入, 故本题应选 D。

13、老年人跌倒后疑似有骨折时, 以下观察和处理不正确的是 ()

- A、骨折部位一般都有疼痛、肿胀、畸形、功能障碍等表现
- B、疑似有骨折时, 有出血者要先固定后止血
- C、骨折或疑为骨折时, 要避免移动伤者或伤肢
- D、疑似有骨折时, 搬运时要避免二次损伤
- E、骨折端刺破大血管时可能会出现大出血。

答案：B

难度系数为 H-C1-3,骨折或疑为骨折时,要避免移动伤者或伤肢,对伤肢加以固定与承托(有出血者要先止血后固定),使伤员在运送过程中不因搬运、颠簸而使断骨刺伤血管、神经,避免额外损伤,加重病情。

14、中级老年护理人员应具备以下职业能力:()、心理辅导技能能力、组织与沟通协调能力、法律意识与维权能力。

- A、专业照护技能能力
- B、基层管理能力
- C、组织活动能力
- D、基础医疗能力
- E、急救能力

答案: A

难度系数为 A-B-3,中级老年护理人员应具备以下职业能力:专业照护技能能力;心理辅导技能能力;组织与沟通协调能力;法律意识与维权能力。故选择 A 选项。

15、评估老年人行走活动能力时,需要具备的环境要求是()

- A、备有床、凳、轮椅等
- B、备有洗手盆、牙刷、梳子等
- C、备有 45m 的标尺地贴、上下阶梯等
- D、备有筷子、汤勺、碗等
- E、备有体温表、听诊器等

答案: C

难度系数为 C-A2-3,依照老年人的能力评估标准,需要测试老年人平地行走及上下楼梯的能力,所以在评估老年人行走活动能力时需要有地面长度标尺和上下阶梯。故本题答案为 C。

16、陶爷爷,76 岁,吸痰过程中出现了呼吸道粘膜损伤,下列哪项不是损伤的原因()

- A、吸痰管质量差,质地过硬
- B、动作粗暴,用力过猛
- C、老人烦躁不安,不合作
- D、呼吸道黏膜有炎症水肿
- E、吸痰前吸氧

答案: E

难度系数为 H-E-3,吸痰时引起呼吸道粘膜损伤的原因有:吸痰管质量差,质地过硬;动作粗暴,用力过猛;老人烦躁不安,不合作;呼吸道黏膜有炎症水肿。

17、为预防吸痰感染并发症的发生下列操作不正确的是()

- A、严格遵守无菌操作的原则
- B、操作时动作轻柔,避免损伤呼吸道粘膜
- C、加强口腔护理,保持清洁
- D、吸痰时可反复抽插吸痰管
- E、吸痰管不可重复使用

答案: D

难度系数为 H-E-3, 吸痰时不可反复抽插吸痰管

18、赵爷爷,78岁,过敏性鼻炎反复发作,鼻痒,鼻塞,流鼻涕,医嘱予以滴鼻剂滴鼻,一次2滴,一日3次。照护老年人使用滴鼻剂的操作注意事项中,最重要的是()

- A、遵医嘱用药
- B、保持鼻腔内清洁
- C、滴药后保持仰位10分钟,有利于药物吸收
- D、防止药物流入口腔
- E、观察老年人的反应

答案: A

难度系数为 D-C2-2, 照护老年人使用滴鼻剂时,最重要的是要遵医嘱用药,故本题应选 A。

19、下列哪项不是临终老年常见的症状()

- A、疼痛
- B、恶心、呕吐
- C、肌肉痉挛
- D、压疮
- E、感知觉功能减弱

答案: C

难度系数为 I-A-2, 临终老年常见的症状有疼痛、呼吸困难、进食困难、肌肉无力、感知觉功能减弱、皮肤湿冷、压疮等,不包括肌肉痉挛。故此题选 C。

20、在老年人能力评估时,请老年人从评估室内的台阶上下行走,是为了评估老年人的()。

- A、日常生活活动
- B、精神状态
- C、感知觉与沟通
- D、社会参与
- E、生活能力

答案: A

难度系数为 C-A2-2,日常生活活动能力是通过评估进食、洗澡、修饰、穿衣、大便控制、小便控制、如厕、床椅转移、平地行走、上下楼梯这几项日常生活必要活动获得,故本题答案为 A。

21、老年人常常产生空虚感,这是因为()

- A、老年人的子女长大后离家
- B、老年人的可支配的时间增多
- C、老年人缺乏自己感兴趣的活动的活动
- D、老年人的亲朋故友减少
- E、以上选择项全部正确

答案: E

难度系数为 E-A-3,老年人离退休或子女长大离家后,可支配的时间增多,如果没有新的内容来充实,缺乏自己感兴趣的活动的活动,亲朋故友的减少,就会感到百无聊赖,时辰难熬。空虚感是一种消极情绪,容易引起老年人失眠、不宁、对周围事物丧失兴趣,甚至对人生意义悲观失望。

22、搬运脊柱骨折的老年人时,错误的做法是()

- A、应采用硬板担架
- B、可两人徒手搬运
- C、搬运时保持老年人身体平直
- D、搬运时防止老年人头颈转动
- E、不可直接用布质担架运送老人

答案: B

难度系数为 H-C2-3,胸、腰椎损伤的老年人适用硬板担架,老年人采取仰卧位,受伤的胸、腰椎下方垫一约 10 厘米厚的小枕或衣物。4 人搬运适用于颈椎、腰椎骨折的老年人或病情较重的老年人,且在搬运过程中尽量抱持老年人身体平直,各部位受力均匀,避免再次伤害。

23、养老院中 72 岁的齐奶奶因高血压病、高血脂症,半月前曾出现短暂性左侧视力模糊,单侧肢体刺痛、麻木,医嘱长期服用络活喜、普伐他汀和阿司匹林给予降压、降脂和抗血小板治疗。照护人员协助齐奶奶用药,最重要的一项是()

- A、热心指导服药
- B、严格遵守医嘱
- C、及时发放药物
- D、注意观察
- E、及时记录

答案: B

难度系数为 D-C1-2, 照护人员协助老年人用药, 最重要的是遵医嘱准确用药。故本题应选 B。

24、照护老年人使用外用药的注意事项中, 错误的是()

- A、外用药保存时应盖紧药瓶, 置于通风、阴凉处
- B、遵医嘱用药
- C、若药物污染或变质, 严禁使用
- D、用药时, 个人药物可接触老年人身体
- E、数种药同时使用, 中间须间隔 5~10 分钟

答案: D

难度系数为 D-A-2, 用药时, 注意药剂开口不要触及老年人身体或非无菌物品, 以免污染药物。故本题应选 D。

25、老年人常常表现为墨守固执, 这主要是因为()

- A、老年人对新事物的接受能力下降
- B、老年人喜欢坚持传统和老办法
- C、老年人讨厌新奇的东西
- D、老年人偏爱旧的习惯和是的
- E、以上选择项全部正确

答案: E

难度系数为 E-A-3, 老年人较为固执而缺乏应变力, 主要是因为老年人对新事物的接受降低, 坚持传统和老办法, 讨厌新奇的东西, 偏爱旧的习惯和想法, 原因是记忆力减退和学习能力下降。

26、姜女士, 56 岁, 肺癌骨转移第二次入院, 疗效不佳, 呼吸困难显著, 疼痛剧烈, 患者感到痛苦、悲哀, 并试图自杀, 对此期患者的护理中, 不妥的一项是()

- A、多给患者同情和照顾
- B、允许家属陪伴
- C、尽量不让患者流露出失落、悲哀的情绪
- D、尽可能满足患者的需要
- E、加强安全保护

答案: C

难度系数为 I-B-3, 护理要点 1, 密切观察生命体征 2, 保持呼吸道通畅 3, 确保安全, 对意识丧失的病人应该使用保护具 4, 加强临床护理: (1)、眼的保护 (2)、做好口腔及皮肤的护理 (3)、肢体活动 5, 补充营养及水分 6, 注意大小便情况, 留置导尿者保持引流通畅 7, 保持溢流管通畅, 妥善固定 8, 密切观察病人的心理变化。综上, 故本题答案选择 C。

27、杜奶奶因交通事故导致血管破裂,鲜红的血从血管里喷射出来,则出血部位可能是()

- A、动脉
- B、静脉
- C、毛细血管
- D、毛细淋巴管
- E、以上都有可能

答案: A

难度系数为 H-B-3,动脉破裂出血的特点是:鲜红的血从血管里喷射出来。

28、不少老年人并不愿意别人处处对自己小心照顾,其主要原因是()

- A、自尊心
- B、空虚感
- C、自我中心
- D、怀旧感
- E、自卑感

答案: A

难度系数为 E-A-2,所谓自尊心是指他人的言行满足尊重自己的需要所产生的一种情感。凡是自我评价积极、自我肯定、自我尊重的人,其自尊心比较强。老年人一般都有较强的自尊心。这是一种积极的情绪,可以起自我约束、自我激励的作用。老年人希望得到他人的尊重,就会在有损自尊的行为面前有所约束,以维护自己的荣誉和尊严;自尊心还有利于老年人延长独立生活自理能力,减少对他人的依赖,因此,不少老年人并不愿意别人处处对自己小心照顾,因为那样反而容易让他产生无能感和衰老感;当自尊心的需要不能得到应有的满足时,老年人往往会以愤怒的情绪表现出来,或者产生自卑感。故答案是 A。

29、临终关怀着重对临终老人进行照料的内容不包括()

- A、疼痛的控制
- B、情绪的支持
- C、家属的心理指导
- D、老人的灵性需求
- E、X线照射

答案: E

难度系数为 I-A-1,在安宁照护阶段,不追求猛烈的、无意义的治疗,而是以减轻症状、解除痛苦、缓和情绪、提高老人生活质量为目的,包括严密观察老人生命体征、采取有效方法促进舒适、满足老人的心理需要和对家属进行心理指导。故此题选 A。

、杨奶奶吸氧过程中,要注意巡视观察杨奶奶的情况,下面哪项不是氧中毒的临床表现:

- A、体温升高
- B、恶心
- C、烦躁不安
- D、胸骨下不适
- E、呼吸增快

答案: A

难度系数为 H-D-3,氧中毒的表现有恶心、烦躁不安、胸骨下不适、呼吸增快等。

31、赵爷爷,80岁,前臂受伤,血流不止,照护人员对他实施急救.当用手按压伤口近肘一端时,血流仍不止;改为按压伤口近腕一端时,血流立即停止.由此推知受伤的血管是()

- A、动脉
- B、静脉
- C、毛细血管
- D、三种血管都有可能
- E、三种血管都不可能

答案: B

难度系数为 H-B-3,静脉血流方向是由远心端到近心端,所以按压伤口近腕一端时即远心端时,血流立即停止。

32、在老年人日常生活照料中,要特别关注老年人隐私的活动是()

- A、进食
- B、如厕
- C、修饰
- D、活动
- E、睡眠

答案: B

难度系数为 C-A2-3,在日常生活活动中,排泄活动是生活中每个人最隐私的部分。故本题答案为 B。

33、失智症照护中照护者要调整自己认知与心态,不应总是去纠正、责备或改变老人异常行为,要顺应老人采取科学照护措施。下列理由不正确的是()

- A、失智症老人认知功能出现障碍,异常行为是病症的表现
- B、改变失智老年人难,改变照护者自己才能照护好老人
- C、改变失智老年人难,会使照护者经历挫败和沮丧,工作不顺

- 、什么都顺着老人、依着老人的心愿来是机构照护的要求
- E、 照护者调整自己认知与心态,利于失智老年人照护问题的解决

答案: D

难度系数为 G-A-1,失智老年人记忆障碍、认知功能障碍后出现包括异常行为的系列症状,失智老人难以控制或者是无法改变,照护者要调整自己认知与心态,做快乐的照顾者,开心工作,科学地照护失智症老年人。故本题应选 D。

34、当站立支持面适宜,平衡干扰较小时,纠正站立平衡的对策是

- A、 踝对策
- B、 髌对策
- C、 跨步对策
- D、 稳定极限

答案: A

难度系数为 F-B-5, 踝对策, 坚固较大的支持面, 较小的外界干扰。如当人站在地毯上, 突然有人向后拉地毯, 身体会有向前倾倒的倾向。当身体有向前倾倒倾向时, 肌肉收缩, 使身体向后以免失去平衡。此刻头、躯干成为一个整体, 作为一个环节以踝为轴向后摆动。

35、老年人离退休综合症的心理照护方法, 下面正确是()

- A、 指导调整心态, 顺应变化
- B、 指导培养爱好, 寄托精神
- C、 指导老年人生活自律, 保健身体
- D、 指导老年人扩大社交, 排解寂寞
- E、 以上说法都正确

答案: E

难度系数为 E-B-2, 离退休综合症的心理照护方法有: 指导老年人调整心态, 顺应规律; 鼓励老年人发挥余热, 重归社会; 指导老年人善于学习, 渴求新知; 指导老年人培养爱好, 寄托精神; 鼓励老年人扩大社交, 排解寂寞; 指导老年人生活自律, 保健身体; 必要的药物和心理治疗。

36、失智症老年人预防走失措施中错误的是()

- A、 联合社区一起预防
- B、 给老年人戴上定位手表
- C、 不用预防
- D、 设计门禁系统
- E、 安排照护人员

答案: C

G-A-4,失智老年人走失预防很重要,可以通过社区联防、居住环境设计、定位手环、专门照护人员等进行预防。故本题应选 **C**。

37、关于失智症的症状表现,下列是失认的是()

- A、无法完成被指示的动作或话语
- B、常见的日常事物认识出现困难
- C、无法独立完成某项活动
- D、不能阅读或书写
- E、找不到东西称被别人拿了

答案: **B**

难度系数为 **G-A-3**,失认是指常见的日常事物认识出现困难,如过马路时,不能区分“红绿灯”指示,无法辨认回家的路。故本题应选 **B**。

38、机械抗阻训练适用于肌力几级以上的患者()

- A、1级
- B、2级
- C、3级
- D、4级
- E、5级

答案: **C**

难度系数为 **F-B-2**,略

39、老年人服用药物后,出现药物反应,以下照护人员的处理措施中,不正确的是()

- A、立即停药,马上通知医生和家属
- B、出现呼吸不畅时,协助取平卧位
- C、心跳呼吸骤停,立即行心肺复苏
- D、观察病情并记录
- E、及时送往医院。

答案: **B**

难度系数为 **D-A-1**,老年人呼吸不畅时,应协助取半坐卧位,或协助老年人平卧,头偏向一侧,保持呼吸道通畅,防止窒息。故本题应选 **B**。

40、为老年人作雾化吸入,为缓解支气管痉挛,药物首选()

- A、卡那霉素
- B、地塞米松
- C、 α -糜蛋白酶
- D、氨茶碱
- E、舒喘灵

D

难度系数为 D-B1-3, 常见雾化用药: 抗生素, 如庆大霉素、卡那霉素等; 支气管解痉药物, 如氨茶碱、舒喘灵等; 稀化痰液、祛痰药物, 如糜蛋白酶、痰易净、沐舒坦等; 减轻水肿, 如地塞米松等。故本题应选 D。

41、秦奶奶, 78 岁, 因坠床造成骨盆骨折, 如抢救不及时延误了治疗, 可发生的严重并发症是

- A、直肠损伤
- B、膀胱、尿道损伤
- C、腰骶神经丛损伤
- D、腹膜后巨大血肿
- E、功能障碍

答案: D

难度系数为 H-C1-3, 骨盆骨折容易并发大出血。

42、关节活动度描述不正确的是

- A、关节运动时所通过的运动弧
- B、被动关节活动度较主动活动大
- C、远端骨与近端骨之间的夹角
- D、关节运动的范围

答案: C

难度系数为 F-A-3, 关节活动度指关节运动时所通过的运动弧或转动的角度。关节活动度分为主动关节活动度和被动关节活动度, 前者是由肌肉主动收缩产生, 后者由外力产生, 活动范围比前者大。

43、龙奶奶, 女, 76 岁, 脑梗塞, 神志清楚, 持续低流量给氧, 体质虚弱, 喉头痰多咳不出, 根据医嘱给予吸痰, 吸痰前不需要观察和评估的内容是 ()

- A、老人的痰量
- B、老人痰液的粘稠度
- C、老人呼吸道痰液的排出能力、合作能力
- D、环境安静、光线适宜
- E、给氧的方式及氧流量

答案: D

难度系数为 H-D-3, 吸痰前应仔细观察评估老人的痰量、痰液的粘稠度, 老人呼吸道痰液的排出能力、合作能力及给氧的方式及氧流量

44、岗位管理的基础与核心是 ()

- A、岗位制度
- B、岗位分析

- 、 岗位任务
- D、 岗位能力
- E、 岗位认知

答案： B

难度系数为 B-B1-3, 岗位分析通过全面系统的情报手段收集岗位资讯, 对岗位目的、工作任务、责权关系、任职条件等进行说明。在岗位管理的各工作任务中, 居于核心和基础地位。故本题应选 B。

45、渐近性肌肉放松训练记录的主要内容包括()

- A、 时间: 训练日期和训练时长
- B、 训练过程中出现的问题及处置
- C、 训练效果
- D、 照护人员签名
- E、 以上选项全部正确

答案： E

难度系数为 E-B-3, 第五步: 记录, 其主要工作包括以下几个方面: 1 时间: 训练日期和训练时长; 2. 训练过程中出现的问题及处置; 3. 训练效果; 4. 预约下次训练时间; 5. 照护人员签名;

46、照护老年人使用滴眼剂的操作注意事项中, 错误的是()

- A、 严格查对
- B、 白天宜用眼膏, 临睡前用滴眼剂
- C、 使用眼药水前应先混匀药液
- D、 动作宜轻柔
- E、 先病情较轻侧、后病情较重侧

答案： B

难度系数为 D-C1-2, 照护老年人使用滴眼药时, 白天用眼药水, 临睡前宜用眼膏。故本题应选 B。

47、属于老年人身体攻击行为的表现是()。

- A、 踢打
- B、 尖叫
- C、 谩骂
- D、 情绪低落
- E、 自杀念头

答案： A

C-A2-3, 攻击行为分为身体攻击行为(如打/踢/推/咬/抓/摔东西)或语言攻击行为(如骂人、语言威胁、尖叫),“踢打”属于身体攻击行为,故本题的答案为 A。

48、中级老年照护人员不仅要具备一定的专业理论知识水平和操作技能,而且要有良好的职业素养、职业素质、职业能力和()。

- A、职业操守
- B、职业敏感性
- C、职业认同
- D、职业规划
- E、职业发展

答案: A

难度系数为 A-A-2,中级老年照护人员不仅要具备一定的专业理论知识水平和操作技能,而且要有良好的职业素养、职业素质、职业能力和职业操守。题干中缺少“职业操守”这个选项,故正确答案为 A。

49、杨爷爷,男,78岁,诊断为失智症6年,现已完全失能,卧床不起,需要全护理,夜间会大喊大叫,表现痛苦,老年人对照护人员有抗拒行为。对该老年人抗拒照护行为处理正确的是()

- A、拒绝就不执行照护
- B、强制老人
- C、了解需求,注意沟通,安抚老人,建立老人安全感
- D、联系家属处理
- E、延缓照护

答案: C

难度系数为 G-D-3,晚期失智老年人表达能力有限,这种抗拒行为需要了解老年人真正需求所在,其他措施都不妥。故本题应选 C。

50、对临终老年人实施心理照护,不包括以下哪一点()

- A、观察病情变化
- B、重视与弥留之际老年人的心灵沟通
- C、耐心倾听和诚恳交谈
- D、触摸
- E、鼓励老人说出内心的不快

答案: A

难度系数为 I-B-3,观察病情变化不属于心理照护范围。故本题应选 A。

51、王奶奶,75岁,家庭主妇。左侧肢体瘫痪入院,诊断为右侧基底节脑梗死恢复期,现在发病三个月,病情稳定,左侧肢体瘫痪,肌张力增高,Ashworth 分

级评定3级,Barthel 指数评分55分,Brunnstrom 偏瘫运动功能评定III级。左侧深浅感觉障碍,左肩关节半脱位、左足下垂、内翻,扶拐可在室内短距离步行。但患者生活不能自理,主动性差,依赖他人。高血压病史10余年,无心脏病。请为王奶奶进行床上转移康复训练。以下卧位坐起训练步骤中,哪一项错误的:

- A、向患侧坐起,应先转向患侧
- B、向健侧坐起,应先转向健侧
- C、向患侧坐起时,用患手和上肢支撑坐起
- D、向健侧坐起时,把健侧肩膀和上肢移到身体下

答案: C

52、杜奶奶因交通事故导致血管破裂,鲜红的血从血管里喷射出来,则出血部位可能是()

- A、动脉
- B、静脉
- C、毛细血管
- D、毛细淋巴管
- E、以上都有可能

答案: A

难度系数为 H-B-3,动脉破裂出血的特点是:鲜红的血从血管里喷射出来。

53、下列不属于濒死期循环衰竭临床表现的是()

- A、皮肤苍白
- B、心音低而无力
- C、四肢冰冷
- D、脉搏呈洪脉
- E、血压下降

答案: D

54、以下哪一项体现了照护管理制度拟定对于适用性的要求。()

- A、应以能解决实际问题为标准,不求多求繁。
- B、应全盘考虑各管理制度之间的系统与匹配。
- C、应随着实际情况变化进行修改完善。
- D、应合乎国家法律法规的相关要求。
- E、应合乎行业规范的相关要求。

答案: A

难度系数为 B-C1-3,B、C、D、E 分别体现了照护管理制度拟定对于系统性、科学性和合法性的要求。适用性讲的是制度应该适用于管理实际,既不能拔高又不能降低,只有适用才能让员工更好的接受、理解和执行。故本题应选 A。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/958103137032006067>