

2022 年基层预防接种工作全员培训试卷和答案（4）

共 3 种题型，共 150 题

一、单选题(共 50 题)

1. 白喉杆菌的唯一天然宿主是。（ ）

A: 鸡

B: 蚊虫

C: 猪

D: 人

【答案】: D

2. 接种单位应当将接收和领取疫苗的记录保存至超过有效期__年备查？（ ）

A: 1

B: 2

C: 5

D: 10

【答案】: C

3. 以下关于特殊儿童接种建议，错误的是：（ ）

A: 食物过敏的急性反应期（如并发哮喘、荨麻疹等）或接种部位皮肤异常（湿疹、特应性皮炎等），应暂缓接种，待恢复正常后，可按免疫程序正常接种免疫规划疫苗

B: 先天性心脏病儿童，如生长发育良好，无临床症状，心功能无异

常，可以正常接种国家免疫规划疫苗

C: 先天性心脏病儿童外科手术后 3 个月，复查心功能无异常者，可以正常接种国家免疫规划疫苗

D: 湿疹患儿应避免接种减毒活疫苗，以免加重湿疹疾病症状

【答案】: D

4. 甲肝病人粪便排出甲肝病毒始于。()

A: 发病前 1 月

B: 发病前 2~3 周

C: 发病前 1 周

D: 临床症状出现

【答案】: B

5. 现况调查主要分析指标是:。()

A: 发病率

B: 病死率

C: 死亡率

D: 患病率

【答案】: D

6. 甲肝疫苗纳入免疫规划后出生且未接种甲肝疫苗的适龄儿童, 如果使用甲肝灭活疫苗进行补种, 应补齐 2 剂次, 接种间隔不小于_____月。()

A: 1

B: 3

C: 6

D: 12

【答案】: C

7. 水痘传染源的隔离治疗一般应隔离至出疹后。()

A: 3 天

B: 14 天

C: 7 天

D: 21 天

【答案】: C

8. 下面关于疫苗接种皮肤消毒的说法, 哪种是不正确的? ()

A: 接种部位要避开疤痕、炎症、硬结和皮肤病变处

B: 可用灭菌镊子夹取 75%乙醇棉球或用无菌棉签蘸 75%乙醇进行皮肤消毒

C: 可用 2%碘酊进行皮肤消毒

D: 要由内向外螺旋式对接种部位皮肤进行消毒, 涂擦直径 $\geq 5\text{cm}$

【答案】: C

9. 疫苗预防接种完成后, 应留观_____分钟后方可离开留观现场。()

A: 10

B: 20

C: 30

D: 60

【答案】: C

10. 可以申请预防接种异常反应鉴定的是。()

- A: 受种者或者监护人
- B: 接种单位
- C: 疫苗生产企业
- D: 以上都是

【答案】: D

11. 以下对 AFP 监测指标的要求, 错误的是()

- A: AFP 病例报告后 48 小时内调查及时率 $\geq 80\%$;
- B: AFP 病例大便标本 14 天内送达省级脊灰实验室及时率 $\geq 80\%$;
- C: 15 岁以下儿童非脊灰 AFP 病例报告发病率 $\geq 1/10$ 万
- D: AFP 病例 14 天内双份合格大便标本采集率 $\geq 80\%$

【答案】: B

12. AFP 病例完成便标本采样后, 应该在天内将标本送达省级疾控机构? ()

- A: 2 天
- B: 7 天
- C: 14 天
- D: 28 天

【答案】: B

13. 预防接种门诊应于每月____日前上报上月国家免疫规划疫苗常规接种情况报表和非免疫规划疫苗接种情况报表。()

- A: 3

B: 5

C: 10

D: 15

【答案】: B

14. 冷链设备档案信息维护周期是。()

A: 一年

B: 6 个月

C: 3 个月

D: 1 个月

【答案】: A

15. 异地 AFP 病例的管理, 归属 ()

A: 暂住地县级以上疾控机构管理

B: 原居住地县级以上疾控机构管理

C: 现就诊地县级以上疾控机构管理

D: 以上都不对

【答案】: B

16. 白喉棒状杆菌最适宜的生长温度是。()

A: 2°C~8°C

B: 10°C~20°C

C: 35°C~37°C

D: 56°C~90°C

【答案】: C

17. 2℃至 8℃之间可以存放的疫苗包括：（ ）

A: 麻疹疫苗、麻腮风疫苗、麻腮疫苗、麻风疫苗、甲肝灭活、脊灰疫苗。

B: 流脑疫苗、乙脑减毒活疫苗、脊灰疫苗、百白破疫苗

C: 麻疹疫苗、麻腮风疫苗、麻腮疫苗、麻风疫苗、乙脑减毒活疫苗

D: 流脑疫苗、乙脑减毒活疫苗、乙肝疫苗、脊灰疫苗

【答案】: C

18. 麻疹特异性口腔粘膜斑通常出现在哪期临床经过？（ ）

A: 前驱期

B: 出疹期

C: 恢复期

D: 各期均有

【答案】: A

19. 下列标本中不能用于腮腺炎病毒分离的是：（ ）

A: 咽拭子

B: 尿液

C: 粪便

D: 脑脊液

【答案】: C

20. 某预防接种门诊 2014 年服务总人口为 50000 人, 出生率为 10%。

2014 年 AC 流脑结合疫苗使用量为 150 支(主要应用于 2 岁以下儿童),

A 群流脑疫苗(损耗系数 2.5)使用量为 400 支, 则该 A 群流脑疫苗

第 1、2 剂次估算接种率为 () (估算接种率=疫苗使用量/出生人口数, 计算公式为: $(150+400 \times 5 \text{ 人份} \div 2.5 \text{ 损耗系数}) / (50000 \times 10\% \times 2 \text{ 剂次}) \times 100\%=95\%$)

- A: 90%
- B: 92.5%
- C: 95%
- D: 97.5%

【答案】: C

21. 下列哪种温度计不适于测定冰箱温度? ()

- A: 酒精温度计
- B: 水银温度计
- C: 液晶温度计
- D: 指针温度计

【答案】: C

22. 关于 AFP 病例随访, 以下正确的是 ()

- A: 麻痹后 30 天随访
- B: 麻痹后 45 天随访
- C: 麻痹后 60 天随访
- D: 麻痹后 75 天随访

【答案】: C

23. 在接种场所显著位置公示的相关资料, 不包括下列哪种 ()

- A: 免疫规划疫苗的品种、免疫程序、接种方法等

- B: 非免疫规划疫苗的品种、免疫程序、接种方法、接种服务价格等
- C: 疫苗厂家的服务电话
- D: 预防接种工作流程

【答案】: C

24. _____属于减毒活疫苗。()

- A: 百白破疫苗
- B: 白破疫苗
- C: 乙脑疫苗
- D: 流感裂解疫苗

【答案】: C

25. 对于麻疹病人的密切接触者，应医学观察天。()

- A: 7 天
- B: 14 天
- C: 21 天
- D: 28 天

【答案】: C

26. 急性乙肝血清中最迟出现的标志物是:。()

- A: 乙肝病毒表面抗原 (HBsAg)
- B: 乙肝病毒 e 抗原 (HBeAg)
- C: 乙肝病毒表面抗体 (抗-HBs)
- D: 乙肝病毒 e 抗体 (抗-HBe)

【答案】: C

27. 预防接种单位发现包装无法识别、超过有效期、脱离冷链、来源不明等非免疫规划疫苗时，应当逐级上报至_____。（ ）

- A: 省级疾病预防控制机构
- B: 市级疾病预防控制机构
- C: 县级疾控预防控制机构
- D: 卫生行政部门

【答案】: C

28. 以下属于儿童常规接种疫苗的是（ ）

- A: 水痘疫苗
- B: 乙脑疫苗
- C: 流感疫苗
- D: 轮状病毒疫苗

【答案】: B

29. 最有效预防麻疹的措施是。（ ）

- A: 应用免疫球蛋白
- B: 接种含麻疹成分疫苗
- C: 应用胎盘球蛋白
- D: 应用维生素 A

【答案】: B

30. 在乙肝病毒标记物中对人体有保护作用的是:。（ ）

- A: 乙肝病毒表面抗体（抗-HBs）
- B: 乙肝病毒核心抗体（抗-HBc）

C: 乙肝病毒 DNA 多聚酶 (DNAP)

D: Dane 颗粒

【答案】: A

31. 某疫苗标注失效期为 2015 年 5 月, 则该疫苗可以使用到。()

A: 2015 年 4 月 30 日

B: 2015 年 5 月 1 日

C: 2015 年 5 月 31 日

D: 2015 年 6 月 1 日

【答案】: A

32. 水痘是一种传染性极强的疾病, 在时期传染性最强? ()

A: 疾病早期

B: 疾病中期

C: 疾病晚期

D: 恢复早期

【答案】: A

33. 预防接种人员应该在每次完成接种后多久将接种信息录入信息系统客户端? ()

A: 即时录入

B: 3

C: 5

D: 10

【答案】: A

34. 新冠病毒疫苗疑似预防接种异常反应报告发生率应在范围。()

A: $\geq 1/10$ 万剂次

B: $\leq 1/10$ 万剂次

C: $\geq 1/100$ 万剂次

D: $\leq 1/100$ 万剂次

【答案】: A

35. 临床甲肝急性感染诊断最重要的血清免疫学检测指标为:()

A: 抗 HAV-IgG

B: 抗 HAV-IgM

C: 抗 HAV-Ab

D: HAV-RNA

【答案】: B

36. 下列关于预防接种证, 说法错误的是()

A: 预防接种证按照受种者的居住地实行属地化管理

B: 预防接种证在新生儿出生后由医疗机构产科接种室发放

C: 预防接种证由家长保存

D: 预防接种证丢失后可以到任何一个预防接种门诊补办

【答案】: D

37. 以下说法错误的是?()

A: 在注射灭活疫苗时, 使用相应的抗菌药物, 会对疫苗效果产生影响

B: 接种单位接种免疫规划疫苗不得收取任何费用

C: 两种灭活疫苗可以在同一天在不同部位接种,也可以在不同时间、不同部位接种

D: 接种疫苗后应在接种门诊的留观区域留观 30 分钟

【答案】: A

38. 水痘皮疹的主要特点是? ()

A: 向心性

B: 离心性

C: 弥漫性

D: 散发性

【答案】: A

39. 某乡镇 2014 年出生儿童数为 500 人, 2014 年底库存 A 群流脑疫苗为 50 支, AC 流脑结合疫苗替代率为 10%, 该乡镇 2015 年 A 群流脑疫苗的计划用量为____支。() (500 人×2 剂次÷5 人份×2.5 损耗系数×(1-10%) 替代-50 库存)

A: 300

B: 400

C: 450

D: 500

【答案】: B

40. 新冠病毒疫苗调查诊断专家组在作出调查诊断结论后工作日内, 将调查诊断书送受种防、接种单位、疫苗上市许可持有人。()

A: 5

B: 10

C: 14

D: 30

【答案】: B

41. 发现脊灰野病毒病例，需要在病毒可能传播的地区采集至少名接触者或健康人群的粪便标本。优先采集岁以下儿童粪便标本。（ ）

A: 30; 5

B: 30; 15

C: 50; 5

D: 50; 15

【答案】: C

42. 下列关于低温冰箱维护和保养说法错误的是（ ）

A: 用温湿软布擦低温冰箱的内外面；污渍严重时，可用碱性洗涤剂擦拭，然后用洗净的软布擦净水渍

B: 低温冰箱一旦启用，最好连续使用

C: 切勿直接把水洒在低温冰箱上，以免造成电器元件绝缘性能下降和金属件生锈

D: 切勿使用热水和有腐蚀性的清洁剂或有机溶剂等清洁医用低温箱，也勿用硬毛刷、钢丝刷清洗。

【答案】: A

43. 关于白喉潜伏期的说法，正确的是_____。（ ）

A: 潜伏期 1~7 天，多数为 2~4 天

- B: 潜伏期 1~3 天, 多数为 1~2 天
- C: 潜伏期 5~10 天, 多数为 6~7 天
- D: 潜伏期 10~15 天, 多数为 12~13 天

【答案】: A

44. 免疫规划疫苗需要在最小外包装的显著位置标明“免费”字样和“_____”专用标识。()

- A: 国家免疫
- B: 扩大免疫
- C: 免疫规划
- D:
- E: PI

【答案】: C

45. 2012 年 5 月, 我国提前实现了 WHO 西太区提出的到 2012 年将 5 岁以下儿童慢性乙肝病毒感染率降至以下的地区控制目标。()

- A: 1%
- B: 2%
- C: 3%
- D: 5%

【答案】: B

46. 乙肝疫苗、卡介苗、脊灰灭活疫苗、百白破疫苗、麻风疫苗、麻腮风疫苗、白破疫苗、乙脑灭活疫苗、A 群流脑疫苗、A+C 群流脑疫苗的贮存条件是 ()

A: 5℃~10℃

B: 2℃~8℃

C: 2℃~20℃

D: 5℃~20℃

【答案】: B

47. 我国最新研制的戊肝疫苗的适用人群为。()

A: 0-6 岁

B: 1 岁以上

C: 16 岁以上

D: 各年龄段人群

【答案】: C

48. 下列关于脊髓灰质炎疫苗的说法有误的是? ()

A: bOPV 和 IPV 都可以预防脊髓灰质炎

B: 给有肛周脓肿的患儿服用 bOPV 要慎重

C: 序贯程序可以减少脊灰疫苗相关病例 (VAPP) 发病风险

D: bOPV 目前属于非免疫规划疫苗

【答案】: D

49. 不需要每台 (件) 疫苗冷链设备录入一条记录的是: ()

A: 冷藏箱

B: 发电机组

C: 台式小冰箱

D: 冷藏包

【答案】: D

50. 疫苗可预防白喉。()

A: DTP

B: BCG

C: OPV

D: HBV

【答案】: A

二、多选题(共 50 题)

51. 关于群体性疑似预防接种异常反应的表述正确的是 ()

A: 短时间内同一接种单位的受种者中, 发生 2 例及以上相同或类似临床症状的严重预防接种异常反应

B: 短时间内同一接种单位的受种者中, 发生 2 例及以上相同或类似临床症状的严重疑似预防接种异常反应

C: 短时间内同一接种单位的同种疫苗受种者中, 发生相同或类似临床症状的非严重预防接种异常反应明显增多

D: 短时间内同一接种单位的同种疫苗受种者中, 发生相同或类似临床症状的非严重疑似预防接种异常反应明显增多

【答案】: BD

52. 各型病毒性肝炎中, 可能出现无症状慢性携带者的有:。()

A: 甲型病毒性肝炎

B: 乙型病毒性肝炎

C: 丙型病毒性肝炎

D: 戊型病毒性肝炎

【答案】: BC

53. 常规免疫接种率报表中关于应种算法说法正确的是 ()

A: 0~6 岁适龄儿童, 在达到免疫程序某疫苗 (剂次) 起始月/年龄后, 即纳入当月某疫苗 (剂次) 应种对象报告管理

B: 患禁忌证适龄儿童不纳入应种统计报告

C: 报告月临时接种疫苗儿童, 按照疫苗 (剂次) 数 “应种+1, 实种+1” 进行应种统计报告

D: ≥ 7 岁儿童补种常规免疫疫苗, 按照疫苗 (剂次) 数 “应种+1, 实种+1” 进行应种统计报告

【答案】: ACD

54. 可以做出预防接种异常反应结论的组织包括 ()

A: 接种单位

B: 疾控机构

C: 调查诊断专家组

D: 医学会

【答案】: CD

55. 以下为百日咳疑似病例的有_____ ()

A: 阵发性、痉挛性咳嗽, 持续咳嗽 ≥ 2 周者

B: 婴儿有反复发作的呼吸暂停、窒息、青紫和心动过缓症状, 或有间歇的阵发性咳嗽; 青少年和成人具有不典型较轻症状, 卡他期、痉咳期、恢复期三期症状都缩短或无明显的阶段性, 而只表现持续两周

以上的长期咳嗽

C: 四季均有发病，春夏季多发，该地区有百日咳流行，有与百日咳患者的密切接触史，无预防接种史

D: 阵发性、痉挛性咳嗽，持续咳嗽 \geq 1周者

【答案】: AB

56. 免疫规划疫苗包括_____ ()

A: 国家免疫规划疫苗

B: 省级增加的国家免疫规划疫苗

C: 应急接种或群体性预防接种疫苗

D: 自愿自费接种的疫苗

【答案】: ABC

57. 对麻疹病例现住址的理解正确的是: ()

A: 麻疹发病时实际居住的地址，可以是家庭地址，也可以是宾馆、旅馆等住址。

B: 户籍地并不一定等于现住址。

C: 外地来本地长期(>3个月)打工病例，其户籍地即为现住址。

D: 病例如有一处以上住址时，应填写患病期间最容易随访到的住址。

E: 以上说法都正确。

【答案】: ABD

58. 癍症的处理原则有哪些? ()

A: 病人必需住院治疗

B: 无需特殊治疗

C: 暗示疗法为主

D: 可以对症处理

【答案】: BCD

59. 国家对疫苗实行最严格的管理制度，坚持。()

A: 安全第一

B: 风险管理

C: 全程管控

D: 科学监管

E: 社会共治

【答案】: ABCDE

60. 以下哪种疾病需要作为 AFP 病例进行报告 ()

A: 肌病

B: 急性多发性肌炎

C: 肉毒中毒

D: 低钾性麻痹

E: 短暂性肢体麻痹

【答案】: ABCDE

61. 以下哪些人群建议按照说明书全程使用 IPV 接种? ()

A: 原发性免疫缺陷

B: 胸腺疾病

C: 近期接受造血干细胞移植

D: 过敏体质

【答案】： ABC

62. 制定疑似预防接种异常反应监测方案的目的包括。（ ）

- A: 规范疑似预防接种异常反应监测工作
- B: 调查核实疑似预防接种异常反应发生情况和原因
- C: 为改进疫苗质量提供依据
- D: 为提高预防接种服务质量提供依据

【答案】： ABCD

63. 发生流脑聚集性病例疫情后，在开展常规疫情监测的基础上，要进行下列哪些监测工作？（ ）

- A: 日报告和“零病例”报告
- B: 主动监测与主动搜索
- C: 学校、托幼机构、工地等集体单位监测
- D: 应急接种监测

【答案】： ABCD

64. 以下属于预防接种单位的职责。（ ）

- A: 按照各项技术规范要求，具体实施预防接种工作
- B: 做好疫苗管理，保证疫苗冷链
- C: 开展疑似 AEFI 病例报告，对一般反应进行处理
- D: 开展健康教育和有关咨询活动

【答案】： ABCD

65. 下列关于风疹，正确的是（ ）

- A: 风疹传染源为病人，出疹前后传染性最强

- B: 风疹病人病后有较持久免疫力
- C: 风疹病毒主要侵犯上呼吸道黏膜，并可发展为病毒血症
- D: 我国人群中大多数人对风疹病毒易感，多数呈隐性感染
- E: 风疹病毒可导致婴儿畸形

【答案】: ABC

66. 预防接种证查验培训内容包括（ ）

- A: 纳入国家免疫规划疫苗的种类及其免疫程序
- B: 预防接种证查验、登记报表填写
- C: 查验结果报告（包括报告机构、时限、内容等）
- D: 漏种儿童补种

【答案】: ABCD

67. 疑似风疹病例定义是发热、出疹（全身性皮疹）并伴有下列临床症状之一者。（ ）

- A: 咳嗽
- B: 结膜炎
- C: 黏膜斑
- D: 淋巴结肿大
- E: 关节痛或关节炎

【答案】: DE

68. 关于门诊客户端的疫苗日结，以下说法正确的是（ ）

- A: 无论接种处理还是手工录入，只要接种记录是今天，接种站是本站，结算今天疫苗的时候就算进去

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/977031124065006056>