

公共卫生与预防医学考试题库

第一部分 单选题(300题)

1、肛管煮沸消毒时,操作错误的是【单选题】——

- A. 先将肛管洗刷干净
- B. 水沸后开始计时
- C. 肛管腔内注水,用纱布包好
- D. 冷水时放入 在沸水中持续 5~10 分钟

【答案】： D

2、浸泡无菌持物钳的容器应是【单选题】——

- A. 大口容器,盛用消毒液
- B. 大口容器,底部垫纱布
- C. 大口容器,盛用消毒液,底部垫无菌纱布
- D. 盛用消毒液,底部垫无菌纱布 大口容器,盛用消毒液,底部垫纱布

【答案】： A

3、医院感染的含义是【单选题】——

- A. 所有发生在医院内的细菌感染
- B. 因医疗器械消毒不严造成的感染
- C. 病人在住院期间发生的感染
- D. 病人在住院期间或医院职工在护理或治疗患者过程中发生的感染 医院内病人直接或间接传播引起的感染

【答案】： D

4、下列消毒剂中哪一种不能达到灭菌水平【单选题】——

- A. 甲醛
- B. 戊二醛
- C.

含氯消毒剂

D. 环氧乙烷 过氧化氢

【答案】：C

5、隔离衣一般情况下更换时间是【单选题】——

A. 72h

B. 24h

C. 6h

D. 12h 48h

【答案】：B

6、目前引起输血后肝炎的主要肝炎病毒为【单选题】——

A. 甲型肝炎病毒

B. 乙型肝炎病毒

C. 丙型肝炎病毒

D. 戊型肝炎病毒 庚型肝炎病毒

【答案】：C

7、SARS 传播最重要的途径是【单选题】——

A. 接触传播

B. 飞沫传播

C. 气溶胶传播

D. 血液-体液传播 空气传播

【答案】：B

8、关于消毒因子对人体的危害,错误的是【单选题】——

A. 微波对人体无害

B. 液体消毒剂可以造成人体过敏

C. 紫外线直接照射可伤害人体皮肤和角膜

D. 环氧乙烷泄漏不仅对人体直接有毒,还可以发生爆炸 吸入戊二醛气体对人体有害

【答案】：A

9、下列内镜需灭菌但除外【单选题】——

- A. 脑室镜
- B. 胸腔镜
- C. 腹腔镜
- D. 关节镜 支气管纤维镜

【答案】：E

10、高效消毒剂【单选题】——

- A. 0.5%碘伏
- B. 2%戊二醛
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】：B

11、对门诊胃镜室使用过的纤维胃镜进行消毒,应该选择的消毒溶液是

【单选题】——

- A. 1%氯胺溶液
- B. 5%碘伏
- C. 0.1%苯扎溴铵溶液
- D. 2%碱性戊二醛溶液 0.2%过氧乙酸溶液

【答案】：D

12、减少免疫功能低下者发生医院感染的措施不正确的是【单选题】

——

- A. 尽量减少侵入性操作
- B. 大量应用广谱抗菌作用预防感染
- C. 积极发现和治疗局部病灶和潜在性感染
- D. 采取保护性隔离措施,切断感染途径 采用选择性脱污染措施,减少内源性感染

【答案】：B

13、无需执行昆虫隔离的疾病是【单选题】——

- A.

疟疾

- B. 气性坏疽
- C. 斑疹伤寒
- D. 流行性出血热 流行性乙型脑炎

【答案】： B

14、关于医院感染的概念错误的是【单选题】——

- A. 医院感染是指在医院内获得的感染
- B. 与上次住院有关的感染是医院感染
- C. 入院时处于潜伏期的感染一定不是医院感染
- D. 出院之后发生的感染可能不是医院感染 婴幼儿经胎盘获得的感染是医院感染

【答案】： E

15、预防免疫功能低下病人发生医院内感染不正确的是【单选题】——

- A. 注射相关疫苗
- B. 全身使用广谱抗生素预防感染
- C. 治疗局部感染病灶
- D. 保护性隔离 保护皮肤黏膜的完整性

【答案】： B

16、发现医院感染流行趋势时,医院感染科应在多长时间内报告医院主管领导和主管部门【单选题】——

- A. 48h
- B. 36h
- C. 24h
- D. 12h 6h

【答案】： C

17、紫外线消毒的有效距离是【单选题】——

- A. 10m

B. 2m

C.

1m

D. 5m 15m

【答案】：B

18、I类、II类区域工作人员卫生手及物体表面的合格标准为【单选题】——

A. 细菌总数 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$,未检出致病菌

B. 细菌总数 $\leq 20\text{cfu}/\text{cm}^2$,未检出致病菌

C. 细菌总数 $\leq 25\text{cfu}/\text{cm}^2$,未检出致病菌

D. 细菌总数 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$,未检出致病菌 细菌总数 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$,未检出致病菌

【答案】：D

19、洗手过程中手触及未消毒物品应【单选题】——

A. 更改浸泡用药液

B. 重新洗手

C. 延长浸泡时间

D. 继续原有洗手步骤 多戴一副手套

【答案】：B

20、临床科室医院感染管理小组的职责下列哪项错误【单选题】——

A. 制定本科室医院感染管理规章制度

B. 监督检查本科室有关医院感染管理的各项工作,对医院感染可疑病例,可能存在感染的环节进行监测,并采取有效防治措施

C. 对医院感染散发病例按要求登记报告,并立即向当地卫生行政机构报告

D. 按要求对疑似或确诊病例留取临床标本,进行细菌学检查和药敏试验 监督检查本科室抗生素使用情况

【答案】：C

21、术前皮肤消毒应由【单选题】——

A. 巡回护士完成

- B. 未洗手的手术医生完成
- C.

手术护士完成

D. 已洗手的手术医生完成 麻醉医生完成

【答案】：D

22、普通病房物体表面细菌菌落总数卫生标准应【单选题】——

A. $\leq 500\text{cfu}/\text{cm}^2$

B. $\leq 200\text{cfu}/\text{cm}^2$

C. $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$

D. $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$ $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$

【答案】：D

23、下列哪项不属于灭菌剂【单选题】——

A. 过氧乙酸

B. 戊二醛

C. 碘伏

D. 环氧乙烷 甲醛

【答案】：C

24、对洗衣房的医院感染管理,下列哪项错误【单选题】——

A. 布局上要求洁、污分区,路线由污到洁,不能逆行

B. 运送车辆应洁、污分开,浸有血液、体液的布类应置于防水袋内封闭运送

C. 洗衣房应有定期清洁消毒制度

D. 各类衣服应分类清洗,感染病人与普通病人的衣物应分开清洗
对血污布类应区分其感染性,必要时按感染性布类处理

【答案】：E

25、医院感染区别于其他感染的不同点错误的是【单选题】——

A. 医院感染的菌株大多为多重耐药性

B. 易感人群抵抗力低,病死率高

C. 在医院内一旦发生医院感染很容易引发群发性感染

D. 在医院感染治疗效果好,一般不会出现死亡 医院感染病原

体来源广泛

【答案】：D

26、有关内镜消毒下列哪项是错误的【单选题】——

- A. 腹腔镜用环氧乙烷消毒
- B. 消化内镜用 500×10^{-6} 有效氯的含氯消毒剂消毒
- C. 直肠镜采用高压灭菌
- D. 内镜活检钳使用过频时,采用 2%戊二醛消毒 45 分钟
苯二甲醛消毒内镜 5 分钟可灭菌

【答案】： B

27、对于医院感染控制指标描述错误的是【单选题】——

- A. 100~500 张病床的医院,一类切口手术部位感染率应低于 0.5%
 - B. 100~500 张病床的医院,医院感染发病率应低于 8%
 - C. 500 张病床以上的医院,医院感染发病率应低于 10%
 - D. 100 张病床以下的医院,一类切口手术部位感染率应低于 2%
- 100 张病床以下的医院,医院感染发病率应低于 7%

【答案】： D

28、三级综合医院的医院感染管理机构每月发布发生率最高的医院感染性疾病是【单选题】——

- A. 泌尿道感染
- B. 表皮传染病
- C. 呼吸道传染病
- D. 外伤感染 肠道传染病

【答案】： C

29、无菌治疗巾打开后,未用完其继续使用的有效时间是【单选题】——

- A. 4h
- B. 12h
- C. 6h
- D. 2h 24h

【答案】： E

30、细菌耐药最常见的机制是【单选题】——

- A. 细菌改变代谢途径
- B. 产生抗生素灭活酶
- C. 抗菌药物作用靶位改变
- D. 细菌细胞膜渗透性改变使抗菌药物不易进入细菌细胞
细菌细胞将抗菌药物排除细菌

【答案】： B

31、层流洁净病房【单选题】——

- A. $\leq 10 \leq 5 \leq 5$
- B. $\leq 200 \leq 5 \leq 5$
- C. $\leq 500 \leq 10 \leq 10$
- D. $= - \leq 15 \leq 15$

【答案】： A

32、使用戊二醛达到灭菌的时间是【单选题】——

- A. 6 小时
- B. 2 小时
- C. 10 小时以上
- D. 8 小时以上 4 小时

【答案】： C

33、根据我国卫生标准回答以下问题：监督、指导医师和医技人员严格执行无菌技术操作规程，合理应用抗感染药，实施对一次性医疗用品的管理等有关医院内感染管理的制度的应是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】： E

34、根据我国下列卫生标准回答:进行医院内感染管理的策略研究,为国家提供咨询意见的是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：A

35、下列哪项不是医院感染的特点【单选题】——

- A. 易感人群抵抗力低,病死率高
- B. 医院中流行的菌株大多为多重耐药性
- C. 医院中病原体来源广泛
- D. 在医院感染中人群的病死率很低 在医院内一旦发生感染很容易播散

【答案】：D

36、目前胃镜消毒首选的消毒剂是【单选题】——

- A. 乙醇
- B. 84 消毒液
- C. 2%戊二醛
- D. 洗必泰 新洁尔灭

【答案】：C

37、高度危险性物品是指【单选题】——

- A. 受到一定量病菌污染才造成危害的物品
- B. 虽有微生物污染,但一般情况下无害的物品
- C. 进入无菌组织或与破损的组织、皮肤粘膜密切接触的物品
- D. 仅和皮肤粘膜相接触,而不进入无菌的组织内的物品 直接地和健康无损的皮肤粘膜密切接触的物品

【答案】：C

38、下列哪种情况属于医院感染:【单选题】——

- A. 皮肤、粘膜的开放性伤口只有细菌定植而无临床症状或体征者

- B. 由损伤而产生的炎症或由非生物因子刺激产生的炎症
- C.

婴儿经胎盘获得的感染,如 CMV、弓形虫病发生在出生后 48 小时以内者

D. 住院中由于治疗措施而激活的感染 由于输注苏打外渗引起的局部炎症

【答案】：D

39、除灭菌速度快、灭菌效果好、经济、环境污染小的压力蒸气灭菌法外,目前最常用的低温灭菌方法是【单选题】——

- A. 环氧乙烷灭菌法
- B. 戊二醛浸泡灭菌法
- C. 辐射灭菌法
- D. 过氧乙酸浸泡灭菌法 微波灭菌法

【答案】：A

40、下列属于医院感染的是【单选题】——

- A. 皮肤粘膜开放性伤口只有细菌定植而无炎症表现
- B. 无明显潜伏期的感染为入院 48h 后发生者属医院感染
- C. 由于物理化学因素刺激而产生的炎症反应
- D. 患者原有的慢性感染在院内急性发作 感染病灶自然扩散

【答案】：B

41、严密隔离的措施不对的是【单选题】——

- A. 隔离病房应经常开窗通风,不同类感染患者可同居一室
- B. 入室人员需戴口罩、穿隔离衣及戴手套。一切物品专用
- C. 接触每个患者及其污染物后,必须洗手
- D. 污染的敷料及用品应装袋贴标签,送消毒处理 接触者尽可能注射疫苗或采取预防措施

【答案】：A

42、交叉感染【单选题】——

- A. 病人在家中已发生的感染

- B. 病原体来源于病人本身的感染
- C.

病人与医生及其他病人通过直接或间接传播引起的感染

D. 在诊疗过程中,由于器械消毒不严或制剂不纯引起的感染 病人入院时已处于另一种传染病的潜伏期,入院后发病,并传给其他病人

【答案】: C

43、医院内尿路感染的常见诱因是【单选题】——

- A. 留置导尿管
- B. 气管切开
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】: A

44、有关医院感染预防与控制的概念,错误的是:【单选题】——

- A. 外源性感染是可以预防的
- B. 洗手是预防医院感染的重要措施
- C. 做好消毒隔离就可杜绝医院感染的发生
- D. 内源性医院感染是难以预防的 滥用抗菌药物可致二重感染

【答案】: C

45、根据我国下列卫生标准回答:对医院发生的医院内感染流行、暴发流行进行调查分析,提出控制措施,并组织实施的是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】: D

46、监督、指导医师和医技人员严格执行无菌技术操作规程、抗感染药物合理应用、一次性医疗用品的管理等有关医院感染管理的制度【单选题】——

- A. 卫生部医院感染管理咨询专家委员会

B. 省医院感染管理专家咨询委员会

C.

各级医院的医院感染管理委员会

D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：E

47、手术室的医院感染管理错误的是【单选题】——

A. 手术器具及物品能压力蒸汽灭菌的应避免使用化学灭菌剂浸泡灭菌

B. 洗手刷应一用一灭菌

C. 隔离手术间应远离手术室入口处

D. 隔离病人手术术后器械及物品双消毒 手术室必须湿式清洁

【答案】：C

48、关于中东呼吸综合征流行病学描述正确的是【单选题】——

A. 完全具备持续的人传人的能力

B. 狨猴为自然储存宿主

C. 以接触传播为主,其次是呼吸道传播

D. 单峰骆驼可能是人类感染来源 非密切接触即可引起人际间传播

【答案】：D

49、医务人员发生艾滋病职业暴露后预防性用药最迟不得超过【单选题】——

A. 72h

B. 48h

C. 24h

D. 12h 4h

【答案】：D

50、关于无菌技术,以下操作错误的是【单选题】——

A. 消毒液应浸没持物镊的 2/3 左右

B. 一份无菌物品仅供一位病人使用

C. 治疗室要湿式清扫,每日紫外线照射 1 次

D. 衣帽要整齐,口罩遮住口鼻,修剪指甲,洗手

无菌物品与非无菌物品应分别放置

【答案】：A

51、发现医院感染流行或暴发流行趋势时,进行流行病学调查的基本步骤的第一步是【单选题】——

- A. 查找感染的
- B. 证实流行或暴发
- C. 查找引起感染的因素
- D. 分析流行或暴发的原因 制定防范措施

【答案】：B

52、碘伏属于【单选题】——

- A. 中效消毒剂
- B. 低效消毒剂
- C. 以上都不是
- D. 高效消毒剂 中低效消毒剂

【答案】：A

53、有关抗生素管理下列哪项错误【单选题】——

- A. 把抗菌药物分成一线、二线药物,二线药物应控制使用
- B. 二线药物毒副作用大、价贵、疗效低
- C. 在同类抗生素中应留有替代性药,在必要时再启用
- D. 无药敏结果参考时,可按经验选药原则用药 定期全院菌株的药敏统计结果公布,为临床用药与药剂科进药提供信息

【答案】：B

54、穿过皮肤或黏膜进入无菌的组织或器官内部的器材【单选题】——

- A. 灭菌剂或物理.化学灭菌方法
- B. 应用灭菌剂或高效消毒剂
- C. 杀灭结核杆菌的消毒剂或中.低效消毒剂
- D. 应用物理灭菌方法 杀灭细菌繁殖体的消毒剂

【答案】：A

55、卫生部对医院感染有关的检查指标中下列哪项是错误的【单选题】——

- A. 医务人员接受医院感染在职教育每年不少于 6 学时
- B. 常规器械消毒合格率应达 100%
- C. 当证实有医院感染爆发时医院应于 48 小时内报告当地卫生部门
- D. 医院抗生素使用率力争小于 50% 一级、二级、三级医院感染率应分别控制在 $\leq 7\%$ 、 $\leq 8\%$ 、 $\leq 10\%$

【答案】： C

56、和破损皮肤、黏膜相接触,而不进入无菌的组织内的器材适用于下列哪种方式消毒【单选题】——

- A. 灭菌剂或物理、化学灭菌方法
- B. 杀灭细菌繁殖体的消毒剂
- C. 应用灭菌剂或高效消毒剂
- D. 杀灭结核杆菌的消毒剂或中、低效消毒剂 应用物理灭菌方法

【答案】： C

57、新紫外线灯管输出功率不低于【单选题】——

- A. 60uw/cm²
- B. 100uw/cm²
- C. 80uw/cm²
- D. 90uw/cm² 110uw/cm²

【答案】： D

58、下述各项中错误的是【单选题】——

- A. 小儿呼吸道感染不需要隔离
- B. 医院污物应分类收集、分别处理,以防止污染扩散
- C. 大面积烧伤或多重耐药菌感染应进行接触隔离
- D. 洗手是预防医院感染的重要措施

传染病区应严格划分清洁区、半污染区、污染区

【答案】：A

59、医院污物的处理原则错误的是【单选题】——

- A. 防止污染扩散
- B. 分类收集
- C. 分别处理
- D. 少量医疗垃圾可与生活垃圾一同处理 尽可能采用焚烧处理

【答案】：D

60、关于洗手指征错误的是【单选题】——

- A. 脱手套后不需洗手
- B. 接触血液、体液和被污染的物品前后
- C. 接触患者前后
- D. 戴口罩和穿脱隔离衣前后 进行无菌技术操作前后

【答案】：A

61、护士上午铺好无菌盘后,因临时有事离开2个小时后需使用该无菌盘,其应采取【单选题】——

- A. 将原来铺好的重新消毒
- B. 另取一个未经消毒的
- C. 使用昨天使用过的
- D. 使用原来铺好的 使用未使用但经消毒的

【答案】：D

62、输血科预防医院感染的措施错误的是:【单选题】——

- A. 每月对储血冰箱的内壁进行生物学监测,不得检出致病性微生物和霉菌
- B. 保持环境清洁,每天清洁桌面
- C. 血浆置换术应在II类环境中进行并注意消毒隔离
- D. 工作人员上岗前应注射乙型肝炎疫苗,并定期检查抗体水平
被血液污染的台面可用新洁尔灭消毒处理

【答案】：E

63、无菌盘铺好后有效期不超过多长时间【单选题】——

- A. 2h
- B. 12h
- C. 16h
- D. 4h 8h

【答案】：D

64、自身感染【单选题】——

- A. 病人入院时已处于另一种传染病的潜伏期,入院后发病,并传给其他病人
- B. 病原体来源于病人本身的感染
- C. 在诊疗过程中,由于器械消毒不严或制剂不纯引起的感染
- D. 病人与医生及其他病人通过直接或间接传播引起的感染
病人在家中已发生的感染

【答案】：B

65、妊娠妇女不宜用的抗菌药物是【单选题】——

- A. 青霉素
- B. 磷霉素
- C. 林可霉素
- D. 四环素 头孢菌素

【答案】：D

66、属于高效消毒剂的是【单选题】——

- A. 醋酸氯己定
- B. 新洁尔灭
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】：D

67、I、II级手术室空气采样的时间【单选题】——

- A. 手术开始前30分钟
- B.

彻底清扫后 30 分钟

C. 手术结束后 30 分钟

D. 采样前提前开启空气消毒机 30 分钟后 手术开始前 1 小时

【答案】：D

68、病室内住有百日咳病人,已知病室长 6m、宽 3.2m、高 3m,用纯乳酸进行空气消毒,乳酸的用量是【单选题】——

A. 7ml

B. 6ml

C. 12ml

D. 15ml 5ml

【答案】：A

69、铺无菌盘时,使用无菌持物钳的操作如下,其中正确的是【单选题】——

A. 夹取物品时钳端触及罐口边缘

B. 使用中钳端始终朝下,无反转动作

C. 用无菌持物钳夹取消毒油纱布

D. 到远处夹取物品后立即返回放回浸泡容器内 从浸泡容器中取放时先将钳前端打开

【答案】：B

70、经血液、体液传播病原体不包括【单选题】——

A. 麻疹病毒

B. 乙型肝炎病毒

C. 人类免疫缺陷病毒

D. 疟原虫 丙型肝炎病毒

【答案】：A

71、手术部位感染的常见诱因是【单选题】——

A. 留置导尿管

B. 气管切开

C.

两者均是

D. 两者均否

【答案】：D

72、医院内下呼吸道感染的常见诱因是【单选题】——

A. 留置导尿管

B. 气管切开

C. 两者均是

D. 两者均否

【答案】：B

73、进行医院感染管理的策略研究,为卫生部提供咨询意见【单选题】——

A. 卫生部医院感染管理咨询专家委员会

B. 省医院感染管理专家咨询委员会

C. 各级医院的医院感染管理委员会

D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：A

74、普通手术室医护人员手表面细菌菌落总数卫生标准应【单选题】——

A. $\leq 5\text{cfu/cm}^2$

B. $\leq 10\text{cfu/cm}^2$

C. $\leq 15\text{cfu/cm}^2$

D. $\leq 200\text{cfu/cm}^2$ $\leq 500\text{cfu/cm}^2$

【答案】：A

75、病房的医院内感染管理措施中错误的是【单选题】——

A. 感染病人与非感染病人分开

B. 同类感染病人相对集中

C. 特殊感染病人单独安置

D. 室内应定时通风换气,必要时进行空气消毒 地面应常规使

用含氯消毒剂消毒

【答案】：E

76、下列情况不是医院感染【单选题】——

- A. 病人发生的感染是上次住院期间获得的
- B. 有明确潜伏期的感染,自入院时计算起。超过其常见潜伏期而发生的感染
- C. 在原有医院感染的基础上又出现其他部位新的感染(除外脓毒症的迁徙病灶)
- D. 没有明确潜伏期的感染,发生在入院 48 小时以后者 新生儿经胎盘获得的感染

【答案】： E

77、重症监护病房【单选题】——

- A. $\leq 10 \leq 5 \leq 5$
- B. $\leq 200 \leq 5 \leq 5$
- C. $\leq 500 \leq 10 \leq 10$
- D. $=- \leq 15 \leq 15$

【答案】： B

78、洗手的指征中哪一项不合理【单选题】——

- A. 新生儿室入室常规规定应彻底洗手
- B. 接触污物前、后应洗手
- C. 侵入性操作前、后应洗手
- D. 接触病人后应洗手 脱手套后需洗手

【答案】： B

79、对一次性卫生用品、消毒药械的购置查检许可证,对其抽检进行细菌学检查【单选题】——

- A. 卫生部医政司医院感染管理委员会
- B. 省市卫生行政部门医院感染管理委员会
- C. 医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室以下各项工作是哪个部门的职责

【答案】： D

80、使用无菌包的正确方法是【单选题】——

- A. 打开无菌包时,必须保护包内面的无菌面
- B. 从无菌包内取出的物品若未使用,应立即放回包内
- C. 无菌包潮湿时,应待干燥后再用
- D. 打开无菌包时,应用手指捏住包布四角的内面展开 无菌包打开后无须注明开包日期和时间

【答案】：A

81、损伤性废物【单选题】——

- A. 使用过的注射针头
- B. 带血的敷料
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】：A

82、抗菌药物应用中,下列哪项属错误【单选题】——

- A. 病毒感染不用抗菌药物
- B. 疑为细菌感染,应先送培养标本而后经验性选药
- C. 培养结果出来,根据其药敏结果调整药物
- D. 当应用抗菌药物 24 小时未见效立即改选其他药物 一般感染抗菌药物用至症状体征消失后 3~4 天

【答案】：D

83、若需提高煮沸温度,可在水中加入【单选题】——

- A. 碳酸氢钠
- B. 高锰酸钾
- C. 乙醇
- D. 亚硝酸钠 氯化钠

【答案】：A

84、下列关于自身感染的描述正确的是【单选题】——

- A. 病人与医生及其他病人通过直接或间接传播引起的感染
- B.

病人在家中已发生的感染

C. 病人入院时已处于另一种传染病的潜伏期,入院后发病,并传给其他病人

D. 在诊疗过程中,由于器械消毒不严或制剂不纯引起的感染 病原体来源于病人本身的感染

【答案】： E

85、以 15%过氧乙酸原液配制 0.3%过氧乙酸 100mL,下列方法中正确的是【单选题】——

A. 原液稀释 200 倍

B. 原液 30mL 加水 70mL

C. 原液 20mL 加水 80mL

D. 原液 15mL 加水 85mL 原液 2mL 加水 98mL

【答案】： E

86、对病室进行紫外线消毒,下列做法错误的是【单选题】——

A. 紫外线穿透性差,被消毒的物品不可有任何遮蔽

B. 灯管使用期限不能超过 2000 小时

C. 紫外线灯管要保持清洁透亮

D. 为检查紫外线杀菌效果,定期进行空气细菌培养 照射前,先做好病室的清洁工作

【答案】： B

87、低效消毒剂是【单选题】——

A. 醋酸氯己定

B. 新洁尔灭

C. 两者均是

D. 两者均否

【答案】： C

88、医院内最多见的多重耐药菌株是【单选题】——

A. 耐甲氧西林/苯唑西林的金黄葡萄球菌(MRSA)

B. 耐万古霉素肠球菌 (VRE)

C.

耐万古霉素金黄葡萄球菌(VRSA)

- D. 产超广谱酶大肠埃希菌 耐青霉素的肺炎链球菌

【答案】：A

89、手术区皮肤消毒的正确方法是【单选题】——

- A. 消毒范围超过手术切口 15cm
B. 会阴部用碘酊消毒
C. 消毒范围与备皮范围一致
D. 用 2.5~3%的碘酊消毒 3 遍 用 95%乙醇脱碘

【答案】：A

90、以下概念正确的是【单选题】——

- A. 地面应湿式清扫,保持清洁,局部有血迹等污染时局部用消毒剂处理
B. 地面应经常用含氯消毒剂拖洗,既能消毒,又能增白
C. 检验科的地面每天均需用消毒剂拖洗
D. 拖洗工具使用后先洗净,再消毒,然后晾干 因为 2%戊二醛是高水平消毒剂,有条件时最好用戊二醛拖地,消毒效果好

【答案】：A

91、一般病室、办公室、治疗室、换药室、走廊等使用的拖把【单选题】——

- A. 拖把应有明显的标记,严格分区使用
B. 拖把用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min 后,再洗干净,晾干备用
C. 应先消毒,用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min,再用水洗干净,然后用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min,悬挂晾干备用
D. 先用 1000mg/L 有效氯消毒剂适量倒在污染地面 30min 后,用拖把拖干净 每次使用后清水冲洗,悬挂晾干备用

【答案】：E

92、关于各种危险性物品的处理方法不正确的是【单选题】——

- A. 凡是高度危险的物品,必须选用灭菌法

B. 凡中度危险性物品,一般情况下达到消毒即可

C.

中度危险性物品的消毒要求并不相同,部分内窥镜必须达到高效消毒
D. 凡低度危险性物品,一般可用低效消毒方法 而对便器、卫生洁具等物品则只作一般的清洁处理即可

【答案】：E

93、发生医院感染时,停止收容新病人的时间是【单选题】——

- A. 该病最长潜伏期过去
- B. 该病平均潜伏期过去
- C. 该病常见潜伏期过去
- D. 该病最短潜伏期过去 观察一段时间没有新病人发生

【答案】：A

94、下列细菌是目前医院内感染常见的细菌,但除外【单选题】——

- A. 葡萄球菌特别是金黄色葡萄球菌和凝固酶阴性葡萄球菌
- B. 大肠埃希菌
- C. 沙门菌属
- D. 铜绿假单胞菌 肺炎杆菌

【答案】：C

95、压力蒸汽灭菌时器械包的重量【单选题】——

- A. 8kg
- B. 7kg
- C. 5kg
- D. 6kg 10kg

【答案】：B

96、脱隔离衣的正确步骤是【单选题】——

- A. 解腰带.刷手.解领扣.解袖扣.脱去隔离衣
- B. 松腰带.解袖扣.刷手.解领扣.系腰带.脱去隔离衣
- C. 松腰带.系腰带.解袖扣.刷手.解领扣.脱去隔离衣
- D. 解袖扣.刷手.解领扣.解腰带.脱去隔离衣 刷手.解腰带.解袖扣.解领扣.脱去隔离衣

【答案】：C

97、目前国内医院感染最常发生的部位是【单选题】——

- A. 泌尿道
- B. 外科切口
- C. 血液
- D. 下呼吸道 胃肠道

【答案】：D

98、下列哪种情况属于医院感染【单选题】——

- A. 烧伤创面培养出金黄色葡萄球菌
- B. 经产道感染的乙型肝炎
- C. 红霉素静脉滴注后发生静脉炎;拔出的导管在血平皿上滚动培养,细菌菌落数8个
- D. 羊肠线吸收不佳的炎症反应 入院后5天发生的甲型肝炎

【答案】：B

99、患者女性,45岁。III度烧伤后行植皮术,大腿内侧供皮区消毒不可使用【单选题】——

- A. 3%碘酊
- B. 1:1000 苯扎溴铵酊
- C. 0.5%PVP 碘
- D. 1:1000 氯己定酊 70%乙醇

【答案】：A

100、取无菌溶液时,下列哪项是错误的【单选题】——

- A. 倒溶液时可不顾及瓶签的朝向
- B. 用前核对瓶签
- C. 保持瓶盖内侧面无菌
- D. 用后立即盖上 检查药液是否有沉淀

【答案】：A

101、有关医院感染预防与控制的概念错误的是【单选题】——

- A.

洗手是预防医院感染的重要措施

- B. 滥用抗感染药物可致二重感染
- C. 部分医院感染是可以预防的
- D. 内源性医院感染是医院感染的重要原因 医院感染一定是由于消毒隔离缺陷所致

【答案】： E

102、下述监测不合格的有【单选题】——

- A. 层流洁净手术室空气细菌数 $\leq 10\text{cfu}/\text{m}^3$
- B. 重症监护室医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$
- C. 供应室无菌区物体表面细菌数 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$
- D. 一次性注射器和输液器细菌培养阴性, 噬菌体试验阳性 传染病病房物体表面 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$

【答案】： D

103、一次性使用的注射器使用后正确的做法是【单选题】——

- A. 直接放入耐刺、防渗漏的利器盒
- B. 使用后的一次性针头应重新套上针头套
- C. 使用后用手直接分离针头
- D. 使用后先浸泡再用手直接分离针头 使用后的针头连同注射器丢入医用垃圾桶内处理

【答案】： A

104、下列监测的控制指标中,哪项是错误的【单选题】——

- A. 凡经消毒的物品不能检出任何微生物
- B. 手术室医务人员手上带菌数应少于 5 个/ cm^2
- C. 新生儿室、儿科病室的物体表面不得检出沙门菌
- D. 手术室、产房、新生儿室空气中含菌量应少于 200 个/ m^3 紫外线消毒灯管在使用中的功率应大于 $70\ \mu\text{W}/\text{cm}^2$

【答案】： A

105、铺无菌台无菌包布下垂长度为【单选题】——

A. 10cm 以上

B.

30cm 以上

C. 50cm 以上

D. 20cm 以上 40cm 以上

【答案】： B

106、发生医院内尿路感染最常见的诱因是【单选题】——

A. 长期卧床

B. 留置导尿管

C. 膀胱冲洗

D. 膀胱内注药 膀胱镜检查

【答案】： B

107、肝炎肠道门诊的管理中下列哪项错误【单选题】——

A. 诊室、人员、器械、用具固定

B. 挂号、候诊与普通门诊分开

C. 肝炎按黄疸和无黄疸进行隔离

D. 取药、注射、采血、化验与普通病人分开 接触病人后洗手

【答案】： C

108、关于医院内感染知识培训,错误的叙述是【单选题】——

A. 培训内容包括管理知识和专业知识

B. 培训对象包括管理、医务、工勤人员

C. 非专职人员每年不少于 2 小时培训

D. 进修医师必须培训 实习医师必须培训

【答案】： C

109、II 类区域空气消毒合格的标准是【单选题】——

A. 细菌总数 ≤ 300 cfu/m³, 未检出致病菌

B. 细菌总数 ≤ 400 cfu/m³, 未检出致病菌

C. 细菌总数 ≤ 200 cfu/m³, 未检出致病菌

D. 细菌总数 ≤ 10 cfu/m³, 未检出致病菌 细菌总数

$\leq 500\text{cfu}/\text{m}^3$, 未检出致病菌

【答案】： C

110、根据我国卫生标准回答:进入组织、器官或接触破损皮肤、黏膜的医疗用品【单选题】——

- A. 必须无菌
- B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{Cfu/g}$ 或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
- C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$ 或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
- D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出 细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出

【答案】: A

111、属于低水平消毒剂的是【单选题】——

- A. 戊二醛
- B. 过氧乙酸
- C. 碘伏
- D. 氯己定 异丙醇

【答案】: D

112、下述不属于灭菌剂是【单选题】——

- A. 20%戊二醛
- B. 过氧乙酸
- C. 环氧乙烷
- D. 甲醛 含氯消毒剂

【答案】: E

113、经血液、体液传播的病原体不包括【单选题】——

- A. 乙型肝炎病毒
- B. 丙型肝炎病毒
- C. 人类免疫缺陷病毒
- D. 麻疹病毒 疟原虫

【答案】: D

114、关于洗手指征,下述哪项是错误的【单选题】——

- A. 接触病人前后
- B. 进行无菌技术操作前后
- C. 戴口罩和穿、脱隔离衣前后
- D. 接触血液、体液和被污染的物品前后 脱手套后无须洗手

【答案】：E

115、关于锐器伤后的预防措施,错误的是【单选题】——

- A. 如不慎发生锐器伤,应立即采取相应的保护措施,清创、对创面进行严格消毒处理
- B. 对发生锐器伤者进行血源性疾病的检查和随访
- C. 被 HBV 阳性病人血液、体液污染锐器刺伤,应在 1 周内注射乙型肝炎高效价免疫球蛋白
- D. 被 HBV 阳性病人血液、体液污染的锐器刺伤,应及时进行血液乙肝标志物检查 被 HBV 阳性病人血液体液、污染锐器刺伤,血液乙肝标志物阴性者按规定接种乙肝疫苗

【答案】：C

116、关于无菌器械保存液和消毒剂的描述,下列哪项是正确的【单选题】——

- A. 无菌器械保存液应该是无菌的,最多允许检出少量微球菌
- B. 使用中消毒剂细菌总数应 ≤ 200 cfu/mL,致病性微生物不得检出
- C. 无菌器械保存液细菌总数应 ≤ 5 cfu/mL,致病性微生物不得检出
- D. 使用中消毒剂细菌总数应 ≤ 10 cfu/mL,允许检出金黄色葡萄球菌 使用中消毒剂细菌总数应 ≤ 100 cfu/mL,致病性微生物不得检出

【答案】：E

117、后勤人员在治疗室要安置新的紫外线灯做空气消毒,护理人员指导安装其灯管离地面的距离为【单选题】——

- A. < 4 m
- B. < 2 m
- C.

<2.5m

D. <3m <3.5m

【答案】：B

118、取无菌纱布的正确方法是【单选题】——

A. 戴手套拿取纱布

B. 以上都不是

C. 用灭菌换药镊子夹取纱布

D. 用无菌持物钳夹取纱布 用消毒的手指拿取纱布

【答案】：D

119、需要采取严密隔离的疾病是【单选题】——

A. 乙型肝炎

B. 艾滋病

C. 鼠咬热

D. 肺鼠疫

【答案】：D

120、保管无菌物品哪项是错误的【单选题】——

A. 无菌物品应放在清洁干燥、固定的地方

B. 取出的无菌物品不得放回无菌容器内

C. 无菌包必须注明灭菌日期

D. 无菌物与非无菌物应分别放置 已启用的无菌包,48h后必须重新灭菌

【答案】：E

121、对患者或怀疑患者传染病的产妇用过的一次性用品及胎盘必须【单选题】——

A. 放入黄色塑料袋内,密闭运送,无害化处理

B. 放入红色塑料袋内,密封后丢弃

C. 放入黑色塑料袋内,按垃圾处理

D. 放入黑色塑料袋内,密闭运送,无害化处理 放入白色塑料

袋内,标记处理

【答案】：A

122、属于高度危险性物品的是【单选题】——

- A. 手术器械和用品
- B. 体温表
- C. 呼吸机管道
- D. 胃肠道内窥镜和气管镜 麻醉机管道

【答案】：A

123、医院感染控制措施中血管内装置感染,已证实有效的措施错误的是【单选题】——

- A. 所有导管均应为密闭系统并限制插管的持续时间
- B. 局部皮肤准备,插管时的无菌技术,疑有感染应立即拔除导管
- C. 中心血管导管插管时外科灭菌
- D. 限制敷料更换的频率,短期使用抗生素包裹的导管,限制插管时间 抗微生物药膏用于皮肤准备

【答案】：E

124、医院必须对消毒、灭菌效果定期进行监测,灭菌合格率必须达到【单选题】——

- A. 0.8
- B. 1
- C. 0.85
- D. 0.95 0.9

【答案】：B

125、目前引起下呼吸道医院感染最主要的病原体是【单选题】——

- A. 铜绿假单胞菌
- B. 链球菌
- C. 表皮葡萄球菌
- D. 卡他球菌 金黄色葡萄球菌

【答案】：A

126、对医院发生的医院感染流行、暴发流行进行调查分析,提出控制措施,并组织实施【单选题】——

- A. 卫生部医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】： D

127、调查医院感染的最佳方法【单选题】——

- A. 从医院微生物室获得病例来源
- B. 临床医师填报病例
- C. 专职护士到病室前瞻性发现病例
- D. 病室监控护士报告病例 专职护士到病案室从出院病历中
找查病例

【答案】： C

128、传染病门诊【单选题】——

- A. $\leq 10 \leq 5 \leq 5$
- B. $\leq 200 \leq 5 \leq 5$
- C. $\leq 500 \leq 10 \leq 10$
- D. $=- \leq 15 \leq 15$

【答案】： D

129、为预防医院感染的发生,新生儿病房床位之间的间距不少于【单选题】——

- A. 100cm
- B. 90cm
- C. 80cm
- D. 70cm 60cm

【答案】： B

130、关于血液净化室的医院内感染管理,下列哪项不正确【单选题】

——

- A. 应对病人常规进行血液净化前肝功能、肝炎病原体等检查
- B.

工作人员定期体格检查,加强个人防护

- C. 透析器、管路应一次性使用
- D. 传染病病人在隔离净化室进行血液净化,专机透析 急诊病人不需固定透析机

【答案】： E

131、下述哪项不属于微生物【单选题】——

- A. 病毒
- B. 支原体
- C. 细菌
- D. 衣原体 钩虫

【答案】： E

132、下列概念中不正确的是【单选题】——

- A. 医院感染发病率是指一定时间内住院病人中发生医院感染新发病例的频率
- B. 医院感染暴发是指在某医院、某科室的住院病人中,短时间内、突然发生 3 例以上同源感染病例的现象
- C. 医院感染流行是指某医院、某科室医院感染发病率显著超过历年散发发病率水平
- D. 医院感染散发是指医院感染在某医院、或某地区住院病人中历年的一般发病率水平 医院感染的流行趋势是指医院、某科室的医院感染持续流行,长时间不能控制

【答案】： E

133、可用于浸泡金属器械的高效类消毒剂是【单选题】——

- A. 环氧乙烷
- B. 70%乙醇溶液
- C. 0.2%过氧乙酸溶液
- D. 2%戊二醛溶液 0.5%碘伏

【答案】： D

134、伤寒病人应采取【单选题】——

A.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/978006031135006066>