

主动脉夹层诊疗与护理考核试题

一、案例题

一般资料:患者,男,49岁。发病5小时后急诊以"主动脉夹层"平车入院。入院护理查体:体温 36.8°C ,脉搏78次/分,血压180/90mmHg。NRS疼痛评分6分。四肢活动自如,双上肢皮温正常,足背动脉均可触及,吸尾部皮肤完整。患者高血压病史20年,自服药物控制不佳,血压最高时达200/100mmHg,曾吸烟20年,10支/天,已戒10年,无嗜酒史。入院后立即给予生理盐水10ml+盐酸乌拉地尔200mg以5ml/h,生理盐水30ml+尼卡地平20mg以5ml/h微量泵持续静脉泵入,并给予哌替啶(度冷丁)50mg肌肉注射,一段时间后疼痛评分为2分,诉疼痛缓解。

1. 主动脉夹层典型症状为() [单选题] *

- A.突发胸部撕裂样疼痛,伴全身冷汗,但血压常升高。
- B.胸部和背部持续烧灼样疼痛
- C.活动后胸骨后或左胸部剧烈疼痛,休息后缓解
- D.胸骨后剧烈压榨样疼痛,舌下含服硝酸甘油不能缓解

2. 主动脉夹层的病因不包括() [单选题] *

- A.妊娠
- B.高血压
- C.糖尿病 **V**
- D.马方综合征(Marfan syndrome)

3. 主动脉夹层亚急性期是在（） [单选题] *

A.1 周-1 月以内

A 遗传性疾病

B 高血压

C 先天性血管畸形

D 乏力 **V**

7. 下列属于主动脉夹层的临床症状是？（） [单选题] *

A 头晕、乏力

B 脑供血不足、昏迷，

C 呼吸困难

D 烦躁不安

8. 下述哪项不是主动脉夹层的体征（） [单选题] *

A 夹层破裂入心包腔可引起心包填塞，可有心包摩，

擦音

9 胸骨左缘第 2、3 肋间突然闻及连续性血管杂音

C 夹层破裂入胸膜腔内引起胸腔积液

D 脉搏减弱消失

10 主动脉夹层破裂好发于（） [单选题] *

A 小儿

B 局血压患者 **V**

C 青少年

D 老年人

11. 男性，64 岁，突发胸部剧痛 2 小时，并向背部放射，有高血压史 10 年，含服硝酸甘油 3 片不能缓

A 急性胆囊炎

B 急性心肌梗死

C 急性胰腺炎

D 主动脉夹层 **V**

12 . 主动脉夹层 Stanford 分型 A 型指的是 () [单选题] *

A. 夹层累及升主动脉及降主动脉

13 夹层累及升主动脉。

C. 夹层仅累及胸降主动脉及其远端

D. 夹层累及至腹降主动脉

12.AD 通常根据发病时间进行分期, 传统分期方法分为急性期和慢性期。发病时间 () 为急性期。 [单选题] *

A.<7 天

B. < 14 天

C. 14 天 **V**

D. > 14 天

13. 主动脉夹层累及近端升主动脉时的临床表现是 () [单选题] *

A. 颈、咽及下颌部疼痛

B. 前胸痛。

C. 肩胛区疼痛

D. 后背、腹部及下肢疼痛

14. () 是 AD 患者最普遍的主诉 [单选题] *

A. 疼痛。

B 胸闷

C 心悸

D. 气促三. 多选题

1. 主动脉夹层常见诱发因素有（） [多选题] *

A. 高血压与高龄 V

B. 动脉粥样硬化

C. 遗传性血管病变

D. 主动脉炎性疾病

2. Debakey 分型 I 型原发破口位于升主动脉或主动脉弓，夹层累及大部或全部包括（） [多选题] *

A. 胸升主动脉，

B. 主动脉弓。

C. 胸降主动脉 V

D. 腹主动脉，

3. 主动脉夹层的心脏并发症有（） [多选题] *

A. 扩张、主动脉瓣关闭不全 V

8. 心源性休克 V

C. 急性心肌梗死 V

D. 恶性心律失常 V

4. 主动脉夹层的诊断要点包括（） [多选题] *

A. 高血压患者突发胸背及上腹部撕裂样疼痛，镇痛剂不能缓解 V

B.疼痛伴休克样症候，而血压反而升高或正常或稍降低 V

C.短期内出现主动脉瓣关闭不全和（或）二尖瓣关闭不全的体征，可伴有心力衰竭 V

D.突发急腹症、神经系统障碍、急性肾衰竭或急性心包填塞 V 四. 判断题

1 . 主动脉夹层及护理是由主动脉管壁内膜出现破口，血液由此进入动脉壁中层，形成夹层血肿，并逐渐延伸剥离主动脉的内膜和中膜引起的（） [单选题] *

A.对 V

B 错

2 . 血液从内膜破口进入中膜导致主动脉壁间分离，从而分为真假两个腔，有内膜的真正内腔为真腔，在中膜内形成的壁间腔为假腔（） [单选题] *

AM

B 错测验

1、 主动脉夹层病因 [多选题] *

A.高血压 V

B.遗传性结缔组织紊乱和马凡综合征 V

C.主动脉狭窄与主动脉缩窄 V

D. 医源性损伤与夹层分离，

E. 妊娠 V

2、 主动脉夹层药物治疗的临床目标 [多选题] *

A.患者无胸闷痛等临床表现。

B.血压不超过 120/70mmHgV

C.心率不超过 70bpmV

3、主动脉夹层临床表现 [多选题] *

A.疼痛 V

B.出血症状 V

C.缺血症状 V

D.压迫症状,

E.心功能不全症状 V

4、主动脉夹层药物治疗指征 [多选题] *

A.无并发症的 DeBakey DI 型 ADV

B.稳定的孤立的主动脉弓夹层 V

C.稳定的慢性夹层,

D.病情已不可能实施手术 V

5、近端夹层分离首选什么治疗? [单选题] *

A.手术 V

B.药物。

3 .2周-2月以内,

C.3周-3月以内

D.6周-6月以内

4. 主动脉夹层动脉病患者测量血压应 () [单选题] *

A.测四肢血压, 以较高一侧为准 V

B.测双上肢血压, 以较高一侧为准

C.测双下肢血压, 以较低一侧为准

D.测四肢血压, 以较低一侧为准

5. 主动脉夹层在急性期用药主要目的是 () [单选题] *

A.镇静止痛

B.控制血压 V

C.降低心率

D.以上均是

6. 疼痛评估的时机不包括 () [单选题] *

A.入院时

B.睡前 V

C.发生爆发痛后

D.用药干预后

7 .疼痛评估的内容 () [单选题] *

A.疼痛的部位及范围

8 .疼痛的强度

C.疼痛对患者的影响

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/978023022061006035>