

2024 年南充市嘉陵区人民医院医护人员招聘备考试题及答案解析

毕业院校：_____ 姓名：_____ 考场：_____ 考号：_____

一、选择题

1. 女，60岁，患咳嗽咳痰已8~9年。查体：可平卧，桶状胸，两肺少量湿啰音，剑突下可见收缩期搏动，三尖瓣区可听到收缩期杂音，肝脾不大，下肢无水肿。其诊断可能为()。

- A、慢性支气管炎+肺心病右心衰竭
- B、慢性支气管炎+肺气肿
- C、慢性支气管炎
- D、慢性支气管炎+肺气肿+肺心病代偿期

答案：D

解析：本患者咳嗽咳痰已8~9年，两肺有少量湿啰音，慢性支气管炎可以确定。患者查体有桶状胸，考虑已存在肺气肿。剑突下可见收缩期搏动，三尖瓣区可听到收缩期杂音，提示为右心室扩大的临床征象。慢性支气管炎肺气肿患者出现右心室扩大，应考虑已合并肺心病。但患者可平卧、肝脾不大、下肢无水肿，表明目前无右心功能衰竭，心功能属代偿期。

2. 女，32岁，平素体健，突然发热，咳嗽，咳痰，X线胸片示左下肺炎，痰细菌培养为肺炎球菌。以下哪一种并发症最不可能发生()。

- A、DIC
- B、胸膜炎
- C、感染性休克
- D、肺脓肿

答案：D

解析：肺炎链球菌肺炎的并发症近年来已少见，严重的败血症或毒血症易发生感染性休克，尤其老年人，其他并发症有胸膜炎、脓胸、心包炎、脑膜炎甚至DIC。

3. 关于肺心病的描述，下列哪项不正确()。

- A、肺动脉高压早期，右心功能尚能代偿
- B、慢性肺心病多中年以后发病
- C、肺心病的并发症中死亡率最高的是肺性脑病
- D、血容量增多及血黏度升高是引起肺动脉高压的主要因素

答案：D

解析：缺氧是引起肺动脉高压的主要因素。

4. 患者，男性，35岁。20天前因地震砸伤致右股骨干骨折，经内固定手术治疗，2小时前突然出现呼吸困难，胸痛伴咯血。查体：BP120/70mmHg，颈静脉无怒张，肝颈征阴性，A2>P2。CTPA：肺栓塞。UCG及血流动力学监测示：右室运动功能正常。最适当的治疗是()。

- A、溶栓治疗
- B、抗凝治疗
- C、糖皮质激素
- D、抗生素和支气管舒张药

答案：B

解析：根据病史该患者诊断为肺栓塞。肺栓塞的次大面积栓塞，在患者无右心功能不全表现时，不主张溶栓治疗，可考虑抗凝治疗。故选B。

5. 对粪便中分离的沙门菌进行药敏试验不应该做()。

- A、喹诺酮类和青霉素类药物
- B、氨基糖苷类和喹诺酮类药物
- C、氨基糖苷类和青霉素类药物
- D、第1、2代头孢菌素和氨基糖苷类药物

答案：D

解析：对粪便中分离的沙门菌进行药敏试验不应该做第1、2代头孢菌素和氨基糖苷类药物。

6. 对于平衡功能评定哪一项是不正确的?()

A、受试者不能安全独立完成要求动作时，要注意予以保护以免摔倒;必要时给予帮助

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/978042106032006067>