

2022年江苏省成考（专升本）大学医学综合预测试卷

一、单选题

1、不属于预防性应用抗菌药物适应证的选项是（）

- (A)人造物置留手术
- (B)甲状腺腺瘤手术后
- (C)结肠手术前准备
- (D)开放性骨折
- (E)大面积烧伤

2、位于额中回后部的中枢是【】

- (A) 视区
- (B) 书写中枢
- (C) 听区
- (D) 运动性语言中枢
- (E) 感觉性语言中枢

3、判断心脏按压是否有效的方法是()

- (A)触摸面动脉搏动
- (B)触摸颈动脉搏动
- (C)触摸桡动脉搏动
- (D)触摸足背动脉搏动

4、下列属于肠系膜下动脉分支的是【】

- (A) 回结肠动脉
- (B) 右结肠动脉
- (C) 左结肠动脉

(D) 中结肠动脉

(E) 空肠动脉

5、发生突触后抑制时可见到的现象是()

(A)突触前膜递质释放减少

(B)突触后膜递质水解酶失活

(C)突触后膜受体数量减少

(D)突触后膜超极化

6、维持机体稳态的生理意义是（）

(A)保证细胞的各种酶促生化反应

(B)抑制条件反射和非条件反射

(C)保证可兴奋细胞正常的兴奋性

(D)使正反馈效应不断加强

(E)是机体自由和独立生存的首要条件

7、女，30岁。寒战、发热4天。查体：右侧肋脊点、肋腰点压痛阳性。首选的辅助检查是（）

(A)肾功能

(B)腹部B超

(C)粪便常规

(D)尿常规

(E)结肠镜

8、与肺尖相对应的壁胸膜是【】

(A) 肋胸膜

(B) 膈胸膜

- (C) 胸膜顶
- (D) 纵隔胸膜
- (E) 肋膈隐窝

9、休克早期，中心静脉压和血压低的原因是【】

- (A) 动静脉短路大量开放
- (B) 心力衰竭
- (C) 血容量不足
- (D) 血容量相对过多
- (E) 容量血管过度收缩

10、男，48岁。近期健康体检报告示：血 BUN6.0mmol/L，总胆红素 12.7 μ mol/L，AST71U/L，空腹血糖 6.0mmol/L，总胆固醇 7.5mmol/L。临床的诊断是（）

- (A) 肾功能不全伴黄疸
- (B) 肝功能异常伴血脂异常
- (C) 肝功能衰竭伴黄疸
- (D) 糖尿病伴肾功能不全
- (E) 糖尿病伴血脂异常

11、纯净胃液的 pH 为（）

- (A) 3.9~4.5
- (B) 4.9~5.5
- (C) 0.9~1.5
- (D) 2.9~3.5
- (E) 1.9~2.5

12、支配小腿后群肌的神经是【】

- (A) 胫神经
- (B) 股神经
- (C) 腓浅神经
- (D) 闭孔神经
- (E) 腓深神经

13、大脑优势半球的额下回后部代表的中枢是 ()

- (A) 书写中枢
- (B) 听中枢
- (C) 感觉性语言中枢
- (D) 视觉性语言中枢
- (E) 运动性语言中枢

14、具有上行唤醒作用的神经结构被称为 ()

- (A) 特殊感觉传入纤维
- (B) 本体感觉传入通路
- (C) 内脏感觉传入神经
- (D) 感觉的非特异性投射系统

15、下列属于躯干骨的是 【】

- (A) 锁骨
- (B) 胸骨
- (C) 肩胛骨
- (D) 舌骨
- (E) 髌骨

16、正常时肾小球不能滤过的物质是 ()

- (A) 尿素
- (B) 氨基酸
- (C) 大分子蛋白质
- (D) 葡萄糖
- (E) 电解质

17、出现血容量不足的症状时，提示在短时期内体液丧失至少达体重的百分数是【】

- (A) 5%
- (B) 3%
- (C) 10%
- (D) 15%
- (E) 20%

18、具有横突肋凹的椎骨是（）

- (A) 骶骨
- (B) 尾骨
- (C) 胸椎
- (D) 颈椎
- (E) 腰椎

19、手术中识别输卵管的标志是（）

- (A) 输卵管漏斗
- (B) 输卵管峡
- (C) 输卵管伞
- (D) 输卵管壶腹
- (E) 输卵管腹腔口

20、第 2~4 手指不能内收与外展，可能损伤的神经是（）

(A)肌皮神经

(B)正中神经

(C)尺神经

(D)桡神经

(E)腋神经

21、肺门的所在部位是（）

(A)肺的膈面

(B)肺的纵隔面

(C)肺的胸肋面

(D)肺底

(E)肺尖的内面

22、关于外科感染，叙述不正确的是（）

(A)疖是指一个毛囊及其皮脂腺的化脓性感染

(B)急性蜂窝织炎是皮下、筋膜下蜂窝组织的化脓性感染

(C)脓性指头炎是指手指末节掌面皮下组织的化脓性感染

(D)痈是指多个不同部位散在的毛囊及其皮脂腺的化脓性感染

(E)甲沟炎是指甲沟及其周围组织的急性感染

23、无尿的定义是（）

(A)24 小时尿量少于 100mL

(B)12 小时尿量少于 200mL

(C)24 小时尿量少于 500mL

(D)每小时尿量少于 50mL

(E)每小时尿量少于 17mL

24、下列属于腺垂体激素的是【】

(A) 生长激素

(B) 甲状腺素

(C) 缩宫素

(D) 血管升压素

(E) 生长抑素

25、横断脑干网状结构使易化区活动占优势，其结果是（）

(A)嗜睡

(B)昏迷

(C)去大脑僵直

(D)柔软性麻痹

(E)意向性震颤

26、肠外营养所致的并发症有（）

(A)腹胀

(B)腹泻

(C)低血糖

(D)高脂血症

(E)高血糖

27、某心悸患者查体所见：脉率 89 次/分，心率 113 次/分，心律绝对不齐。最可能的诊断是（）

(A)房性期前收缩

(B)室上性心动过速

(C)心房颤动

(D)心室颤动

(E)室性期前收缩

28、女，32岁。低热、盗汗、腹胀2个月。腹水检查结果：比重1.018，蛋白27g/L，WBC $600 \times 10^6/L$ ，L0.55。普通细菌培养阴性。最可能的诊断是（）

(A)结核性腹膜炎

(B)化脓性腹膜炎

(C)肝硬化腹水

(D)恶性腹水

(E)自发性细菌性腹膜炎

29、可使氧解离曲线左移的情况是()

(A)血pH降低

(B)组织温度升高

(C)血二氧化碳分压降低

(D)2, 3-二磷酸甘油酸浓度升高

30、下列不属于急性上消化道出血临床表现的是（）

(A)上腹部压痛阳性

(B)柏油便

(C)呕吐咖啡样物质

(D)听诊肠鸣音活跃

(E)可出现头晕、心悸

31、上述患者病变部位最可能检出的体征是【】

(A)语颤消失，叩诊过清音，呼吸音减弱

- (B) 语颤消失，叩诊清音，呼吸音减弱
- (C) 语颤消失，叩诊实音，呼吸音消失
- (D) 语颤增强，叩诊浊音，闻及支气管呼吸音
- (E) 语颤消失，叩诊鼓音，呼吸音消失

32、调节产热活动最重要的体液因素是()

- (A) 甲状腺激素
- (B) 甲状旁腺激素
- (C) 胰岛素
- (D) 生长激素

33、自主神经节前纤维释放的递质是（）

- (A) 多巴胺
- (B) 腺苷
- (C) 谷氨酸
- (D) 甘氨酸
- (E) 乙酰胆碱

34、男，62岁。急性心肌梗死第2天，排便中突发呼吸困难。查体：BP90/70mmHg，P120次/分，呼吸急促，双肺满布湿啰音及哮鸣音。最可能的诊断是()

- (A) 乳头肌功能不全
- (B) 支气管哮喘
- (C) 急性心脏压塞
- (D) 急性左心衰竭

35、属于男性输精管道的是()

- (A) 睾丸

(B)尿道球腺

(C)精囊腺

(D)附睾

36、ARDS 特征性病理变化是【】

(A) 肺表面活性物质的数量增加

(B) 肺表面活性物质的活性增加

(C) 肺内分流量减少

(D) 肺血管内皮和肺泡损害，肺间质水肿

(E) 肺顺应性增强

37、男，50 岁。间断反酸，规律性剑突下疼痛 2 年，排柏油样便 2 天。最可能的诊断是

【】

(A) 急性糜烂出血性胃炎

(B) 胃癌伴消化道出血

(C) 消化性溃疡并出血

(D) 贲门黏膜撕裂综合征

(E) 食管静脉曲张破裂出血

38、引起左锁骨上窝淋巴结肿大的常见病症是（）

(A)牙髓炎

(B)气管炎

(C)结肠癌

(D)食管炎

(E)食管癌

39、与阴道后穹后方相邻的腹膜间隙是（）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/986221230105010104>