

呼吸与危重症医学科第二季度三基理论考核

您的姓名：[填空题] *

1.女性，突发胸部疼痛3小时，面色苍白，大汗，血压180/100mmHg，超声心动图提示主动脉根部扩张、升主动脉呈真假双腔征（）[单选题] *

- A、主动脉夹层
- B、急性心肌梗死
- C、肺栓塞(正确答案)
- D、肠系膜动脉栓塞

2.肺炎球菌肺炎高热病人降温不宜采用（）[单选题] *

- B、乙醇擦浴
- A、温水擦身
- D、大血管区放置冰袋
- C、退热药(正确答案)

3.按病因学分类，临床上最常见的肺炎是（）[单选题] *

- A、细菌性肺炎(正确答案)
- B、病毒性肺炎
- C、支原体肺炎
- D、真菌性肺炎

4.属于肺栓塞溶栓禁忌症的是（）[单选题] *

- A、有活动性内出血
- B、近期自发性颅内出血

C、2周内的大手术、分娩、器官活检

D、以上都是(正确答案)

5.急性肺栓塞的溶栓时间窗 () [单选题] *

A、14天

B、6小时(正确答案)

C、12小时

D、24小时

6.肺栓塞最常见的栓子 () [单选题] *

A、血栓(正确答案)

B、羊水

C、空气

D、脂肪

7.急性肺栓塞的治疗 () [单选题] *

A、溶栓

B、抗凝治疗

C、呼吸循环支持

D、以上都是(正确答案)

8.考核肺结核化疗效果的主要指标是： () [单选题] *

A、x线好转

B、症状好转

C、血沉下降

D、痰结核菌转阴性(正确答案)

9.慢性肺心病急性加重期的最常见诱因是 () [单选题] *

- A、过劳
- B、大量利尿
- C、使用镇静剂
- D、呼吸道感染(正确答案)

10.女性，56岁，诊断肺心病3年，2天前受凉后发热，咳嗽，咳痰加重，咯黄痰，呼吸困难不能平卧。查体明显发绀，颈静脉怒张，双肺广泛散在干湿性啰音，心率110次/分，三尖瓣区收缩期杂音，肝肋下3cm，下肢水肿。该患者病情加重的主要原因（）[单选题]*

- A、呼吸道感染(正确答案)
- B、心动过速
- C、严重缺氧
- D、未坚持用洋地黄

11.有慢性咳嗽史，查体有肺气肿体征的病人，出现下列哪项改变提示合并早期肺心病（）[单选题]*

- A、发绀、头痛、嗜睡、神志恍惚
- B、肺部干、湿性啰音
- C、剑突下心脏收缩期搏动、心音增强(正确答案)

12.女性，58岁，肺心病史5年，急性加重2天来院，既往无高血压病史。头痛，恶心，烦躁。BP160/92mmHg，心率100次/分，对此患者主要的治疗应（）[单选题]*

- A、降压药口服
- B、安定静注
- C、改善通气、氧疗(正确答案)
- D、呼吸兴奋剂的使用

13.慢性肺心病右心衰竭，为降低肺动脉压，减轻右心负荷，下列治疗中应选用

() [单选题] *

- A、地高辛
- B、速尿
- C、改善通气，吸氧(正确答案)
- D、异丙肾上腺素吸入

14.慢性肺心病并发心律失常最多表现为 () [单选题] *

- A、室性期前收缩
- B、房性期前收缩(正确答案)
- C、心房扑动
- D、心房颤动

15.COPD 的标志性症状 B [单选题] *

- A 慢性咳嗽(正确答案)
- B 气短或呼吸困难
- C 喘息和胸闷
- D 咳嗽、咳痰

16.COPD 的高危人群不包括 () [单选题] *

- A 年龄超过 60 岁
- B 办公室文员(正确答案)
- C 长期吸烟
- D 慢性支气管炎患者

17.结核性与癌性胸腔积液鉴别要点是 () [单选题] *

- A.胸水颜色

B.胸水细胞学与细菌学检查(正确答案)

C.胸水蛋白质含量

D.胸水 LDH 含量

18.胸部叩击适用于 () [单选题] *

A 久病体弱，长期卧床、排痰无力者(正确答案)

B 未经引流的气胸

C 肋骨骨折、有骨折史

D 咯血病人

19.肺癌中恶性程度最高的是 () [单选题] *

A.小细胞未分化癌(正确答案)

B.大细胞未分化癌

C.腺癌

D.鳞状上皮细胞癌

20.肺癌发病的最重要的危险因素是 () [单选题] *

A.长期大量吸烟(正确答案)

B.职业致癌因素

C.空气污染

D.电离辐射

21.外源性支气管哮喘，浆细胞产生使人体致敏的抗体是： () [单选题] *

A、IgA

B、IgG

C、IgE (正确答案)

D、IgM

22.慢性肺心病最常见的并发症是（） [单选题] *

- A、肺性脑病(正确答案)
- B、休克
- C、上消化道出血
- D、DIC

23.引起支气管哮喘发作和反复发作的最重要的因素是：（） [单选题] *

- A、遗传因素
- B、支气管粘膜下迷走神经感受器敏感
- C、 β 受体功能低下
- D、气道变应性炎症(正确答案)

24.支气管哮喘发病的最主要临床特点是：（） [单选题] *

- A、反复发作性咳嗽、喘息，经支气管扩张剂治疗后难以缓解
- B、反复发作性咳嗽、咳痰、喘息，经支气管扩张剂治疗后可缓解
- C、反复发作性咳嗽、喘息，经支气管扩张剂治疗后可缓解或自行缓解(正确答案)
- D、反复发作咳嗽、咳痰、喘息，经支气管扩张剂和抗生素治疗后方可缓解

25.支气管哮喘病人急性发作时， PaCO_2 正常或增高表示：（） [单选题] *

- A、没有临床意义
- B、病情好转
- C、病情严重(正确答案)
- D、发作早期

26.哮喘严重发作时，下列哪项是通气不足的可靠指标：（） [单选题] *

- A、弥漫性哮鸣音
- B、 PaCO_2 50mmHg(正确答案)

C、呼气性呼吸困难；

D、PaO₂ 60mmHg

27.主要作用于β₂肾上腺素能受体的支气管解痉药是：（） [单选题] *

A、肾上腺素

B、沙丁胺醇(正确答案)

C、氨茶碱

D、麻黄素；

28.对慢性阻塞性肺疾病患者的健康教育错误的是（） [单选题] *

A 指导呼吸功能康复锻炼

B 避免危险因素

C 持续低浓度氧疗

D 间断高浓度氧疗(正确答案)

29.不利于慢性阻塞性肺疾病患者换气的姿势是（） [单选题] *

A 全身松弛、上身略前倾的坐位

B 端坐位挺胸(正确答案)

C 全身松弛、上身略前倾的站位

D 上身前倾趴在桌上的坐位

30.下列情况可不入院治疗的（） [单选题] *

A 症状显著加剧

B 出现新的体征

C 高龄慢性阻塞性肺疾病患者稳定期(正确答案)

D 新近发生的心律失常

31.慢性阻塞性肺疾病患者通过吹蜡烛来训练缩唇呼气，错误的是（） [单选题] *

A 蜡烛与口唇的距离 15 ~ 20cm 处

B 缩唇的大小程度要适合

C 要使蜡烛火焰熄灭(正确答案)

D 蜡烛与口唇等高

32.慢性阻塞性肺疾病患者家庭氧疗的时间(小时/天)是：（） [单选题] *

A > 15(正确答案)

B > 10

C > 8

D > 6

33.协助慢性阻塞性肺疾病患者训练腹式呼吸时，护士一手放在患者的（） [单选题]

*

A 腹部(正确答案)

B 腰部

C 背部

D 上胸部

34.以下有关慢性阻塞性肺疾病患者氧疗的目的描述错误的（） [单选题] *

A 使肺功能恢复正常(正确答案)

B 提高血氧饱和度

C 提高动脉血氧分压

D 提高肺泡内氧分压 E

35.有关慢性阻塞性肺疾病患者活动与休息的描述，错误的是（） [单选题] *

A 较重者卧床休息

B 病情较轻者可适当活

C 立位时上半身伸直可使腹肌放松(正确答案)

D 应取卧位或半卧位时应使膝半屈

36.慢性阻塞性肺疾病病情严重度的分级为 () [单选题] *

A 高危、轻度、中度、重度、极重度(正确答案)

B 正常、轻度、中度、重度、极重度

C 高危、轻度、中度、重度

D 正常、轻度、中度、重度

37.能反映急性呼吸窘迫综合征(ARDS)的典型症状是 () [单选题] *

A 脉搏浅快

B 血压下降

C 出现神经精神症状

D 进行性呼吸困难(正确答案)

38.急性呼吸窘迫综合征(ARDS)初期的临床特点是 () [单选题] *

A 有严重低氧血症

B 深度昏迷

C 有明显肺部体征

D 呼吸困难(正确答案)

39.患者，男，37岁。因感染性休克入院。护士在观察病情时，下列哪项症状提示其发生急性呼吸窘迫综合征的可能 () [单选题] *

A 呼吸困难迅速加重(正确答案)

B 肺部湿啰音

C 躁动不安

D 动脉氧分压下降

40.患者，28岁，发热3天，今晨起呼吸困难，鼻导管吸氧未见好转。查体：体温39℃，脉搏110次/分，呼吸28次/分，血压110/70mmHg。双肺闻及细湿啰音及管状呼吸音。动脉血气分析：PaO₂ 50mmHg，PaCO₂ 40mmHg。胸部X线：双肺可见大片阴影。诊断为急性呼吸窘迫综合征(ARDS)。氧疗应采取（） [单选题] *

A 高浓度高流量给氧(正确答案)

B 短期高压给氧

C 不给氧

D 低浓度持续给氧

41.对 ARDS 的诊断和病情判断有重要意义的检查是（） [单选题] *

A 血气分析(正确答案)

B 呼吸功能监测

C X 线检查

D 血流动力学监测

42.诊断急性呼吸窘迫综合征的必要条件是（） [单选题] *

APWCP < 18mmHg

B PaO₂/FiO₂ < 200(正确答案)

C PaO₂/FiO₂ < 300

D PaCO₂/FiO₂ < 200

43.患者，28岁，发热3天，今晨起呼吸困难，鼻导管吸氧未见好转。查体：体温39℃，脉搏110次/分，呼吸28次/分，血压110/70mmHg。双肺闻及细湿啰音及管状呼吸音。动脉血气分析：PaO₂ 50mmHg，PaCO₂ 40mmHg。胸部X线：双肺可见大片阴影。诊断为急性呼吸窘迫综合征(ARDS)。患者此时最主要的护理问题是（） [单选题] *

A 活动无耐力

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/987101025005006043>