

最新国家开放大学电大《内科护理学》期末题库及答案

考试说明：本人针对该科精心汇总了历年题库及答案，形成一个完整的题库，并且每年都在更新。该题库对考生的复习、作业和考试起着非常重要的作用，会给您节省大量的时间。做考题时，利用本文档中的查找工具，把考题中的关键字输到查找工具的查找内容框内，就可迅速查找到该题答案。本文库还有其他[网核](#)及[教学考一体化答案](#)，敬请查看。

《内科护理学》题库及答案一

一、单项选择题【每题 分，共 分

. 患者男， 岁，房颤 年，服用地高辛控制心室率 年，近 天患者突然出现恶心，呕吐等症状，同时伴有心悸、头痛、头晕，视物模糊，查心电图：室性早搏二联律，该患者可能发生了 。

- . 消化性溃疡 . 心绞痛
- . 洋地黄类药物中毒 . 高血压
- . 护士给予慢性心衰患者的饮食指导不妥的是 。
- . 应少量多餐
- . 饮食应清淡、易消化
- . 每日摄盐量应少于
- . 增加味精和酱油等调味品.，以促进食欲
- . 支气管扩张症最常见的病因是 。
- . 婴幼儿期的麻疹、支气管肺炎 . 肺结核
- . . 支气管肺癌
- . 诊断肺结核最可靠的依据是 。
- . 低热、盗汗 . 线胸片有空洞
- . 结核菌素试验阳性 . 痰结核菌阳性
- . 预防支气管哮喘发作最有效的措施是 。
- . 按医嘱定时服药 . 回避激发因素
- . 吸入糖皮质激素 . 每日用风速仪监测病情变化
- . 引起上消化道出血最常见的病因是 。
- . 胃癌 . 食道静脉曲张破裂出血
- . 急性糜烂性胃炎 . 消化性溃疡
- . 西咪替丁治疗消化性溃疡的机理是 。
- . 质子泵阻滞剂 . 受体拮抗剂
- . 制酸剂 . 增加粘膜抵抗力
- . 下面关于胃溃疡的叙述不正确的是 。
- . 可见于任何年龄，青少年多 . 慢性病程

- .C周期性发作 . 节律性疼痛
- . 腹式呼吸和缩唇呼气的方法不妥的是 。
- . 由鼻吸气 . 吸气时腹肌收缩
- .C经口呼气 . 呼气时缩拢 唇
- . 我国最常见的贫血是 。
- . 营养性巨幼细胞贫血 . 再生障碍性贫血
- .C缺铁性贫血 . 恶性贫血
- . 血小板在循环血中的寿命为 。
- . ~ 天 . ~ 天
- .C ~ 天 . ~ 天
- . 急性有机磷杀虫药中毒主要死因是 。
- . 周围循环衰竭 . 脑水肿
- C • 呼吸衰竭 . 肝肾功能衰竭
- . 脑出血的部位最常见的是 。
- . 脑室出血 . 脑桥出血
- .C小脑出血 . 基底节出血
- . 癫痫持续状态时的护理措施不妥的是 。
- . 遵医嘱应用安定，迅速控制发作
- . 用力按压肢体制止抽搐
- . 将毛巾或外裹纱布的压舌板塞入一侧臼齿间
- . 解开衣领、腰带，避免影响呼吸
- . 使用阿托品、解磷定治疗有机磷农药中毒，患者神志转清醒、呼吸困难减轻、肺部湿罗音减少。约
 半小时左右，患者突然再次出现意识模糊、躁动、抽搐，体温高达 . . 。C。该患者可能发生了 。
- . 脑出血 . 脑水肿
- .C解磷定中毒 . 阿托品中毒
- . 过敏性紫癜最常见的临床类型为 。
- . 腹型 . 关节型
- .C紫癜型 . 肾型
- . 下列药物中属于保钾利尿剂的是 。
- . 依他尼酸 利尿酸 . 氢氯甲噻嗪
- . 呋塞米 速尿 . 安体舒通
- . 门静脉高压症的临床表现不包括 。

- . 腹水 . 肝掌、蜘蛛痣
- . 脾大、脾功能亢进 . 腹壁脐周静脉曲张
- . 支气管哮喘重度急性发作期患者使用药物不正确的是 。
- . 雾化吸入 激动剂
- . 静脉滴注沙丁胺醇
- . 雾化吸入抗胆碱药
- . 吸入倍氯米松气雾剂
- . 由于心排血量突然下降出现的晕厥称为 。
- . 病态窦房结综合征 . 阿一斯综合征
- . 休克 . 预激综合征

二、名词解释 每题 分，共 分

- . 肺性脑病
- . 肝性脑病
- . 肾性骨病
- . 白血病
- . 系统性红斑狼疮

三、简答题 任选 题，每题 分。共 分，多答不加分

- . 简述引起脑血管疾病的危险因素。
- . 简述对急性肾盂肾炎病人的护理措施及预防复发的措施。
- . 列出对肝硬化患者休息、饮食护理要点。
- . 简述冠心病心绞痛的典型临床表现。

四、论述题 分

患者，男性， 岁，临床诊断支气管扩张，患者咳大量脓痰，拟进行体位引流，请写出对其进行护理的措施。

试题答案及评分标准

一、单项选择题 每题 分，共 分

-
-
-
-

二、名词解释 每题 分，共 分 ，

· 肺性脑病：因呼吸功能不全导致缺氧和二氧化碳潴留而引起的神经系统、精神障碍的综合征。

· 肝性脑病：是严重肝病引起的，以代谢紊乱为基础的中枢神经系统功能失调的综合征，其主要临床表现为意识障碍、行为失常和昏迷。

· 肾性骨病：慢性肾衰可引起肾性骨营养不良症，又称肾性骨病。常见表现包括：纤维囊性骨炎，肾性骨软化症（肾性佝偻病），骨质疏松症及肾性骨硬化症。

· 白血病：白血病是一类原因未明的造血干细胞的恶性克隆性疾病。白血病细胞在骨髓及其他造血组织中弥漫性、恶性增生，浸润破坏体内脏器和组织，而正常造血受抑制，临床上产生各种症状和体征。

· 系统性红斑狼疮：是一累及全身多个系统的自身免疫性疾病，血清中出现多种自身抗体，并有明显的免疫紊乱。

三、简答题（任选3题。每题 分。共 分，多答不加分）

· 简述引起脑血管疾病的危险因素。

可干预的危险因素：高血压、心脏病、糖尿病、 或脑卒中是目前公认的最重要的危险因素。

分)

另外，高脂血症、吸烟和酗酒、 重、体力活动减少、口服避孕药、饮食、眼底动脉硬化、无症状性颈动脉杂音（狭窄）、同型半胱氨酸血症等，均是增加脑血管疾病发生的危险因素。 分)

不可干预的危险因素：年龄、性别、种族、遗传、气候等。 分)

· 简述对急性肾盂肾炎病人的护理措施及预防复发的措施。

急性肾盂肾炎病人的护理措施：

第一周应卧床休息。 分)

饮食及饮水护理：急性期进食清淡并含丰富营养的食物，补充多种维生素。多饮水，勤排尿。

分)

高热护理：体温大于 39℃时，需进行物理降温。 分)

疼痛护理：减轻疼痛的方法为卧床休息，采用双腿屈曲位，尽量不要站立或坐位。

分)

预防复发措施： 任答 项，各 分)

向病人说明做好个人卫生，勤洗澡，勤换内衣裤，发现尿路感染时要及时就医。

患感冒要及时治疗，不可过度劳累，平时多饮水、不憋尿是简便而有效的预防措施。

若在性生活后易患尿路感染，可在房事后排尿，并口服抗菌药物。

· 列出对肝硬化患者休息、饮食护理要点。

休息：)①代偿期患者可参加轻体力活动，避免过度疲劳。 分)②失代偿期患者应卧床休息为主，以降低肝脏的代谢率，增加肝脏的血流量，有利于肝细胞修复。 分)

饮食：)①高热量、高蛋白、高维生素、易消化的食物，用醋、糖、色、香、味提高病人食欲，少

量多餐，以保证营养。(分)②应禁酒及避免食人粗糙或刺激性食物。(分)③血氨偏高者遵医嘱限制或禁食蛋白质，待病情好转后再逐渐增加蛋白质摄入量；有腹水时应给予低盐或无盐饮食，限制进水量。

分)

· 简述冠心病心绞痛的典型临床表现。

典型的心绞痛常因体力活动、情绪激动而诱发，也有在饱餐或休息时发病。(分)

主要症状为胸骨后压迫性不适或为紧缩、压榨、堵塞感，也可有烧灼感，放射至左肩、左上肢内侧，病人被迫停止原有动作。(分)

休息或含服硝酸甘油后 ~ 分钟内缓解。(分)

发作时，病人面色苍白，出冷汗，心率增快，血压升高。(分)

四、论述题 (分)

患者，男性， 岁，临床诊断支气管扩张，患者咳大量脓痰，拟进行体位引流，请写出对其进行护理的措施。

答： 确定引流体位。根 身体评估时湿罗音集中的部位 (分)、 线胸片显示的病变部位 (分)，再结合病人自身的体验 (何种姿势有利于咳痰) (分)，来确定引流体位。体位选择的原则是使病变部位处于高处 (分)，引流支气管开口向下 (分)，以利于痰液流入大气管和气管排出。(定期翻身也有一定的体位引流作用) (分)

引流时间：引流通常在餐前进行 (分)，每日 ~ 次 (分)，每次持续 ~ 分钟 (分)。()

加强引流效果：引流前应给予超声雾化吸入 (分)，引流同时应辅以胸部扣击等 (分)。

《内科护理学》题库及答案二

一、单项选择题 (每题 分，共 分)

- 心脏的正常起搏点位于 ()
- 窦房结 . 房室结
- 房室束 . 蒲肯野纤维
- 左心功能不全的典型表现是 ()
- 肝肿大 . 胸痛
- 呼吸困难 . 少尿
- 患者，男， 岁，房颤 年，服用地高辛控制心室率 年，近 天患者突然出现恶心，呕吐等症状，同时伴有心悸、头痛、头晕，视物模糊，查心电图：室性早搏二联律，该患者可能是发生了 ()
- 消化性溃疡 . 心绞痛

- 洋地黄类药物中毒 · 高血压
- 由于心排血量突然下降出现晕厥称为 。
- 预激综合征 · 病窦综合征
- 休克 · 阿一斯综合征

岁男性支气管哮喘患者，于一阵剧烈咳嗽后，出现短暂意识丧失，应考虑的诊断是

- 痰液窒息 · 哮喘严重发作
- 咳嗽性晕厥 · 呼吸衰竭
- 对肺癌的诊断及分型具有重要意义的检查方法是 。
- 胸部影像学检查 · 纤维支气管镜检查
- 痰癌细胞检查 · 经胸壁穿刺活检
- 肺心病的最常见的死亡原因是 。
- 心律失常 · 肺性脑病
- 休克 · 心力衰竭

· 女性， 岁， 天前淋雨后发冷发热、胸痛、咳嗽、气短，既往有结核病史。查体：左肺下部叩浊，可闻水泡音，痰结核菌集菌阴性，白细胞 ，胸片左肺下叶大片状致密阴影，考虑诊断为 。

- 浸润型肺结核 阻塞性肺炎
- 肺脓肿 · 肺炎球菌肺炎
- 引起上消化道出血最常见病因是 。
- 胃癌 · 食道静脉曲张破裂出血
- 急性糜烂性胃炎 · 消化性溃疡
- 西咪替丁治疗消化性溃疡的机理是 。
- 质子泵阻滞剂 · 受体拮抗剂
- 制酸剂 · 增加黏膜抵抗力
- 高热病人饮食及人量护理措施哪项不妥 。
- 进食高蛋白、高热量、易消化食物
- 少量多餐、多饮水
- 出汗多时应多饮糖水，以补充热量
- 必要时遵医嘱静脉补液以保证人量
- 门静脉高压症的临床表现不妥的是 。
- 腹水 · 肝掌、蜘蛛痣

- . 脾大、脾功能亢进 . 腹壁脐周静脉曲张
- . 正常成人 小时尿量为 。
- ~
- . .
- . 甲亢时最有诊断意义的体征是 。
- 心率加快 。
- . 弥漫性甲状腺肿伴血管杂音
- . 突眼 . 心脏增大
- . 皮质醇增多症特有的临床表现是 。
- . 高血压 . 皮肤多毛
- . 骨质疏松 . 向心性肥胖
- 理化因素中毒的毒物吸收入血液后，代谢毒物的主要器官是 。
- . 肝脏 . 肠道
- . 肾脏和肝脏 . 肾脏
- . 中毒后洗胃的合适时间应是在中毒后 。
- . 小时内 小时内
- 小时内 . 小时内
- . 脑血栓形成的典型临床表现不包括 。
- . 多于安静状态下起病 . 多无意识障碍
- 脑膜刺激征明显 . 脑脊液正常
- . 风湿性疾病的主要药物治疗不包括 。
- . 非甾体抗炎药 . 血浆置换
- 糖皮质激素 . 改变病情的抗风湿药
- . 系统性红斑狼疮患者死亡的最常见原因是 。
- . 脑血管意外 & 狼疮性肺炎
- . 尿毒症 . 急性胰腺炎

二、名词解释（每题 分，共 分）

- . 慢性阻塞性肺疾病
- . 肝性脑病
- . 肾性骨病
- . 糖尿病足
- . 中暑

三、简答题（每题 分，共 分）

列出循环系统疾病的三个常见症状，并写出每一个症状的一个常见病因。

简述肺心病急性加重期持续低流量吸氧的氧疗护理措施及理论依据。

- 简述口服铁剂的护理要点。
- 简述对慢性肾衰患者的健康教育内容。

四、论述题（ 分）

- 试述急性胰腺炎的主要病因、主要护理措施。

试题答案及评分标准

一、单项选择题（每题 分，共 分）

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

二、名词解释（每题 分，共 分）

· 慢性阻塞性肺疾病：是一种以气流受限为特征的肺部疾病，气流受不完全可逆，呈缓慢进行性发展。目前确切病因还不完全清楚。

肝性脑病：是严重肝病引起的，以代谢紊乱为基础的中枢神经系统功能失调的综合征，其主要临床表现为意识障碍、行为失常和昏迷。

肾性骨病：慢性肾衰可引起肾性骨营养不良症，又称肾性骨病。常见表现包括：纤维囊性骨炎，肾性骨软化症（肾性佝偻病），骨质疏松症及肾性骨硬化症。

糖尿病足：由糖尿病引起的与下肢远端神经异常和不同程度的周围血管病变相关踝关节或踝关节以下的足部感染、溃疡和（或）深层组织破坏。

中暑：在高温和湿度较大的环境下体温调节中枢功能障碍、汗腺功能衰竭和水电解质过度丧失所致的疾病。

三、简答题（每题 分，共 分）

- 列出循环系统疾病的三个常见症状，并写出每一个症状的一个常见病因。

呼吸困难：是指呼吸时病人感到空气不足、憋气、呼吸费力。

主要见于：左心功能不全，其产生的主要原因是肺瘀血、肺组织弹性下降。

心悸：是指病人自觉心跳或心慌并伴心前区不适感。

主要发病原因包括：①心脏搏动增强。②心律失常。③心脏神经官能症。

胸痛：主要由于心肌缺血、缺氧所致。

水肿：心源性水肿是右心功能不全的主要表现，特点是首先出现在身体下垂部位。

晕厥：导致晕厥发生的原因很多，除脑血管病变外，各种器质性心脏病均可引起晕厥。这类由于心排血量突然下降出现的晕厥称为阿-斯综合征。

（每项 分，任答 项）

简述肺心病急性加重期持续低流量吸氧的氧疗护理措施及理论依据。

氧疗护理措施：给予持续低浓度吸氧，氧浓度一般在 \sim ，流量 \sim ，经鼻持续吸入，必要时可通过面罩或呼吸机给氧，吸入的氧气必须湿化。（ 分）

理论依据：①防止二氧化碳潴留加重；②防止严重缺氧引起的组织损伤。（ 分）

．简述口服铁剂的护理要点：

向病人说明口服铁剂易引起胃肠道反应，该类药物宜在饭后服用。（ 分）

口服液体铁剂时，病人要使用吸管，避免染黑牙齿。（ 分）

服铁剂同时忌饮浓茶。（ 分）

服铁剂期间大便会变成黑色，应向病人说明以消除顾虑。（ 分）

．简述对慢性肾衰患者的健康教育内容。

坚持治疗慢性肾衰的基础疾病，去除肾衰恶化诱因：让病人遵守医嘱，积极治疗肾衰基础疾病。避免肾衰恶化诱因，如预防感染；治疗心力衰竭；不使用肾毒性药物；不可劳累等，以延缓肾功能减退。（ 分）

对透析或肾移植患者的指导：采用透析者应坚持定期透析治疗，遵守透析的规则，如水电盐摄入量；（ 分）肾移植者应定期门诊复查，坚持服用免疫抑制药。 分

四、论述题（ 分）

试述急性胰腺炎的主要病因、主要护理措施。

主要病因：

胆道疾病：是急性胰腺炎最常见的病因。（ 分）

酗酒和暴饮暴食：乙醇和暴饮暴食可刺激胰腺大量分泌，引起十二指肠乳头水肿和括约肌痉挛，使胰管内压力增高，胰液排出受阻，引起急性胰腺炎。（ 分）

胰管梗阻：各种原因引起的胰管梗阻造成胰液排泌障碍，胰管内压力增高，引起急性胰腺炎。（ 分）

主要护理措施：

病情监测：密切监护病人的生命体征、神志、记出入量，了解有无腹肌紧张、压痛程度及范围以及早发现并发症，并配合医生进行抢救。（ 分）

休息与体位：应卧床休息，可协助病人采取舒适卧位，以减轻疼痛，保证睡眠，改善病情。应注意患者的保护，防止坠床。（ 分）

(饮食护理：遵医嘱禁食并给予胃肠减压。胃肠减压期间注意保持引流通畅，观察和记录引流液的性质和量。腹痛和呕吐基本消失，血尿淀粉酶正常后，可进食少量碳水化合物类流食，如米汤、藕粉等，一天后如无不适应反应，则可改为半流食，以后逐步过渡到低脂、低蛋白普食，适量选用少量优质蛋白质（每日供左右）以利胰腺的修复。忌油腻饮食，以免加重胰腺负担。（分）

(口腔护理：禁食期间一般不可饮水，口渴可含漱或用水湿润口唇。为减轻因胃肠减压管所致的口腔不适及干燥，必要时为病人做口腔护理，以增加舒适感。（分）

(药物护理：遵医嘱补充液体和电解质，疼痛较重时遵医嘱给予止痛药。（分）

《内科护理学》题库及答案三

一、单项选择题（每题分，共分）

- . 心源性呼吸困难最先出现的是()。
 - . 端坐呼吸
 - . 阵发性夜间呼吸困难
 - . 劳力性呼吸困难
 - . 心源性哮喘
- . 护理服用洋地黄制剂的病人时，下列哪项措施是错误的？()
 - . 给洋地黄前先数脉搏，若小于次/分不能给药
 - . 观察心电图变化
 - . 如果上一顿药物漏服，下一顿应加倍剂量
 - . 发现洋地黄中毒表现及时通知医生
- . 下列最易发生慢性呼吸衰竭的疾病是()。
 - . 细菌性肺炎 . 慢性阻塞性肺疾病
 - . 支气管扩张 . 大量胸腔积液
- . 支气管哮喘重度急性发作期患者使用药物不正确的是()。
 - . 雾化吸入 激动剂 . 静脉滴注沙丁胺醇
 - . 雾化吸入抗胆碱药 . 吸入倍氯米松气雾剂
- . 患者，男，岁，房颤年，服用地高辛控制心室率年，近天患者突然出现恶心，呕吐等症状，同时伴有心悸、头痛、头晕，视物模糊，查心电图：室性早搏二联律，该患者可能是发生了()。
 - . 消化性溃疡 . 心绞痛

- . 洋地黄类药物中毒 . 高血压
- . 病人发生室颤时首选的治疗方法是 .
- . 阿托品静脉注射 . 同步电复律
- . 非同步电复律 . 高流量氧气吸入
- . 下面关于胃溃疡的叙述不正确的是 .
- . 可见于任何年龄，青少年多 . 慢性病程
- . 周期性发作 . 节律性疼痛
- . 引起肝性脑病患者血氨增高的因素，不包括 .
- . 上消化道出血 . 便秘
- . 失眠 . 高蛋白饮食
- . 引起上消化道大出血最常见病因是 .
- . 胃癌 . 食道静脉曲张破裂出血
- . 急性糜烂性胃炎 . 消化性溃疡
- . 西咪替丁治疗消化性溃疡属于 .
- . 质子泵阻滞剂
- . 拮抗剂
- . 制酸剂
- . 增加黏膜抵抗力的药物
- . 诱发慢性肾炎肾功能恶化的因素中不妥的是 .
- . 血压持续升高 . 上呼吸道、尿道等感染
- . 使用氨基苷类抗生素 . 心悸偶发房性早搏
- . 我国最常见的贫血是 .
- 营养性巨幼细胞贫血 . 再生障碍性贫血
- . 缺铁性贫血 . 恶性贫血 ‘
- . 血小板在循环血中寿命为 .
- . ~ 天 . ~ 天
- . ~ 天 . 一天
- 甲亢时最有诊断意义的体征是 .
- . 心率加快 . 弥漫性甲状腺肿伴血管杂音
- . 突眼 . 心脏增大
- 皮质醇增多症特有的临床表现是 .
- 高血压 . 皮肤多毛

- . 骨质疏松 . 向心性肥胖
- . 风湿性疾病是指 。
- . 累及关节及周围软组织的一大类疾病
- . 过敏性疾病
- . 病毒感染的一类疾病
- . 血尿酸增高的一组疾病

患者，男， 岁，因喷洒农药时操作不当造成有机磷农药中毒，给予抗胆碱药后出现瞳孔较前扩大，颜面潮红，口干，皮肤干燥，心率加快，此表现称为 。

- . 阿托品中毒 . 阿托品化
- . 中间型综合征 . 毒蕈碱样症状

高血压性脑出血最常见的部位是 。

- . 脑室出血 . 脑桥出血
- . 小脑出血 . 基底节出血
- . 癫痫持续状态时的护理措施不妥的是 。
- . 遵医嘱应用安定，迅速控制发作
- . 用力按压肢体制止抽搐
- . 将毛巾或外裹纱布的压舌板塞入一侧臼齿间
- . 解开衣领、腰带，避免影响呼吸
- . 脑血栓形成的典型临床表现不包括 。
- . 多于安静状态下起病 . 多无意识障碍
- . 脑膜刺激征明显 . 脑脊液正常

二、名词解释（每题 分，共 分）

- . 高血压脑病
- . 肾盂肾炎
- . 慢性阻塞性肺疾病
- . 消化性溃疡
- . 真性菌尿

三、简答题（每题 分，共 分）

简述冠心病心绞痛的典型临床表现。

- . 简述对原发性支气管肺癌化疗的护理。
- . 简述对肝硬化患者腹水的护理。
- . 说明对慢性肾衰患者的健康教育内容。

四、论述题（ 分）

- 试述对慢性肾衰患者“有感染的危险：与营养不良、贫血、透析治疗有关的”护理措施。

试题答案及评分标准

一、单项选择题（每题 分，共 分）

二、名词解释（每题 分，共 分）

· 高血压脑病：血压突然或短期内明显升高，同时伴有中枢神经功能障碍征象。其机制可能为过高的血压导致脑灌注过多，出现脑水肿所致。临床有严重头痛、呕吐、神志改变，重者意识模糊、抽搐、昏迷。

肾盂肾炎：由细菌引起的肾盂、肾盏和肾实质的感染性炎症。

· 慢性阻塞性肺疾病：是一种以气流受限为特征的肺部疾病，气流受限不完全可逆，呈缓慢进行性发展。

消化性溃疡：主要指发生在胃和十二指肠球部的慢性溃疡，因溃疡的形成与胃酸及胃蛋白酶的消化作用有关，故称为消化性溃疡。

真性菌尿：临床常用清洁中段尿做定量培养，菌落计数，定量检查若尿含菌量 10^5 /ml，为有意义的细菌尿，又称为真性菌尿，多为肾盂肾炎。

三、简答题（每题 分，共 分）

- 简述冠心病心绞痛的典型临床表现。

典型的心绞痛常因体力活动、情绪激动而诱发，也有在饱餐或休息时发病。（ 分）

主要症状为胸骨后压迫性不适或为紧缩、压榨、堵塞感，也可有烧灼感，放射至左肩、左上肢内侧，病人被迫停止原有动作。（ 分）

休息或含服硝酸甘油后 $1\sim2$ 分钟内缓解。（ 分）

发作时，病人面色苍白，出冷汗，心率增快，血压升高。（ 分）

- 简述对原发性支气管肺癌化疗的护理。

· 胃肠道反应：出现恶心、呕吐时，应减慢药物滴注速度；遵医嘱应用灭吐灵、氯丙嗪等药物；化疗前、后 2 小时内避免进食；少量多餐。记录出入量，注意补充水、电解质及营养物质。

（ 分）

骨髓抑制：化疗期间应密切观察血象变化，遵医嘱应用促白细胞生成药物。预防感染，

并做好保护性隔离。(分)

预防局部组织坏死和栓塞性静脉炎。(分)

口腔护理。(分)

其它：鼓励病人多饮水，促进排尿。(分)

· 简述对肝硬化患者腹水的护理。

轻度腹水者可采取平卧位，以增加肝、肾血流量；大量腹水者可取半卧位，以使横膈下降，减轻呼吸困难。(分)

腹水患者应做好皮肤护理，每日可用温水轻轻擦浴，保持皮肤清洁。病人衣着宜宽大柔软。(分)

经常更换体位，骨隆突处可用棉垫或气圈垫起，以防发生压疮或感染。(分)

· 说明对慢性肾衰患者的健康教育内容。

坚持治疗慢性肾衰的基础疾病，去除肾衰恶化诱因：让病人遵守医嘱，积极治疗肾衰基础疾病。避免肾衰恶化诱因，如预防感染；治疗心力衰竭；不使用肾毒性药物；不可劳累等，以延缓肾功能减退。(分)

对透析或肾移植患者的指导：采用透析者应坚持定期透析治疗，遵守透析的规则，如水电解质摄入量；肾移植者应定期门诊复查，坚持服用免疫抑制药。(分)

四、论述题 (分)

· 试述对慢性肾衰患者“有感染的危险：与营养不良、贫血、透析治疗有关的”护理措施。

评估引起病人感染的危险因素（营养状况、贫血程度等）及部位（有无咳嗽咳痰、尿痛尿频等）。(分)

向病人 / 家属解释引起感染的危险因素（营养不良、粒细胞功能低）、易感部位（肺部常见，其次泌尿道、皮肤）、预防措施（克服纳差，主动进食，改善营养状况，用餐前后漱口、定期室内空气消毒、勤洗澡换内衣裤）。(分)

增加营养，透析病人摄入蛋白质为 ，优质蛋白占 以上。(分)

透析治疗时严格无菌操作，家庭腹膜透析时必须每日进行家庭房间空气消毒。(分)

指导并协助病人做好皮肤、口腔、外阴的护理。(分)

注意保暖，避免与上呼吸道感染的病人接触。(分)

长期卧床的病人，应鼓励其进行深呼吸和有效咳嗽，以预防坠积性肺炎的发生。

(分)

《内科护理学》题库及答案四

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/988045053107006035>