

神经内科测试试题与答案

1、常见气道低压报警的原因

- A、气管、支气管痉挛
- B、气道内黏液滞留
- C、气管套管位置不当
- D、患者肌张力增高
- E、患者与呼吸机的连接管道脱落或漏气

答案：E

2、引起内源性感染的病原体是来自

- A、医院自身环境中存在的致病菌
- B、患者体内或体表的正常菌群或条件致病菌
- C、医院内工作人员携带的病菌
- D、由探视人员带到医院的病菌
- E、感染部位分离出的致病菌

答案：B

3、急性脑血管病伴脑疝形成，最急需的措施是

- A、CT
- B、MRI
- C、腰椎穿刺
- D、遵医嘱快速输入甘露醇
- E、脑血管造影

答案：D

4、护理组织文化的核心是

- A、循证护理观
- B、护理程序
- C、整体护理观
- D、护理价值观
- E、护理服务观

答案：D

5、医院一般环境的处理原则是

- A、以清洁为主
- B、以化学消毒为主
- C、以灭菌为主
- D、以清除医疗垃圾为主
- E、以清除传染源为主

答案：A

6、导致成年人缺铁最常见的原因是

- A、铁的摄入不足
- B、铁的需要增加
- C、铁的需要增加
- D、铁不能被利用
- E、慢性失血

答案：E

7、下列哪项是补充铁剂的最佳时间

- A、餐前
- B、餐后即服
- C、餐后 30 分钟
- D、临睡前
- E、晨起时

答案：C

8、对于不稳定型心绞痛的患者，最优先考虑的护理诊断是

- A、疼痛
- B、活动无耐力
- C、焦虑
- D、气体交换受损
- E、知识缺乏

答案：A

9、患者，男性，65岁，高血压病史20年，突然发生言语不清伴左面部麻木，近一个月来共发生3次，每次持续3-5分钟，查体无神经系统异常。脑CT无异常。患者反复发生上述情况将会导致

- A、脑出血
- B、硬膜下血肿
- C、脑梗死
- D、脑膜炎
- E、蛛网膜下腔出血

答案：C

10、我国规定管理的传染病分为

- A、甲类1种、乙类23种、丙类11种
- B、甲类2种、乙类24种、丙类9种
- C、甲类3种、乙类28种、丙类9种

- D、甲类 3 种、乙类 24 种、丙类 9 种
- E、甲类 2 种、乙类 22 种、丙类 11 种

答案：E

11、急性脊髓炎的常用护理诊断为

- A、低效型呼吸型态
- B、躯体移动障碍
- C、感知改变
- D、潜在并发症
- E、肺炎

答案：B

12、为冠心病患者治疗决策提供依据的重要检查是

- A、心电图
- B、超声心动图
- C、冠状动脉造影
- D、右心室造影
- E、胸部 X 线

答案：C

13、下列哪项对提示早期脑疝形成最有意义

- A、头痛、呕吐、呼吸困难
- B、意识丧失、瞳孔散大
- C、剧烈头痛、频繁呕吐、意识障碍
- D、脉搏、呼吸、血压出现“两慢一快”
- E、呼之不醒、双侧瞳孔散大

答案：C

14、下列疾病不会发生颅内高压的有

- A、脑内血肿
- B、硬脑下血肿
- C、颅内肿瘤
- D、脑震荡
- E、脑水肿

答案：D

15、患者女性，43 岁，被汽车撞倒，头部受伤，唤之睁眼，回答问题错误，检查时躲避刺痛，其格拉斯哥昏迷评分为

- A、15 分
- B、12 分

C、11分

D、8分

E、5分

答案：C

16、急性下壁心肌梗死的特征性心电图改变出现于

A、V1、v2、v3 导联

B、v3、v4、v5 导联

C、v5、v6 导联

D、II、III、aVF 导联

E、I、II、aVL 导联

答案：D

17、下列哪项最能表现溃疡的特征

A、恶心呕吐

B、腹胀、暖气

C、出汗、心悸

D、上腹节律性痛

E、明显反酸

答案：D

18、PDCA 循环的特点是

A、做好患者照顾的质量保证

B、大环套小环，互相促进

C、有效掌握医疗护理照顾的成本效益

D、满足工作人员的需求

E、落实患者和工作人员的安全措施

答案：B

19、为昏迷病人插鼻饲管，当胃管至会厌部时，要将病人头部托起，目的是

A、减轻病人的痛苦

B、以免损伤食管黏膜

C、避免病人恶心

D、增大咽喉部通道的弧度

E、使喉管肌肉舒张，便于进入

答案：D

20、下列稳定病人情绪、减轻焦虑的措施中，不当的是

A、回避病人对自己病情的询问

- B、介绍其与治疗成功的病人交谈
- C、不与危重病人同住一室
- D、鼓励病人讲出自己的感受
- E、酌情给予镇静剂

答案：A

21、急性硬脑膜外血肿导切迹疝时，有诊断意义的瞳孔变化是

- A、患侧瞳孔忽大忽小
- B、患侧瞳孔先缩小再逐渐散大
- C、双侧瞳孔忽大忽小
- D、患侧瞳孔散大
- E、双侧瞳孔大小不变

答案：B

22、不宜与精氨酸配伍的药物是

- A、林格液
- B、葡萄糖
- C、生理盐水
- D、碳酸氢钠
- E、葡萄糖生理盐水

答案：D

23、特发性血小板减少性紫癜的治疗首选：

- A、糖皮质激素
- B、脾切除
- C、输新鲜血
- D、输血小板悬液
- E、大剂量免疫球蛋白滴注

答案：A

24、下列哪种脑出血最常见

- A、丘脑出血
- B、壳核出血
- C、尾状核出血
- D、脑叶出血
- E、脑桥出血

答案：B

25、插导尿管前女性尿道口和小阴唇的消毒顺序为

- A、自上而下、由内向外

- B、自上而下、由外向内
- C、自下而上、由内向外
- D、自下而上、由外向内

答案：B

26、对急性感染性多发性神经炎的诊断具有特殊意义的是

- A、上呼吸道感染病史
- B、对称性肢体远端感觉异常
- C、脑神经受累极为常见
- D、脑脊液有蛋白分离现象
- E、应用肾上腺皮质激素治疗有效

答案：D

27、门静脉性肝硬化的最可靠诊断指标是：

- A、腹水
- B、脾肿大
- C、肝掌、蜘蛛痣
- D、白蛋白与球蛋白比值倒置
- E、肝穿刺活检有假小叶形成

答案：E

28、患者，男，18岁，从墙上掉下，后枕部着地，有意识障碍15分钟并有呕吐，清醒后有逆行性遗忘，最可能的诊断是

- A、脑挫伤
- B、脑震荡
- C、脑干损伤
- D、颅内血肿
- E、脑水肿

答案：B

29、鼻导管吸氧，氧流量2L/min，能达到多少氧浓度？

- A、24%
- B、29%
- C、35%
- D、40%
- E、44%

答案：B

30、艾滋病病原体HIV的主要传播途径是

- A、呼吸道传播

- B、飞沫传播
- C、消化道传播
- D、性接触传播
- E、接触传播

答案：D

31、慢性心力衰竭最常见的诱因是

- A、妊娠
- B、水电解质平衡紊乱
- C、服用洋地黄药物
- D、感染
- E、过度劳累

答案：D

32、痰菌培养的正确留痰方法是

- A、漱口后留痰
- B、随意留痰
- C、留痰放于试管内
- D、漱口后留晨痰
- E、漱口后留晨痰放于消毒平皿内

答案：E

33、急性白血病出血的主要原因是：

- A、血小板减少
- B、白血病细胞浸润
- C、感染
- D、免疫下降
- E、弥散性血管内凝血

答案：A

34、诊断原发性肝癌最敏感的实验是：

- A、 γ -GT
- B、AFP
- C、LPH
- D、ALT
- E、AST

答案：A

35、患者，女，20岁，月经初潮16岁，量多，近期内自觉乏力、头晕、耳鸣、眼花。检查：面色苍白，血象为小细胞低色素性贫血，血清铁蛋白低于正常，。诊断为缺铁性贫血，其原因是

- A、损失铁过多
- B、对铁的需要增加
- C、铁的摄入不足
- D、铁的吸收不良
- E、三价铁增加

答案：A

36、对氧缺乏耐受性较差的脏器是

- A、脑
- B、心
- C、肾
- D、肝
- E、肺

答案：A

37、对白血病病人加强心理疏导的具体措施不包括

- A、多接触病人，与其沟通
- B、对病人关心的问题予以耐心解释
- C、观察病人情绪反应，鼓励其配合
- D、指导病人多做运动
- E、鼓励病人家属参与护理过程

答案：D

38、继发性肺结核中最常见的类型为：

- A、原发型肺结核
- B、血行播散型肺结核
- C、浸润型肺结核
- D、慢性纤维空洞型肺结核
- E、结核性胸膜炎

答案：C

39、患者女，35岁，10年前分娩时曾有1次癫痫发作史，之后每年发作1-2次。昨日洗澡时突然意识丧失，四肢抽搐，牙关紧闭，心率增快，血压升高。对该患者病情诊断最有意义的是

- A、脑电图
- B、脑脊液检查

- C、脑血管造影
- D、病史和临床表现
- E、CT

答案：D

40、血小板正常值是

- A、 100×10^9 - 300×10^9 / L
- B、 100×10^8 - 300×10^9 / L
- C、 50×10^9 - 300×10^9 / L
- D、 100×10^8 - 300×10^9 // L
- E、 50×10^8 - 300×10^8 / L

答案：A

41、慢性肾衰竭病人最早出现的症状是

- A、厌食、恶心、呕吐
- B、嗜睡、定向力障碍
- C、咳嗽、胸痛
- D、皮肤黏膜出血
- E、血压升高

答案：A

42、患者男性，28岁，原有癫痫大发作史，晨起有多次抽搐发作，间歇期意识模糊，两便失禁，中午来院急诊，紧急处理措施是

- A、鼻饲抗癫痫药
- B、静脉推注地西洋
- C、肌注苯巴比妥
- D、1%水合氯全保留灌肠
- E、20%甘露醇静脉滴注

答案：B

43、对头痛的病人下列护理措施哪项不妥

- A、鼓励病人使用止痛药
- B、鼓励病人进行理疗来缓解疼痛
- C、鼓励病人进行放松训练
- D、鼓励病人避免强光和噪音刺激保持环境的安静
- E、充分休息

答案：A

44、慢性肾功能不全尿毒症在纠正酸中毒后发生抽搐，最迅速而有效的治疗措施是

- A、口服镇静剂
- B、肌内注射维生素 N
- C、肌内注射安定
- D、静脉注射葡萄糖酸钙
- E、静脉注射速尿

答案：D

45、脑出血以内囊出血最常见,其特征性的临床表现为

- A、同侧偏瘫
- B、对侧偏瘫
- C、同侧偏盲
- D、三偏症
- E、交叉性偏瘫

答案：D

46、急性颅内压增高病人每日液体的入量不宜超出

- A、1000ml
- B、1500ml
- C、2000ml
- D、2500ml
- E、3000ml

答案：C

47、造成机体抵抗力下降的原发病和基础病不包括

- A、恶性肿瘤
- B、血液病
- C、肝血管瘤
- D、慢性阻塞性肺疾病
- E、糖尿病

答案：C

48、关于隔离技术的叙述,不正确的是

- A、检验标本应放在有盖的容器内运送
- B、凡具有传染性的患者应集中在一个病房便于管理
- C、被污染的敷料进行焚烧处理
- D、不将病历带进隔离室
- E、为患者抽血时戴手套

答案：B

49、胰岛素最常见的不良反应是

- A、局部脂肪萎缩
- B、过敏反应
- C、轻度浮肿
- D、低血糖
- E、高血糖

答案：D

50、关于合理使用抗菌药物的叙述，错误的是

- A、严格掌握抗菌药物使用的适应症和禁忌症
- B、预防和减少抗菌药物的毒副作用
- C、根据细菌药敏试验结果及药物代谢动力学特征严格选择药物和给药途径
- D、采用适宜的药物、剂量、疗程和给药方法，避免耐药株产生
- E、对于感染风险高的人群可及早给予抗菌药物，预防感染发生

答案：E

51、患者男，58岁，有肝硬化病史，突然出现神志恍惚，淡漠少言、口齿不清、嗜睡、昼睡夜醒，护士应警惕病人可能出现了

- A、肺性脑病
- B、肝性脑病
- C、呼吸衰竭
- D、肺癌
- E、急性胰腺炎

答案：B

52、急性心肌梗死病人首优的护理诊断是

- A、睡眠型态紊乱
- B、自理缺陷
- C、疼痛
- D、知识缺乏
- E、胸闷

答案：C

53、系统性红斑狼疮（SLE）是一种：

- A、感染性疾病
- B、自身免疫性疾病
- C、传染性疾病
- D、遗传性疾病
- E、以上都不是

答案：B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/997046121151006042>