

急重症组练习题题三

A1 型题

1、CVP 的高低，主要反映（ C ）

A、左心室前负荷 B、左心室后负荷

C、右心室前负荷 D、右心室后负荷

E、胸腔内压力

2、ARDS 并发左心衰竭时，最佳的诊断方法是测定（ D ）

A、动脉压 B、中心静脉压

C、周围静脉压 D、肺动脉楔压

E、心排出量

3、诊断心肌梗死最实用的方法是（ C ）

A、临床特征 B、胸片

C、心电图 D、心脏超声

E、冠状动脉造影

4、当 PO₂ 少于多少时，SpO₂ 的下降比 PO₂ 的降低更为迅速（ E ）

A、100mmHg B、90mmHg

C、80mmHg D、70mmHg

E、60mmHg

5、内生肌酐清除率降至多少，提示肾功能重度损害（ E ）

A、80ml/min 以下 B、60ml/min 以下

C、50ml/min

D、40ml/min 以下

E、30ml/min 以下

6、无意识的病人，造成呼吸道阻塞最常见的原因是 (D)

A、会厌部痉挛 B、异物吸入

C、气道狭窄 D、舌根后坠

E、痰液壅塞

7、用于心肺复苏的药物中，目前首选的仍然是 (A)

A、肾上腺素 B、利多卡因

C、阿托品 D、碳酸氢钠

E、苯妥因钠

8、实施电击除颤时，成人首次单相波除颤能量为 (B)

A、160J B、200J C、260J D、300J E、360J

9、脑复苏的治疗措施中，头部降温要求头部温度在 (D)

A、 B、 C、 D、 E、

10、脑复苏时，利用呼吸机过度通气，其目的是 (D)

A、维持呼吸 B、纠正缺氧

C、促进排痰 D、减轻脑水肿

E、防止肺部感染

11、当尿量维持在多少以上时，一般说明休克已经纠正 (C)

A、10ml/h B、20ml/h

C、30ml/h D、40ml/h E、50ml/h

2、改善组织灌注的根本措施是 (A)

A、补充血容量 B、使用升压药

C、纠正酸中毒 D、使用激素

E、控制感染

3、摔倒时头部着地的病人，出现频繁呕吐应警惕 (B)

A、脑震荡 B、颅内血肿 C、脑疝 D、应激性溃疡 E、休克

4、颅脑外伤病人最基本的监护指标是 (D)

A、呼吸 B、血压 C、脉搏 D、颅内压 E、氧分压

5、开放性气胸紧急处理原则是 (D)

A、水封瓶引流 B、彻底清洗伤口

C、缝合伤口 D、用厚棉垫覆盖伤口

E、呼吸机维持呼吸

6、大范围“连枷胸”伴严重肺挫伤的，为纠正反常呼吸，应选用 (D)

A、包扎固定法 B、牵引固定法

C、手术复位内固定法 D、呼吸机辅助呼吸

E、水封瓶引流

7、骨折病人特有的体征是 (D)

A、压痛-畸形-骨擦感

B、畸形-肿胀-骨擦感

C、畸形-肿胀-反常活动

- D、畸形-反常活动-骨擦感
- E、压痛-肿胀-畸形
- 8、胸部外伤诊断中常用的方法是 (A)
- A、常规胸部 X 线检查 B、胸腔穿刺
- C、心包穿刺 D、血气分析
- E、心电图
- 9、急性肺水肿病人的吸氧 (E)
- A、1~/min, 灭菌用水湿化
- B、1~/min , 酒精湿化
- C、2~/min , 灭菌用水湿化
- D、2~/min , 酒精湿化
- E、4~/min , 酒精湿化
- 0、诊断呼吸衰竭的主要指标来自于 (A)
- A、血气分析 B、肺功能
- C、胸部 X 线摄片 D、CT
- E、脉搏氧饱和度监测
- 1、肝性脑病患者灌肠不宜用 (C)
- A、生理盐水 B、白醋
- C、肥皂水 D、水化氯醛
- E、甘露醇

2、食入性中毒，为清除毒物，通常要采取洗胃的方法，洗胃效果最好的是在中毒后（ A ）

- A、6 小时内
- B、8 小时内
- C、10 小时内
- D、12 小时内
- E、24 小时内

3、用于抢救有机磷农药中毒的特效解毒剂是（ D ）

- A、依地酸钙钠
- B、亚甲蓝
- C、硫代硫酸钠
- D、阿托品
- E、纳洛酮

4、有机磷农药中毒的特征性表现是（ E ）

- A、多汗
- B、大小便失禁
- C、腹痛、腹泻
- D、大量泡沫痰
- E、瞳孔缩小

5、对抗烟碱样症状需用（ E ）

- A、高锰酸钾
- B、碳酸氢钠
- C、阿托品
- D、硫酸钠
- E、解磷定

6、危重病患者的营养支持，在补充蛋白质的同时，必须给予适量的非蛋白质热量，以避免蛋白质作为热量被消耗。较为经典的热氮比为（ C ）

- A、50kcal:
- B、100kcal:
- C、150kcal:
- D、200kcal:
- E、250kcal:

7、需要长期肠外营养支持的，不宜选择（ E ）

A、锁骨下静脉 B、颈外静脉

C、颈内静脉 D、股静脉

E、外周静脉

8、呼气末正压通气的简称是 (A)

A、PEEP B、SIMV C、PSV D、MMV E、VS

9、对气管插管或气管切开的病人，应加强气道护理，特别应做好 (B)

A、切口护理 B、导管护理

C、清除气道分泌物 D、呼吸道湿化

E、口腔护理

10、呼吸机撤离的条件之一是 FiO_2 小于 (D)

A、10% B、20% C、30% D、40% E、50%

1、控制哮喘发作最有效的药物是 (D)

A、 β_2 受体激动剂 B、抗胆碱药

C、氨茶碱 D、糖皮质激素

E、抗生素 B

2、糖尿病酮症酸中毒病人，开始补液时宜用 (B)

A、低分子右旋糖酐 B、生理盐水

C、5%葡萄糖液 D、10%葡萄糖液

E、5%葡萄糖盐水

3、糖尿病酮症酸中毒病人，开始使用胰岛素时宜 (B)

- A、小剂量，皮下注射 B、小剂量，静脉用药
- C、大剂量，皮下注射 D、大剂量，静脉用药
- E、根据血糖水平确定胰岛素剂量

4、根据 2005 美国心脏协会 CPR 指南规定，对于胸外按压的描述下列正确的是：（ D ）

A、应用力、快速按压（100 次/分），使胸骨下陷 1/3-1/2（约 3.75）并允许胸部的完全放松，尽可能减少对按压的干扰与中断

B、所有 1 人实施的所有年龄段的 CPR，其按压与通气的比例均为 30：2

C、每 2 分钟更换 1 次按压人员以防止按压者疲劳以及按压质量与频率的下降

D、以上均对

5、CRAMS 评分是生理指标和外伤部位相结合的评分方法，以下哪一项不是其评价指标（ D ）

- A 循环 B 呼吸 C 运动 D 颅脑损伤

6、具有典型中间清醒期的颅脑血肿是（ A ）

- A 硬膜下血肿 B 脑内血肿 C 硬膜外血肿 D 头皮血肿

7、以下哪一项不符合颅脑损伤后预防和处理颅内高压的处理原则（ C ）

- A 头高位 30 度 B 控制性过度通气
- C 充分液体复苏 D 甘露醇+速尿+类固醇激素

8、以下哪项不是剖胸探查术的指征（ B ）

- A 引流 3h 内，引流速度在每小时 200ml 以上者

B 置管后一次性引出 600 ml 以上血量

C 伴有气管、支气管或食道损伤

D 凝固性血胸伴胸腔内异物存留

9、腹部创伤诊断的最常用且有价值的有创辅助检查方法是（ A ）

A 诊断性腹腔穿刺术 B 剖腹探查术

C 诊断性腹腔灌洗术 D 腹腔镜技术

10、胸外伤病人出现反常呼吸常见于（ B ）

A ARDS B 连枷胸 C 血胸 D 张力性气胸

11、高位截瘫患者临床上常见的并发症是（ D ）

A 褥疮 B 呼吸道感染 C 泌尿道感染 D 以上都是

12、单侧骨盆骨折失血量（ D ）

A、300ml B、500ml C、1000ml D、1500ml

13、急性中毒造成中枢神经系统抑制时排除肠内毒素禁忌使用（ B ）

A.硫酸钠 B. 硫酸镁 C.高压盐水灌肠 D.温水灌肠

14、下列哪项不是阿托品化的指标（ D ）

A.瞳孔扩大不再缩小 B. 皮肤干燥 C. 脸色潮红

D. 心率加快 150 次/分

15、口服毒物一般在几小时内洗胃最有效（ B ）

A、2h B、6h C、8h D、12h

16、有机氟类杀鼠剂中毒，特异解毒剂是（ D ）

A. 维生素 K1 B.维生素 B.烟酰胺 D. 解氟灵

7、对肺氧合功能影响最大的是（ D ）

A. 残气量 B. 功能残气量 C. 补呼气量 D. 潮气量

48 以下不属于胸部物理治疗的是（ D ）

A. 体位引流 B. 胸部叩击 C. 胸部振动 D. 气道吸引

9、在急性 ICP 增高，特别是未做减压术的病人在选择监测 ICP 时不宜采用（ C ）

A. 硬膜外测压 B. 脑室内测压 C. 腰穿测压 D. 硬膜下测压

0、室性早搏次数为哪项可以诊断为“频发性室性早搏”（ B ）

A.3 次 / 分以上 B.5 次 / 分以上 C.8 次 / 分以上 D.10 次 / 分以上

1、室性心动过速的临床症状不包括以下哪项（ D ）

A.低血压 B.气促 C.晕厥 D.多尿

2、气管切开后最常见的并发症是（ A ）

A. 皮下气肿 B. 气胸 C. 气管食管瘘 D. 纵隔气肿

3、反映左心室充盈最准确的指标是（ B ）

A. CVP B. PCWP C. PASP D. CO

4、确定脑死亡的临床指标不包括（ A ）

A. 必须确定所有皮层/脑干功能缺如

B. 评估时患者的体温必须超过

C. 所有反射或肌肉活动消失，除外内脊髓控制的反射活动

D. 手臂、手腕和手指的屈曲，下肢外旋和双足跖曲

5、一病人肺炎伴严重低氧血症，你知道低氧血症会引起（ C ）

- A.体循环血管阻力升高 B.体循环血管阻力下降
C.肺循环血管阻力升高 D.肺循环血管阻力下降

6、你正在护理一位有肺动脉插管的病人，此病人的治疗目的是降低后负荷，后负荷可以通过以下哪一项间接测得：（ D ）

- A.肺循环血管阻力 B.体循环血管阻力
C.左心房压力 D.心排出量

7、有一位机械通气的病人，突然出现烦躁，同时在每次吸气时呼吸机就发出压力报警声，最佳的护理措施是：（ C ）

- A.增加潮气量 B.增加氧合脱开呼吸机
C.用呼吸气囊手动通气几次 D.根据需要使用安定

8、一脑外伤病人 GCS 评分 8 分，说明：（ B ）

- A.轻度颅脑损伤 B.严重颅脑损伤
C.失去意识 D.几分钟内将死亡

9、正常的颅内压是（ A ）

- ~2.0 kPa B. 2.0~2.67kPa C. 6.0 kPa D.大约等于平均动脉压

10、MODS 最早受到损害的器官是（ A ）

- A. 肺 B. 肾 C. 肝 D. 心

1、测量 CVP 时若病人取仰卧位，则零点应在以下水平位置（ A ）

- A. 腋中线第四肋间 B. 胸骨右缘第四肋间
C. 腋中线第五肋间 D. 腋前线第四肋间

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/997050201026006036>